

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
1836

Sectio 1.ª

De medicamentis exoticis ex vegetabilium familia

Caput I.^m

De radicibus

Acorus verus seu calamus aromaticus offic. C.B.P. radix est longa oliqua crebro geniculata, digitum crassa, foris non nihil compressa ex flavo rufescens intus alba fungosa, sapore acri amaricante aromatico
non mediocrem olei essentialis copiam distillatione et non nihil spiritus volatilis urinosi
dioscorides acoro vim calefaciendi tribuit
commendatur ad ventriculum roborandum flatus discutiendos menses movendos ad sanguinis et spirituum motum ~~adaugendum~~
et alexipharmacum existimatur.
in substantia a gr XII ad ʒß in infus ad ʒII
℞ rad. acor. pul. gr. XV. heleni gr X ambrae gris gr. III. sacch. candi ℈I f. pul
in ventriculi debilitate vel cum syr cid. vel menth. q. s. f. bol.
℞ rad acor. per taleol. sect. ʒII infund in vini generosi vel in aq. tepid ℥VI ad appetitum dolores coliq. flatu., et ad morbos chronicos, conditae radices ad catharros crescit in humidis locis lithuaniae tartariae. nec non Belgiae et angliae.
conditae, avellanae magnitud. ad stomach robor. et appetitum excitand mane jejuno ventricul

2 Angelica imperatoria archange-[sativa]
lica dicta J. r. h. tribus digitis crassa
radix, multum fibrata, foris nigricans, ru-
gosa, intus alba, molli succosa, acris
amara, et aroma suavissimum spirans
ex rad. ℔ IIII. ℥ XIV dest. prodierunt phl.
urinos ʒ X. phl. acid. ℔ III ℥ VI olei
tum essent. tum crassior ʒ I cap. mort. ℥ VIß
ex quo sal lixiviosi mere alcha ʒ III gr. L IIII
terr. insip ℥ VI gr XII. hinc patet con-
stare ex sale ad ammoniacum accedente
cum oleo non mediocri et exig. terr.
Stomachica, cord, sudrif. vulner. alexiph.
radix et semen anteponit cœteris phl.
pro præservatione pestis radices aceto
maceratas narib. admovent aut sub linguam
tenent aut acetum bibunt jejuni, et radicem
pulveratam vestibus inspergunt
♃ rad. angel. pul. ʒ hauriat æger cum vini
generosi cyatho
♃ rad angel. pulv. theriac veter. ʒ I aq
cardui Benedict. vel angeli. propinetur peste
laboranti et iteretur singulis 6. hor. ad sudorem
cum saccharo condita ad quosvis thoracis
et pulmonum affectus frigidos, et ad fœtentem
oris halitum. radix sicca affertur ex bo-
hemiâ ex alpibus et pyrenæis et arvernia

Anthora inter aconitor. species 3
a Tourneforte. rad. uno pollice crass. tubero
modo turbin modo oblong, cyperi vel
orchidis fere simul. fibrata foris fusca intus
alba gustu amara et gulam constringens
fracta siccata contumax friabilit tn,
commendatr contra atilium venenosorum
morsum in febribus maligns petechialib
et ipsa peste. ad vermes necandos et intes
tinorum tormina sedanda
Clusius et J. bauhin suspectum habet et
vehementer purgare asserit
tn praescribitr feliciter a ℈I ad ʒI sub
fma boli. tenaces et glutinosos humore
attenuat sale acri et subtilissimo quo pollet
Aristolochia rotunda radix tuber
solida tribus unciis crassa subrotunda
rugosa nonnullis fibris stipata foris
fusca intus pallide lutea, cortice crasso
acris aromatica et tristi amarore linguam
afficiens elixatr non pulverulenta dum
frangitr
Aristolochia longa differt forma
Aristolochia clematitis cujus radix
longa late serpens calami scriptorii crassi
Aristolochia tenuis vel pistolochia offic
radiculis tenuib in caput collect.

4 Aristolochiarum radices multum olei et terrae praebent nullum salem volatilem concretum, paulul. spir. urinos. phlegm. acidum uberrim. radicum succus chartam ceruleam seu helio proprii succo tinctam rubro colore inficit unde liquet aristolochiae virtutem pendere a sale quodam essentiali composito ex terra sale acido plus quam saturata cum sale ammoniaco exig. et mul sulphure conjuncta.
Aristolochiae rotundae et longae fre quentissimus usus discutiunt attenuant aperiunt cum modica abstersione rotunda tenuiorum ptium existimatur et efficacior, itaque ubi opus est modica abster. ... longa in carnium exulcerationibus et fomentationibus uteri
omnes sunt cephalicae thoracicae uterinae valnerariae alexipharmacae in catharr in affectib. pectoris a crassis humor. infla tib. dolorib. colicis. in obstructionibus lieni uteri in lochiorum et mensium suppressione in ruptis ubi sanguinis grumi solvendi et in asthmate scorbutico ad tartaream mu cilaginem resolvendam hoffmannus ad praecavendam phthysim seu palmonum exulcerationem quae haemoptoem cum tussi subsequi solet sic praescribit

5.

℞ arist. long. in aq. flor. tussil. ℥II
infus. per noct. 1° die folium unum
2° fol. duo. 3° tria, usq. ad x.° etc. … di
nando ad unum.
externé in tibiar. ulcer. solus arist. long
pulvis in aq. veronic. decoctæ
vel in vino decoctus ad genitalium ulcera
interne raro nisi in subst. sb. masticat.
vel forma boli a ℈I ad ℈II
℞ arist. rot. ℈III cinnam. ℈I croci ℈I
cum syr. artemisiæ f. opi. doris ℈I
4ª quaq. hora sumenda ad lochia pro
vocanda
℞ rad. altheæ. bryon. aristol. long. et
rot. a ℥II fol. mercur. arthemis. sabin
a m. I. flor. chamæmel. meliloti
tanaceti a p I concide et …
actis est decoq. in aq. font. s.q. et
in sacculis ventri inferiori et pudendo
admoveantur in lochior. suppressione
Ex gallia narbonensi et gallo provincia
affertur

6 **Behen album** subjaceve orientalis nomine i. v. b. frusta lignea seu radices longæ digiti crassitie sicci bulbo contractæ et corrugatæ carnosæ foris cinereæ intus pallidæ odoratæ acriter linguam et fauces ferientes Behen rubr. infrusta nobis afferuntur taleolatim secta jalapii ad instar extra rubentia.
corroborat corpus pingue efficit semen auget confert tremori varios, at usus

Butua Pareira brava offic. rad. lignosa dura contorta foris fusca undis variis rugis tum longis tum circularibus circumsepta thymeleæ radicis instar, intus obscure flavescens variis fibris ligneis quasi intertexta inodora subamara cum quadam dulcedine glycyrhisæ simil digiti et interdum brachii infantis crassitie
vetus intus sumpta diarrhœam dysenteriam gonorrhœam. fluorem alb. hæmopt. et hæmorrhagias quascunque sistit. pleuritidem et anginam tum intus tum extus cataplasmatis forma sanat. venenis intus sumptis medetur sed præsertim ad nephriticum dolorem urinæ suppressionem Lusitani ex brasilia afferunt.

mucosam ac tenacem lympham attenuat et resolvit huius energiam in calculis et ulceribus renum et vesicae non semel comprobarunt dum aegrotantes vix urinam mucosam et purulentam excernebant

in aliis aegritudinib. a sero tenaci et viscido in asthmate humorali, in ictero felicissime. in gonhorroea quoque ad ulcus abstergendum et consolidandum cum balsamo copaivae conjuncta dosis a gr XII ad ʒß in subs. et ad ʒII vel III in decocto.

℞ rad. butneae contus. ʒII bul in aq com. ℥XXIV redigantur ad XVI fiat colat. in tres doses calide exhiben cum tantillo sacch. sicut the. interposit hora dimidiae. in nephr. urin. suppres in ictero. in asth. humorali

℞ rad. but. tenuit. sect ℈I bull. in aq. cyatho uno bulliat leviter hauriat cum sacch. vel syr. de 5e rad. mane jejuno iterch per octiduum singulis mensib ad calculum procurandum vel

℞ rad. but. pulv. ℈I balsam. copa q.s. f. bol

℞ rad. but. gr. XVIII. panaceae mercurial gr X syr. hederae terrest. balsam copa q.s. f. ꝗ

cavendum ne nimia dosi ne ardorem renibus cieat

Chamaeleon albus offici. radix pollicis unius vel alterius longitudine, pollicaris crassitudine foris fusca, superficie velut corrosa et fere vermiculata intus albida sapore acri aromatico non ingrato odore fragranti ex aliquibus Pyrenaeis affertur

ejus usus satis dubius alii alexiteria alii venenata dicunt hoffman dicit vomitum movere pulverat ad ℥i in haustu vini generosi

Cassumunniar cassumunar

Anglorum radix est tuberosa ad pollicem et amplius crassa in taleolas transversa secta superficie circulis ut in galanga quasi geniculatis notata foris cinerea intus flavescens. ex odore fragranti et sapore acri pungente aromatico conjicere licet huic radici inesse salem volatilem oleosum aromaticum. nervos firmat, ventriculum corroborat; in apoplexia epilepsia vertigine motibus convulsivis tremore tristitia passione hypochondriaca in substantia a ʒß ad ℥ß paratur tinctura cum spiritu vini ad gutt XX vel XXX extractum ad gr. XV Angli ex India orientali afferunt et vires summopere praedicant

China seu schinna vel squine

chinæ radix duplex orientalis et occidentalis
china orientalis crassa arundinacea
geniculata ponderosa lignosa tuberculis
inaequalibus colore foris ex fusco rubente
intus ex candido rubescente, aliquando non
nihil resinosa. sapore dum est recens
terrestri leviter astringente crassus vero acri
et subpingui. Du similem asperam sinensis comprehendi tamen
reiicitur insoleta succo exuta fungosa
levis et cariosa
tenuium est partium, natum resolvere tu
mores et sudores movere iis qui vel a
natura vel usu pituitosi medium jam
dispositi sunt. quorias scribit utile esse ad
paralyses tremores articulorum dolores
sciaticam, podagram tumores scirrhosos
oedem. scrophul. ventriculi imbecillitati
inveteratis capitis dolori vesicae et renum
ulceribus. hemicraniae humidis humorali
bus, ictero febribus diuturnis erraticis
tandem spissatos humores resolvit et attenuat
et ad morbos venereos antidotus optima
℞ rad. chin. in taleol. concis ℥ i aq. ℔ VII
stent in olla obturata 24. hor. dein lente
usque ad medium coquuntur. hujus decocti

10 calidi aegro purgato exhibeatur jejuno ventriculo et iterum octo horis a prandio aeger in lecto reponatur et ad duas horas sudet. hic modus 30 dieb. continuis nulla purgatione intermixta aegro in calavi verna-[illegible] postea sequentis 40 dieb. cibis boni succi et vini loco sume taleolas jam decoctae in umbra siccatae. ℥I infunde per hor. 24 in ℔ VII et dein ut prius ad medium coque verum hodie parum praesidia fida habetur et hydrargyro longe inferiora

varo nunc sola utimur, at sed cum sarsa parilla guajaco et ceteris in substantia a ℥ß ad ℥Iß in decocto a ℥ ad ℥ß

℞ rad. chin. taleol. concis. ℥I rad. sarsapar. ℥II ligni sancti ℥ß ligni rasi et contus. ℥VI . infund. calid. per 24 hor. in aq. ℔ VIII postea coq. ad 3ae partis consumpt. sub finem add. lign. sassaf. ℥III colatura bibatur 3 vel 4o cyathos de die vel ad sitim pro potu solito

adversus catharros articulor. dolores et morbos venereos

℞ rad. chi. ℥II rad. salsepar. lign. guai. a ℥iiii [illegible] ov. rhei elect. glycirh. a ℥I polypod.

querni rosar. rubr. aa ℥ii sem. corian. ℥ii
cristal min. ℥3 infund. tepid. in aq. ℔xx
per 24. hor. chiroq. ad 1/4 phi dimi.
decocto ubique simul. ad malum citreum
taleolat sectum. per pannum laxi. refriga
hauriat ℔ii singul. dieb. per 3 hebdom
contra rhumatis inveter. dolor. podagri
cachecticos affectus et morbis venereos

Chinа occidentalis. vel spurio
oblonga nodosa. ab orientali differt
colore magis rufo vel nigrescente intus
magis rubescente. viribus inferior.

Contrayerva sive drakena
offiin. radix unciam unam longa
semi unciam crassa in nodis et inaequa
lita capita extuberans dura foris nigri
cans vel rufa rugosa fibris tenuibus
hinc et inde intus pallido sapore nonnihil
astringente amari. cum tenui et suavi quadam
acrimonia odore aromatico levi
Exponi afferunt ex mexicanis et peruvianis
insulis
sudorifica et alexipharmaca. stoma
chica digestiva carminativa favorem magis
sale volatili oleo. aromat. et terreis ptb. iposito

℞ rad. chayer pulver ʒß margaritar. ppt. et CC philosoph. pp. ana ℈ I cum aq. melis aut cardu. benedic. sumat aeger in alvi proflavio incipientibus ... vel ...
℞ rad. chayer. cus. ʒI santal rub. ʒII. infun. in vin. alb. ℥VI colaturam capiat.
℞ rasur. CC. ℥I coq in aq. com. q. s. ad ℔ Iß sub fin. add. rad. contrayer. corrhu ʒß coccinigliae ʒß fiat colat. add aq. cinnam. ℥ Iß syr. caryophyl hort ℥II hauriat ... in ... et morbillis dosis in substa ad ʒI. ... ʒII

Costus tres olim recensebantur arabicus scil. indicus et syriacus
nunc solus costus arabicus radix oblonga in frusta pollice crassa levia porosa dura sed friabilia, non sicut resinosa albicantia ex cinereo flavescentia sapore acri aromatico et amaricante odore fragrante ad iridem vel violam accedente in nemoribus malabariae brasiliae et surinamae humores attenuat et dividit expector. cephalic et uteri diuresin et diaphoresin movet dosis in subst ʒß in infus ʒII ad ℥ß

Curcuma seu terra merita
longa una altera rotunda
longa seu terra merita. [illegible] souchet ou
safran des indes. rad. oblonga parva
tuberosa, nodosa colore flavo seu
croceo liquores flavo tingens. sapore
acri subamaricante odore non ingrato
ad Zingiberi accedens.
inter cannacori species haud merito re
censuit tournefort
sale oleoso volatili cum sale salso amaro
viscidis et terrestrib. pptib. implicati
praestantissima ad pulmonum jecoris
lienis mezenterii et uteri obstructiones
resolvendas foeminis menstrua provocat
et partum. sed imprimis specificum
in ictero in subst. a ∋j ad ℨj infus. ℨij
℞ curcu. pul. ℨβ croci gr v sal vol. CC
fixati gr x syr. de 5 rad. aper. vel artheni
f. bol. in ictero. uteri obstruct. mens. supp.
℞ terrae marit. ℨβ trochisc. viper. ℨiij
rhei pul. croci ā ℨβ conservae chelido. maj.
ℨj syr. fumar. q.s. f. op. cap. ℨij bis in
die in ictero
℞ rad curcu. ℨβ croci gr xx chabar. ℨij
infund. in vini generosi ℥xij per hor. xij potet
in duas doses
ab indis orientalibus

14 Cyperus 2plex longus et rotundus.
Longus offic. souchet long. rad: long
tenuis nodosa geniculata contorta fracti
contumax foris subnigra intus albican
sapor. suavis subacris aromatici odoris
fragrantis ad nardum accedentis
in galliæ provinciâ et narbonensi nascit
sale volatili oleoso aromatico viscidis
phlb et terrestrib. involut
attenuant incidunt obstructiones aperiunt
urinas menses q ducunt stomachicæ
in affectibus pectoris tussiculosis oris et
vesicæ ulcera exsiccat et consolidat
rad. pul. cum spica lavendulæ ad ʒ1
optime foetum expellit et secundinas
in subst. ad ʒ1 infus a ʒ11 ad ʒ1
recentes minus calefaciunt quam siccæ
semen cyperi cum oryzâ comestum inebriat
♃ rad. cyp. long. galangæ: summitat
absynthi a ʒ1 sacch. alb ʒ11 olei cinna
mom. gutt V f. pul. cujus ʒ1 mane
jejuno vel ante pastum
radices aceto maceratæ exsiccatæ et pul
veratæ pro odoramentis apud aromaticos
reconduntur

Dictamnus albus seu

15

fraxinella distat a dictamni cretici stipibus et foliis.
hoec radix antiquis ignota
radicis cortex crassiusculus candidus a fibris et nervo mundatus ... in modum involutus sapore subamaro cum obscura acredine odore fragranti dum recens. colitr in horti. A gallia narbo ejus vis pendet ab oleo essentiali subtili
℔ I ℥ IV phleg. acidi odorati ℥ VIII sal concreti gr. XX olei fetid ℥ III ʒ III sal alcali fixi ʒ V terr. dam. ʒ II ß ex ℔ V
Cardiaca uterina alexipharmaca sudorifica menses movet vermes necat nec non ad epilepsiam dosis a ʒ ß ad ʒ II in subs. in infus ʒ I
℞ dict. alb. pulv. ʒ I syr. de absynth f. bol ad vermes
℞ rad. fraxinel. pulv ʒ II sumat cum vino meraco; ad secundinas et fovetr uteri regio decocto ejusdem radicis et fol. puleyii

16 Doronicum radix tuberosa ex variis geniculis articulata, internodiis dicta, florib. externe flavescentib. intus albicantib. sapore subdulci viscido cum quadam stypticitate, ex alpibus affertur ejus usus dubius tñ dicunt sudorificam diureticam et ... interdum vomitoriam a pugillo uno ad 2
pulvis ptarmicus ex florib. fol. et radice parat.

Galãga major et minor
Galanga minor offici radix tuber. nodosa genicul. internodiis reflexa in ramos divisa ✗onis cincta dura minimum digitum crassa foris colore fusco intus subrubro odore aromatico fragrante sapore acri aromati subamari, pungente fauces exurente infusa parva affertur ex chinâ et indiâ galanga major pollicem 1 vel 2 crassa odore et sapore debiliore intus pallido colore sale volatili oleoso aromatico pollent stomachica cephalica cardiaca uterina in vertigine tĩquam singulari inducta a pravâ ciborum coctione flatus discutit colicis doloribus. menses provocat
in melancholicis hypochondriacis nocet ut et alia stomachica calida

dosis a gr. XV ad ʒß in substa 17
infus; a ʒß ad ʒII in aqua vel vino
cum medicamentis purgantibus miscetur ad
eorum vim temperandam
℞ galangæ rad. minor. ℈ rad. pæon mar
pulver. sacch. cand. ā ʒß misce f. pul
in vertigine a ventriculi cruditate.
℞ galang minor minutim concisæ ʒII
infund. in vini gene ʒVI cum sacchar
vel syr cujuslibet q. s. sumat æger
in cordis palpitatione pulv. galan. cum
succi plantag. vel vini austeri q. s. in
massam super pannum coccineum regioni
cordis

Gentiana offici. rad. peden.
long. pollicem 1.m crassa multifida fun
gosa foris fusca intus ex flavo rufescens
sapore intense amaro. ex alpibus pyr
ven. armenia.
magnam olei copiam multum terræ et
phleg. acidi, parum spiritus urinosi
vires referendæ sunt ad salem acidum
terra astringente et sulphure saturatum
Calefaciens siccans abstergens alexiteria
vulneraria febrifuga, in morsu canis
rabidi. coctionem juvat. et ubi fastidium tollit

18 dioscorides in morsu canis rabidi eam praescribit cum cancrorum fluviat. cineribus permist. et vino potum et pulvis cum theri aca vulneri imposita sed longe tutius est vulneri dummodo recens sit scalpelli ope dilatato ignem admovere dosis a ℥ß ad ℥ii
℞ gentia. minutim concisa ℈ß summit. centaur. min. flor chamaemel. a. p. 1
sem. cardu bene: ℥i coq. in aq. fon. q.s ad ℥iiii erit decoctum amarum alterans sumat per octiduum jejuno ad viscerum obstructiones ventriculum robor. et vermes necandos laxativum efficit add. ℥i fol. senn.

Glycyrrhiza, liquiritia radix longa sarmentosa digiti crassitie, colore foris cineraceo vel rufescente intus luteo sapore dulci ortus, pannonia italia gallia nascitur boreali et germania
humores salsos et acres temperat. Singulari incrassat tussi et pectoris vitiis medetur in renum et vesicae calculo confert et dolores mitigat
℞ hordei integr. a sordib. expur. m. i coq in aq com. ℔ iv ad consumptionem ½ add. glycyrrh. rasa contus in planta divisa ℥i bulliant ad despumationem f.p.n. proposita ordin

℞ rad. gram. fragar. a ℥I liqui. rasi cortus. ℥II bull. in aq. ℔ IV ad ½ consumption f. pt. aperiens.

Succus albus a quibdam confectio rebecha

℞ glycir. ireos flor. in pul. a ℥VI. amyli ℥II sacch. alb. pul. ℥ mucil. gum. tragacanth in aq. fl. aurant. q. s. f. pasta sol. in umbra sic.

succus liquiritiae niger

℞ extract. liqui. sacch. pul. a ℔II. gum arab. solut. ℥I mucil. gum. tragac. in aq. fl. auran. extrac. ℥I ß misce. et bacculi form. in...

succus liquiritiae blesensis

℞ gum. arab. crassiuscule triti ℔ VI sacch ℔ III glycyr. sicc. rasae et chorae ℔ II infunde glycyr. per XXIV hor. in aq. font. ℔ XXX colaturam divide in 3. in 2.ᵇᵘˢ dissol igne lento gum. arab. trajice. tum cum 3ª parte add. sub fin. sacch. coq. ad emplastri consist. continuo agitando ut candidus fiat.

helleborus albus sive veratrum offi

rad. oblong. tuber. pollicis crass. foris fusca intus alba fibris albis stipata sapore acri subamaricante subastrin. ingrato et nauseoso

helleborum nigrum. rad. tuber. nodo. ex capite numerosae fibrae. foris nigrae intus albae odore. recens. vehementi

20 ex rad. helle. albi. analys. chymica
spiritus saporis acerrimi qui mercur sublim
solutionem coagulat. dein liquor acidus et
errans tum sal vol. urchi. et oleum et
3ª pars terrae. ejus tincturam chartae
sub caeruleam ejus infusum magis viridem efficit
ejus vis cathartica neq acido neq urvi
seq sulphuri separatim tribuenda sed
omnib. naliter commistis
utriusq rad. vehementer evacuant, magna
vi, exiguâ qtitate humores ptill impacta
et tenaciores educunt
album purgat vomitu. vi et molestia summa
hodie non usurpatur ob pericula
sternutationes valentiss excitat in aff. soporos
fonticulis adinota alvum vehemt. movet
in subs. a gr XV. ad ℈II in decocto a
ʒI ad ʒII. sed saepius hell. nigr. extrac
praescr. cum aqua pluvi. a gr XII ad ʒß
prodest nigri purg. insanien. manie.
melanch. comitiali morbo. podagr. apopl
paraly, hysteri. elephantiacis. quart. febr.
omnibus quos atra bilis et melancho molestat
dr alterare humores et resolvere lentorem

externe lichenas, psoras lepras
abstergit in similam cellsam in [illegible]
cullum 2° vel 3.° diebus solvit
super. cum cautione adhibenda
℞ fibr. vr. verat. nig. incis. ʒß infus. in
lacti fervent. ℥ VI coq. leviter infunde
per noctem. cap. mane
℞ hell. nig. capill. ℥ I decoq. in aq. pluv.
℥ IIII ad 3.ª colatur. add. mell. opt. despum
℥ II. cap. cochlear. 1.ᵘ cum jusculo pingui
alternis dieb. in mania.
℞ extract. hell.ⁿ gr. XV. aquil. alb. succini
pp. a gr. XII crem. tartar. gr. XX
M f. bol. cum s.q. medul. cass.
℞ extr. hell. nigr. ℈ I crem. tart. ʒß
mivae seu pulpae cydon. q.s. f. bol.
℞ extr. hell. ℈ crem. tart. ʒß
melius corrigitur crem. tartar. sal prunel.
tamariud. oxymellit. et succo cydon.
quam aromaticis
vulgibus pyrenaeis et arvernicae montibus

22 Hermodactyli rad. curva tuber. trigona seu cordis dimidiati speciem gerens cum sulco a basi ad mucronem foris rufescens intus candida substantia farinacea sapore viscido viscido subacri, post crassa distinguitur a colchici rad. itum sapore colore et duritie et inter colchicos a tournef. eorum vis a sulphure et sale ammoniaco cum pauco tartaro conjuncto. pendet

Siccati pituitam crassam viscidam ab articulis trahunt. purgant debiliter arthriticorum velut panacea commendat et dicunt post biduum eor. usus omnis rheumatis. cons. dicit

in subst. a ʒß ad ʒii infus. ℥i

cum stomacho nimis molesti flatus gignunt iis admisc. zingib. cinnam. rosae.

℞ hermod. pul ʒi agaric. alb. gr x cinnam ℈i conserv. rosar. q.s. m. f. bol in arthritide

℞ herm. puls. ℥ß aloe. diagryd. a ʒß zingib ℈i cum mell. rosa. f. m. cujus doris ʒi

℞ herm. cont. ℥ß fol. senn ʒii cinn ʒi infund. in vin. alb. per noct. cap. mane

Jalapa. rad. oblong. tubb. crass densa in taleol. transverr. gravis. foris nigric. intus fusca vel cinere. resinosa fractu contumax sapore non nihil acri et nauseoso. flammam facile capit a Xalapa. novae hispa. oppid. unde asport abundat sale acri uberrimo acido pauciori cum sulphure et terra inulis eximium purgans in subst. a gr XII ad ℈I

non convenit in febribus acutis nec sicci et calidis temperamentis

verum in hydrope et cachexia propinata

sed attende. plurima corpora humida videri ut spuptatores. et siccitate tamen vigerunt

acida vim catharticam minuunt sed idem fieri potest dosim minuendo

aromatica et pessima catharticorum temperamenta, in visceribus irritationem cathartico valentiorem suscitando stillationem quae ab eo excitatur inutilem reddant cum saepe inflammationem accendant et humorum evacuationem inhibeant

itaque in genere purgantia conveniant dosi et sufficienti liquoris copia diluta

24 jalappa nulla indiget praeparatione, sufficit quantitate terrae catenduntur saliunae et sulphur

sitas

℞ pulv. jalap. gr XX infund per noct in vini alb. ℥ VI mane turbidum et agita

℞ jalap. pul. ℈ I syr. fl. persi. q. s. m. f. bol.

℞ pul. jal. gr XVIII. sal. dal. bolsaticae ℨ ß conserv flor. aurant. q. s. f. bol

℞ rhei pul. ℈ jalapp. pul. gr XII aquil alb. gr X syr. reg. sapor. q. S. m. f. bol

Imperatoria rad. oblon. polli crass, rugosa quasi circata et geniculata fibrata foris fusca, intus alba, sapore acerrimo calefaciente odore fragrantissima

medicantur alpibus et pyrenaeis. cum angelicâ odore fragrantiore acutiore quidem et viribus convenit

Alexipharmaca sudorifica flatus discutit menstrua movet. virorum sterilitatem et pris... avet. ciborum coctionem iuvat obstructiones aperit asthmaticis et anhelosis prodest viscidam tenacem pituitam incidendo hydropem et quartanas et diuturnas febres sanat. in catharris et frigidis affectib ore detenta apophlegmatismus odontalgiae

dosis in subst. a ℈3 ad ʒ1 infus. ad ʒII

℞ rad. ipecac. pulv. ʒ1 propinetur in vinis gener. ℥v hora 1ª ante 4am paroxismum

℞ rad. ipec. incis ʒß infun. in vin hispan ℥vi cochlear 1um vel 2um in colic. et flatus

℞ fol. salviae pug. 1 ipecac. rad. incis. ʒ1 inf. in aq. bull. ℥viii sumatur in mod. theae cum sacch. in catharr. pectoris asthm

externe serpigines inveteratas tollit rad. recent. pul. adipis suilli tuberculo inunge vel pulv. digerendo in aceto quo pars affecta abluatur

Ipecacuanha peruviana et brasiliana respectu coloris 3.es cinerea grise ou blonde fusca brune alba blanche

cinerea seu peruviana offi rad. 2æ vel 3æ lineae crassa tortuosa et quasi annulatim exaspera dilute fusca densa dura fragilis resinosa cum nervo exiguo sapore sub acri amaricante nonnihil odorata

fusca sive brasiliensis tenerior magis exasperata quam cinerea extus nigricans intus alba leviter amarescens

26 albæ seu adulterina rad. ruyis caret
amarore expers
utraq. peruviana et brasiliensis hu
mores evacuant per super. et infer. dysent
alvi fluxu inveter. et morbis ex longa
obstructione
peruviana seu cinerea anteponitur melior. 1
a qua decocta uberrimam mucaginem supp
ex cinereæ ℥ VIII resinæ ʒ X opæ
spiritus vini extrac. ex aad. q̃ litt. opæ
aq. com. gummosi extracti ℥ III ß prodier
pulvis residui ℥ IIII
extractum resinosum potenter vomitum
provocat gummosum vero perparum.
ipecacu. virtus præcipua a gummosa substa
mucilaginosis ptibus oblinuntur intestina
suo muco spoliata et siccantur exulcerationes
ptas resinosa a qua vis vomitum provo
candi pendet non prorsus inutilis et
materiam morbificam dividit et eliminat
et astringendo viscerum tonum restituit
pulvis ejus a ℈ß ad ʒß in vino vel jusculo
diluta jejuno ventriculo vespere potio
stomachica et anodyna
℞ pulv. ipecacuanh. ℈ I syr. cydon. q.s. f bol
superbibendo jusculi vel vini alogrusi cyath. 1^m

℞ confec. de hyacin ℥I diacod ℥VI
dissol in aquar. cinnamo. et plantag a ℥III
f. po. hora somni exhibenda. vel
℞ diaph. min. corall. rubr. et terrae
sigill. a gr XV cinna. et galang min.
a gr X lauda. opiat gr ß. syr cyd. q. s.
experientia inpectum est ipecacuanhan
ad gr: VI, vomitum per belle provocare
et ad gr X non minus vehementer quam
ad ℈II unde majorem quam VI vel X
inutilem censebant.
aegrotanti rite purgato grana aliquot
singulis diebus exhibenda ad astringendum
abstergendum exsiccandum et mucilagini obducendum
℞ manna. sel. ℥I liquescat in aq. plantag
℥VI f. colatur dissol. el. cathol. cum rheo
dupl. ℥ß pulv. ipeca gr. VI
℞ rhei pul ℈I pul jalap gr XII rad. brasil
gr VI syr. de cic. cpos q. s. m f. bol.
opiata astringens et roborans singulis dieb.
℞ conser. ros. rubr. et cynorrh. a ℥I theri
andro. sen ℥II pul. ipeca. gr. XVIII syr
cyd. q. s. f opiata dos ℥I mane et sero q^a^ postprand
in epidemicis et malignis dysent. cardiacis
societur. non ejusdem est energiae in aliis aliis
fluxus

28 felicius ad dysenteriam confirmatus quam ad incipientem varissime invito adhibetur modo rite si non feliciter cessit nihilo pejus eadem tutissimum remedium

℞ el. cathol. cum rheo: dupl. ℥ iii pul. ipecac gr x. m. f. bol. in epidemiis.

si debiles sint vires, peracta evacuatione per superiora hæc potio cordialis et antidysent.

℞ conf. de hyac. elec. diascord. ā ʒ i pul. ipecac. gr x syr. cyd ʒ i aq. cinnam ʒß aq. plantag. et meliss. ā ℥ iii potio cochleatim sumenda singulis horis

die sequenti sumat æger 2da dose opiatum sequentes

℞ el. diascord. ʒ i rad. brasil. gr. .. m. f. bol. mane et sero iterandus donec restitut.

Iris florentina off. rad. ... fruct. oblong. geniculat. paululum compressa 1 in pollicem crassa candida cortice ex flavo rubente spoliata saepe obsita fibris, odore violaceo fragrante sapore amaro acri attenuat incidit crassiorem lympham in pulmonibus et expectorationem movet asthmati dyspnoeæ tussi. utilis quoque

ventris torminibus infantium et inter
sarcotica meduta: praeterea sternutatorii
errhinis apophlegmati misch.
hoffmannus dicit somnum inducere vaporosa
substantia at crocus myrrha una mos hila
in corporibus frigidis asthmatici thum
dosis a ℈i ad ʒi
℞ iridis flo: glycyr. sem. anisi. sulphur
vi vivi a q.l. syr. de prassio albo q.l.
f electu. dos ʒi. saepius in die tussi asthmati
℞ rad. ir. flor. ʒii agari. in nodulo ling
gati ʒiß fol. exsicc. nicoti ℈ii fol
hysso, thim. a m i coq. in aq limpid
℔ ii ad ½ consumpt dissol. oximel simp
ʒ IV ad viscidam pituitam incidendam
et pras alium in asthmate. exhibeatur
bis in die tazza calid. in modum thea ʒ VI
℞ ir. flor. rad. paeon. mar. a ʒ ii croci
ʒ III foeniculi ʒ ii sacch. cand ʒ iii f
pulv. subtil. dos ℈ i aut ℈ ii in lacte
vel cum pulte pacend exhibeatur ad ventris
tormina sedanda et inflationes discutiendas
℞ ir. flor. ʒ iii fol. beton.[t] major. a ʒ ß
fiat pulvis sternutatorius

30 ℞ iv. flo. ℥ ii sem. sinap. staphid. a ʒß leviter pulverata includantur in nodulo in ore detineantur jejuno ventriculo prono capite per semihoram masticando ad copiosum phlegma per ductus salivales

rad. iridis nostratis inter hydragoga valentiora recensetur dejectione etiam serosos humores ducit in hydrope ejus succus depuratus ad ℥ ii solum aut cum vino jejuno ventriculo alternis diebus ut tamen ea est ejus acrimonia ut ardores accendat menses et abortum excitet ut caetera hydragoga cum farina fabarum illitus lentigines aliasq maculas detergit

Mechoacanna offic. rad. in tale albus secta cortice rugoso contexta substantia mollius cula in qua vix ulla apparet fibra: sapore subdulci obscura acredine a bryo niae rad. differt qd compacta sit nec fungosa nec amara nec virosa

ex mechoacam americae meridionali provincia analysi chymica plurimum liquoris acidi et olei modicum urinosi, minorem resinae quantitatem quam jalappa sed tenuioribus phlorum

purgat benigne roborando partes
obstructiones resolvendo nec injucunde cum
nullius fere saporis sit pticeps
catharrosis frigidis affectibus epilepsiae asth.
sthumis arthritidi morbisq venereis
hydropicis nullum mitius catharticum
in subs̄tia exhibetr cum vino aut alio
liquore a ℥ß ad ℥I pueris ad ℨI
coctione vis ejus perit
℞ mechoacan pulv ℨII infund per
noct in vin. alb. ℥V
℞ mechoac ℨIß tartari solub ℨI infun
in aq. cichor ℥VI per 6 hor.
℞ mechoa: pulv. ℨI agaric trochis
ℨß aquil. alb. gr. XII cum syr. rosar
solut. q. s. f bol in catharrosis affect.
arthri. et morbis a serosa colluvie
Meum athamanticum rad. oblong. minimum digit. crassa ramosa cortice foris
ferrugineo intus pallido aliquantulum
gummoso includente medullam albicantem
odore jucundo sapore non ingrato nisi qd
acris sit et non nihil amara
ex arvernia pyren. et alpibus
tournefortio dr foeniculum alpinum racemo
capillaceo folio odore medicato

32 inei odor et sapor salem volatilem
oleosum in hac planta abundantem indicant
humores viscidos et tenaces dividit et
attenuat urinae stillicidium sistit
in pueris pubi admota. monent
dioscorides et galenus nimiam dosin aut
frequentiorem usum caput dolore afficere
dosis in subst. a ʒß ad ʒi infus a ʒi ad ʒii
in vino vel alio liquore

Nardus indica; spica nardi et spica
indica rad. congeries capillament. terminum
convolutor. capiti collect. sunt nervosa mar
cidorum folior. capillamenta colore ferrugineo
ex fusco rubescente, sapore amaro acri
aromatico odore grato ad cyperum accedat
ex sapore et odore conjicere licet, vires
ejus a sale volatili oleoso pendere multo
sale fixo et terra implicato
Alexiteria cephalica, stomach, nephritic:
omnes frigidos affectus conquoquit menses
et urinas movet obstructiones solvit et
haemorragia narium in jusculo cum plantagin
aqua in subst. dosis ʒß ad ʒii infus ad ʒß

Nardus celtica, spica gallia rad. fibrosa squamis parvis ex viridi flavis vestita sapore acri amaricanti aromatico ejusdem virtutis cum spica indica magis roborat discutit et urinas ciet

Nardus montana off. rad. oblon. brevi capillo. fuscis et rigidiusculis viribus cum celtica convenit

Ninzin et gins-eng rad. digiti mini. crass, pollicum 1ᵘˢ long. leviter rugosa nitida quasi translucida ut plu, bifida extus rufescens intus flavescens sapore subacri amaro et aromatico odore aromatico non ingrato in summo reperitur series nodorum ab emarcidis caulibus efformata quorum ope aetas plantae calculo judicium fit crescit apud sinas in tartaria unica libra tribus argenti ℔ venit optimum corroborans ...

Pyretrum duplex una digitum longa et crassa foris ex subrufo colore nigricans intus alba fibris nonnullis donata sapore acerrimo et urente sine odore exsiccata ex turnetensi affertur altera quae tenuior est et minus acris et ... leucanthemum canariense fol. chrysanthemi pyrethri sapore ...

34 ob acredinem salivam copiose educit hinc in odontalgia ab obstructionibus catharrhis in morbis soporosis et linguae paralysi efficaciss. ore detentum et masticatum

℞ rad. pyrethr. ℥v. macerat per noctem in aceto et mane masticet.

℞ rad. pyr. Zingib. ā ʒi piper. nigr. ʒß pulverisata inducto nodulo qui dentib. conterat vel cum cera subigant in nodulos nuci avellanae magnitudine dentib. cherendum non interne nisi enematibus affect. soporosi

℞ rad pyret ℥i coq. in decocti communi clystm. ℔i colaturae add salis gemm ℥ß f. enema in apoplexia et soporosis affectibus

Rhabarbarum et rhaponticum

affertur in frusta et tubera crassiora inaequalia uncias 4or vel 6 long. 3 vel 4 lata leviter ponderosa foris lutea et sub fusca intus ex croceo et flavo variegata ad nucis myristicae similitudinem non nihil fungosa sapore sub acri amaricante et non nihil astringente odore aromatico sed non nihil gravi apud sinas nascitur eligendum recens non cariosum non putridum aut nigrum, qd aquam croceo colore tingat nihil lentoris aut glutinosi linguae offerat

nunc ex india orientali et moscovia affertur. 35

ex rad. ℥ii aq. com. ope extracti quam ʒ gr xii elicitur perparum resinae mult. sale alcali dilutae ita ut ope spiritus vini ex ℥ii vix ʒiii extracti salino resinosi obtineantur hoc ce extractum ob salis copiam aquâ communi facile dissolvitur et in aqua non lactescat ut caeterae tincturae resinosae

Duplex facultas humores biliosos evacuan[di] et astrictione roborandi hepatis obstructiones resolvit in icteris, diaarrhoeis, gonorrhoei aut albi uteri profluviis vermes necat quocunq; modo sumatur praestantiss. in infantibus adultis senibus puerperis praegnantibus tuto praescribitur

non tamen prorsus innocuum alvum enim exsiccatam relinquit renes vesicam et ca[put] robrum petit, minus q̃ convenit ubi fervi[-]da sunt viscera et febrilis calor incestuat iterum juvat qui pendet a bile spissa lenta non vero a bile nimis evecta volatili et aes[-]tuante. renum et vesicae affectibus nocet fallopius testatur iis ardorem accendisse et usum diuturniorem vertiginem induxisse.

praescribitur in cachexiis infantium ad trunum corroborandum

 dosis in subs. a ℈ß ad ʒ1 infus. ad ʒII
ejus extractum sic parar.
℞ rhei. elect. ℔ 1 affund. aq. cichor ℔ IV
macer. s.a. blando ignis calore per 12. hor.
colo. massæ superstiti aff. sp. vin. ℔ 1 denuo
macerait per 6. hor. ℞ per inclinationem
et cum preced. infus. misceatur evaporet
humiditas ad extr. consist. dosis ℈ß ad ʒ1
sub forma boli
observandum est rhabarbari substan.
longe valentius alvum ciere quam
infusum decoctum vel etiam extractum
licet duplicata dosi
℞ rhei elect. ☿ solub. a ʒ1 infund.
per noct. in aq. cichor ℥VI in infus.
dissol mann. calab ℥1ß f. colatur.
exhibeatur ad bilem stimulandum et subduc.
℞ medull cass recen. extr. ʒVI rhei
pul. et ☿ vitriolati a ʒß m. f. b. vel
℞ rh. pul. ℈1 pulv. jalap ℈ß. aquila
albæ gr X. elec. lenitivi ʒ11 syr.
de cichor comp. cum rheo q. s. m. f. bol.
℞ rh. pul. ℈1 pul. jala ℈ß pul. ipeca
gr X syr. de cichor. comp. q. s. m. f.
Bolus in dysenteria

℞ rh. cont. et tenuiter diss. ℥i inf. in 3ᵃ aq. font. ℔ II infu. seorsim in vini gener. ℥VI limat. ferr ℥i macer per 6 hor. infusiones misceantur et 4ᵘᵐ vel 5ᵘᵐ cyathos hujus liquoris sumat aurorum dedic longe a pastu ad hepatis et lienis obstructiones resol. albosq mulier. fluore praemissis praemittendis
℞ rh. pul. ℥II panaceae ☿ ℥i bal sam. copaivae ℥iß m. f elect. dosi ℥i quotidie mane et sero ad gonhoream purget 3ᵒ vel 4ᵒ quoq die cum pilulis mercurialibus.
Rhaponticum oblong crass. ramos foris fusca intus crocea transversim secta strias radiatim dispositas, laxa rara odore non ingrato sapore amar subastring. sub acri lenta glutinosa si paululum in ore detineatur, non ducatum colorem reddit pallidum ad croceum accedi. teredines non debet sentire crescit vulgo in rhodope monte thraciae moderate purgat subs, a ℥II ad ℥ß infu vel decoct. a ℥ß ad ℥i potentius astringit rheo

38. huj in diarrhœa et dysenteria ? spernendu

Sarsaparilla vel Salsaparilla offi
radicum flagella longiss plur ulnar
junci majori vel plumæ anserinæ crass
lenta flexib striis perlongum decurrent
corticis tenui colore ext. rufescente vel
cinereo cui substia candida farinacea
subest crassiuscula molli & digitorum
attritu in pulverisationi solubili aquarum
fere referens sapore tantil. glutin. subamar
non ingrato. medituillium lignosum
nitidum lentum fractu contumax
affertur ex hispania peruvia brasilia
hujus radicis effectus pendent a sale
essentiali acido, oleo spisso et multa
terra implicato
Sudorifica humores lentos ac tenaces
dividit et attenuat. specificum habet
ad luem veneream arthritidem cath
arthrosos affectus paralysim morbos
chronicos inveteratos a crassis lentis
humoribus ad cutis affectum lichenas
et ulcera.
eodem modo ac squina ad luem vene exhibebur

magis tenuium . ex partium quam
sabina et guajacum dr
dos a ℥ß ad ℥II in subs. de decoct.
ad ℥ß ab eo ubstinendum in febr. et morb. ut
usurpatur in phthisi sudorif. et accend.

℞ salsap. rasi ℥III lign. sanct ℥II coq
in aq. font ℔X ad ½ consumptis per cyathos

℞ sals. ℥II in exent. pulli jun gall quos
inmittantur coq. in aq. com ℔VI ad ⅓ cons
jusculi alterum. 4° quaq. hor. in rhumatis

℞ sals. ℥VI rad. chin. ℥II putam. nuc
jugl. cum nitulis N° 10 bull. in aq
com. ℔XII ad ⅓ red. 4°. vel 5° cyathos
in die horis medicatis. rheumat. catharr
et paralysi

℞ sals. et chin. a ℥II cort. et lign. guaj
℥I sassaf. ℥ß ☿ in nodul. susp. ℔ß coq
in aq com. ℔VI ad ⅓ cons. in lue ven. catarrho et paraly

℞ salsp. summ. centaur min. rad. aristol.
rotun. a ℥Iß fol. chamaed. t chamae
sem. hyperici a ℥II. rad. angel. ℥ß cinn
℥ß croci ℈I caryoph ℈ß omnia pulveri.
m. cum mell narbon q. s. dosi ℥Iß quotidi-
jejuno per annum integrum in arthritid rheumati
a causa frigid.

40° Seneka racine contre la morsure du serpent à sonnettes radix est plantae quae polygala caule simplici erecto foliis ovato lanceolatis alternis integerrimis racemo terminatrice erecto.
radix spythamam longa digit. min. cross varie contorta in plures ramos divaricata fibris stipata lateralib. et margine sublumen extuber. foris sublutea intus albu, sapore acri amaricante nonnihil aromatico
D. Tennent. sc. angl. dicit diaph. diuret alexiph. sanguinem viscid. tenuiren, inflam materiam resolventem. in peripneumo et pleur. feliciter cedere affirmat hoc methodo in plethoricis ubi febris sang. ℥X e brachio dolenti oppo. vel e saphena si utrumque latus doleret tunc seq.
℞ 3ª cochlearia aegrotanti 6ª quaque hor. incip. statim a venae sectione donec remississiora fierent symptomata
♃ rad. Senek ℥iii. valer. silvest ℥iß contus. in mort. dein in vin. can. vetu gener. ℔ii digere igne arenae per 6 hor. in vase operto et decanta ad usum dein

℞ balsam copai et sal. vol. oleo. a gutt 41
XV. misturiant in cyatho potus ᵹmeh
2ᵃ quaq hor. inter singulas ℞ superiori
doses.
potus consuetus sit infusio tepid.
rad. altheæ.
decoctum solius rad. ad ℥III. in aq
font. ℔II ad ½ consum. quovis syru
pectorali e melle confecto edulcoratum.
cessit feliciter dum ægro sguis missus
est ubi primum ægrotare cœpit.
at cum febris aliquatenus nervosa sit
tinctura anteponenda decocto in eo in
casu rad. valerianæ silves. mira præstat
et balsamu. copai̇ aut gilead
altero die si dolor et febris non remd
serint venæsectio ad ℥ X repetenda
vomitus et catharsis. qdoq hoc remedio
benigne cientr et feliciter si æger
vomitum ægre ferat ob debilitatem. sistu
absorbent. testac. tincturæ immixt. vel
gr XII ☿ in aq. cinna. debilitato
exhibito etiam in morbis nervosis febribus
lentis pleuritidem et peripn. mentientib
polygalæ vulgaris nostræ radix substitui pt

12 Serpentaria virginiana, vulatrina
pistolochia virg: offi. viperina
rad. fibros. tenuis levis foris fusca, intus
flavescens odore fragrante aromatico
ad Zedoariae odor. acced. sapore subacri
amaricante
extract. salino resinosum tum ope aquae
tum spiritus vini elicitr non mera resina
unde liquet hujus radicis energiam
a sale acido, oleosis particulis et sale
alcali fixo simul cjunctis pendere
Diuretica diaphor. alexiph. contra
serpentum morsus unde nomen. adversus
hydrophobiam vermes necat. febrif.
et antihysteri in subs. a gr X ad ℈ß
infus ad ʒII
℞ rad. serpen. virg. ℈ß chelar. nigr
cancror. pp. ℈I syr. caryoph. hort
q. S. f bol. in febr. malig. adversus putredinem
℞ serp. vir. pul. gr XX ther. vet. ʒß f
bol. in febribus malimoris ad sudorem
℞ ser. virg. rad contrayer pulv. viperar
a ʒß m. in febr. malign. adversus venena
frigid et adversus febres intermitt.

℞ rad. serp. virg. tenuiter incis. contus ℥VI coq. in aq. ling. ℥XII ad ½ sub fin. add coccinillae contus. ℈ß fiat colat. in aq calid. dissol. mell. narb. ℥I refriger. add aq. theriac. ℥ß. hujus liquoris cochlear 2° vel 3.ª tertia quaq hora in febr. mal. et putrid. ad diaphoresi et sequin [illegible] praecavend. ... tinctura adhuc paratr

℞ rad. serp. virg. pul ℥II. R salis ☿ ℥XVI misce et tinctura per digestionem extrahatur

Turpethum turbith rad. vel radicis cortex a ligneo meditullio separatus exsiccatus, dissectus in frusta oblonga digit crass. resinosa foris fusca intus albida sapore sub acri et nauseoso

solent impostores radicum frusta gummi vel resina illinire ut magis gummosum appareat

in Zeylan et malabaria

ejus vis pendet a quâdam gummi resinâ conflatâ ex sale ammoniacali cum oleo crasso.

efficax censetur ad crassos lentosq humores a remotioribus corporis partibus fortiter evellendos unde proverbium qd ~~[illegible]~~ non extrahit agaricus extrahit turpethum qd turpethum non promovet elicit colocynthis

44 in diuturnis morbis maxime frigidis
in arthritide paralysi hydrope
in subst. a gr. XV ad ʒI infus. a ʒiß ad ʒiii
ab eo extract. vini ope et resina ope spiritus
sed vario[r]is usus extr. a ℈I ad gr XXX resina
ad XV
suspectum cum cit qd tormina pariat ven
triculum lædat et corpori marcorem in
ducat sed corrig. aromaticis. stoma. Zingi
cinnam. caryoph. mastic. sacch.
℞ turbith gummosi ʒII fol. sem ʒI
cinnam. ℈ vini gener. ʒVI inf. per
℞ turpet, hermoda, jalap. sem. a ʒI
aquil alb. ℈ scam ℈ß rob ebuli q s
f electuar. praestans in arthritide hydrop
dosi ʒiß

Zedoaria et Zerumbeth
longa una, altera rotunda
longa rad. tuber. densa solida sextantali
trientali aut quadrantali long. digiti crass.
utrinq in obtusum acumen desinit foris
cinerea intus candida sapore acri, ama
ricante aromatico odore tenui fragrante
at valde aromat. dum tunditur aut manduc
ad camphor. accedente.

rotunda solu figurâ differt
Sinarum regione affertur
pollet oleo essentiali tenuissimo
cum acido sale volatili ex quor: commodo
tenuis hoc resina camphorata multa
terrâ sepelita. alexiph. sudorif.
phlegma pulmonum in dispnoea et
orthopnoea in asthmate spissum et
tenax potenter incidit ejus evacuationem
promovet flatus discutit. ventriculum
roborat coctionem juvat. massam
sanguineam veluti vappidam et orbatam
spiritib novisq spirituosis ptisanis
recreat unde in scorbuticis affectib
apoplecticis et paralyticis confert
ut caetera aromata volatilia
cavendum ne calidiori naturae exhibeatur
nam fibras nimis exsiccat
in subst. a. gr VI ad ʒß infus. ad ʒII
in vino vel aq. calida ut thee
℞ Zedoa. long. acori veri a ʒß cinn.
ʒ infund. in aq. bull ℥VI capiat aeque
colatur: cum saccharo

 ℞ rad. Zedoar. sacch. a ʒ iii balsam peruv. gutt XII f. pul. pro 12 dosibus

℞ Zedo. acori. galang. angel. cinna a ʒ i caryophyl. ambrae griseae a ℈ ß sacch rosati ℥ VI f. pulvis stomachicus seu cibarius dos ʒ i in vini haustu ante pastum vel statim a pastu ad coctionem juv. et flatulentos colicos dol. sedandos.

℞ Zedo pul. gr VII succi mali citrei cochlear i.^m spirit sulph. gutt II sumat æger ad nauseam et vomitum

℞ Zedo. ʒ iii iri flo ʒ iiß inf. in vini gener. ℥ VI per noct. f. colat. sumat æger cochlear i.^m per intervalla ad expectorationem

℞ Zed. Casto. serpen. virgin. valeriana silvestr. a ʒ i spir c.c. succinati q.s. extrahe tincturam in hystericis affect. a gutt. i ad X in vehiculo conveniente

Zingiber gingembre rad. tuberosa nodosa ramosa paululum compressa substantiae non nihil fibrosae pallidae vel flavescentis tenui pellicula subfusca obtectae qua

spoliari solet dum recens antequam siccat sapore acerrimo fervido aromatico instar piperis odore fragrantissimo
ex sinis, malabar et ceylan affertur etiam ex america, sinensis minus fibrosa et præstantior
pollet sale volatili oleoso fervido seu igneo principio turgido a quo saporem odorem et vires obtinet; minus esse tenuium partium quam piper dicit galenus recens et exsiccatum ventriculum roborat et concoctionem promovet, cerebrum et memoriam roborando juvat, hebetudini visus ab humiditate venerem stimulat et flatus discutit. alexipharmacum cavendum ne adhibeatur in quibus fervent non magna dosi melancholicis quia spissiores fixiores nonnunquam reddit humores. in subst. a gr. V ad XV infus ʒi conditum vero a ʒi ad ʒi .6.
℞ Zing. conditi ʒß conserva rosa. rubr. citri. limon. conditi a ʒii cabai junipe ʒß cinnam nucis moschat a ʒiß syr flaven cibi vel cyd. q.s. m. f. elect ad ciborum coctionem statim a pastu ad ʒii

Caput 2^um
De Corticibus

Cinnamomum et cassia sive canella. cortex est tenuis modo charta lusoriae modo sextantis unciae crassitudine convoluta in oblongos tubulos aut canulas cubitales, substantia lignosa fibrosa fragili, superficie rugosa aliàs laevi colore ex flavo rubescente aut ferrugineo sapore acri pungente, sed sine molestia suo dulci aromatico odore suavi fragrantissimo 2^us et interior cortex de canella Zeylanica. sale essentiali tum acido tum urinoso ad ammoniacum accedente et cum oleo essentiali aromatico turget. in insula Zeylan calefacit siccat aperit discutit alexipharmacum est veneni resistit menses movet, roborat spiritus recreat, flatus discutit.

Subs. a ℈i ad ʒß vel ʒi infus. a ʒi ad ʒii

℞ cinna. contus. ℔ i. vin. alb. et aq. melis distill. a ℔ iii macer. per 24 hor. distilla igne vehementi per refrigeratorium alembicum et primae aquae ℔ iii servent ad usum

Croci aqua turbida est et albicans

℞ aq. cinnam. spiritus ℔ι cinnam. acuti contus ℥ιι digerant 24 hor. ℞ rubr per inclinationem separa tum ℞ sacch alb in aq. meliss solut. et in ol. solid. coct. ℔ιι huic Ssim affunde ℞ f. syr. cuju dosis ℥ι

distillati oleum essentiale cinn. eodem modo ac caetera olea ess. macerand. cinn. in aq. cinn. et usque rubem. distill. dosi a gutt. ιιι dentium dolores obtundit gossipio exceptum

℞ cinn pul. ℥β limat. ferri tenuis ℥ιι sacch. cand. pul. ℥β f. pulvis in virgi num chlorosi ad ℥ι

℞ cinn. pul. ℥β cahac croc gr. vι flor. sal amm chalyb ℈β m. f bol in mensium supp.

℞ cinn ℈ι croc. pul ℈β syr Kermes q. s. m f. bol in partu difficili

℞ cinn. acut. pul. ℥x zingi caryop a ℥ι galang. macis, nuci mosch flavedini citri rasae a ℥ιι cum sacch in aq ros. sola et coct ℔ι f. tabellae palato gratae ventri. roborant dosis ad ℥ιι

 ℞ aq. cinn. ʒß aq. flor. auran et aute
a ʒi confec. alker ʒß f. mis. in parte ditt
℞ olei cinn. gutt iii sach alb ʒiii fiat
olæosaccharum
Oleum et camphora ex radicis cinnamom
cortice extracta in affectibus rheumaticis
et paralyticis externe admota conferunt
ab eorum aromat. usu diuturniore aecriora
fiunt corpora

Cassia lignea. cortex in cannulas
convolutus facie externâ cinnamomum
omnino referens tum colore tum odore et
sapore debilioribus tñ et ab exteriori
pellicula eodem modo purgatus disquite a
cinn. aromatic. debiliori et quâdam gluti
nositate quæ gustui dum comeditr, percipitr
et Alexiphar. stomach sed ubi demulcend
et astringendum interponitr in tussi et asthmate
ad pituitam acrem lentam incidendam et
demulcendam in diarrhæis dysenteriis.
℞ cass. lign contus ʒ passul. exacinat ʒß
inf in vin alb ʒviii cola in asthmate

℞ rhei el. cass. lign a ℥ß rosar rub ℥ii infun per XII hor in vin rub ℥viii f. colat cum sacch alb. in aq. ros. ad placit. solut. in electu solid coct. et ad syr consist. cujus duo vel tria cochle bis terve indic adversus diarrhoeam alii fluxus ventri. intest imbecillitatem

Cassia caryophyllata

cortex instar cinnam. tenuis ex rufo ferrugineus pelliculis spol. sapore mix canellae et caryophy linguam quasi causti afficit nascitur in america
alexiphar. stomach. cephal. in caryop phillis inferior

Canella alba tam intus quam extus exalbidus vel flavescens cinnamomo crassior sapore acri pungente aromatico quasi mixto ex cinnam, Zingi, et caryoph inter antiscorbut. catarrhis et paralyticis dosis a ℈ß ad ℥i infus ad ℥ii
eius usus biliosis et calidis naturis noxius

52 Cortex Winteranus verus.

crassus est et in tabulos convolutus foris in tegumento cinereo, molli fungoso inaequali et multis rimulis hiante. intus solidus densus ferrugineus sapore acri aromat. nauseante ex urente odore fragranti a canella alba distinguitur crassitie majore colore obscuriore sapore acriore quasi piperis vel Zingiberi.

stomachicus, alexipharm. sudorif. oleo essentiali aromat. subtili copioso cum acido sale volatili. adversus scorbutum catarrh. paralysin a frigore.

pulvis a ℈ß ad ℥i. decoct. ad ℥ii

Kina Kina cortex peruvianus

est admodum siccus duas aut tres lineas crassus foras scaber fuscus ali[quan]do musco canescente obductus, intus laevis non nihil resinosus, colore ferrugineo vel rufo, sapore intense amaro cortice astringente cum quadam aromaticitate non injucunda. modo in crassiores cortices 3. vel 4ve uncias long. unciam latos non convolutos modo in canulas paululum involutus non adeo crassas interne rubentes ex ramis tenuibus detractas

modo advehitur in frustula tenuia seu
minutim concisa interne flavescenti
extus canescentia
eligatur rufescens vel rubens seu colorem
cinnamomi referens sapore non ingrato
aromatice amaro, odore quasi mucido
leviter aromatico dentibus attritu friabilis
non viscidus et glutinosus non ligneus
non effetus et amarus non insipidus
nec adulteratus quocunque alio cortice
succo aloë intincto
Analysi chymica kinakina crassè tusae
℥IIIIß phlegmatis acidi ℥I ʒIIIIß suppe
ditarunt posteriores non solum intensi acidi sed
etiam alkali urinosi signa exhibuerunt
nam heliotropii tincturam caeruleam in rubram
et sublimati corrosivi solutionem turbidam
et lactescentem reddiderunt et ex ea pulverem
album praecipitaverunt, deinde olei crassioris
axungiae porcinae similis ℥I gr. IXVIII.
in retorta residui nigri pondus fuit ℥I
ʒII gr. VIII calcinatum vero ad albedinem
pendebat ℥I gr XV a quo salis fixi non
mere alkali sed non nihil salsi per lixiviam
ʒß per lixiviam extracta fuit

54. ex hac salium acidorum et oleosarum
partium mistura in corticie resina exurgit
qua si ipse menstrui idonei extrahatur fere
quartam corticis partem aequat
longe minor est gummosae substantiae portio
Praeterea infusum corticis peruviani chartam
coeruleam subrubro colore inficit, unde
patet sales acidos magna copia inter oleosas
ptes ab iis potissimum ejus energiam pendere
Sicuti pleraque amara nidenta inter sto
machica numeratur. ventriculum roborat
appetitum languentem excitat, ciborum
concoctionem juvat flatus discutit, vermes
necat nec non urinas et menses promovet
sed maxime commendabilis in febr. intermitt
cas rite exhibitus tuto cito et jucunde sanat.
a ʒß ad ʒii infus ℥i in vin gen. rubr.
℔ i ad ℥vi pro dosi. decoct ℥i in aq.
com. ℔ iß ad 3ae ptis consumptionem
nonnunquam etiam idem decoctum in
enemate ad ℔ i pro adultis ad ℔ ß
pro infantib. ubi ab haustu horrent
aegrotantes

sed citius et tutius in saevitia quam
alio quocunq modo geri ... est
infusio cum vino longe efficacior quam
cum aqua
iteranda est ejus dosis quarta quaq hora
praemissis praemittendis, sanguinem ...
expandit et rariorem efficit
ubi paroxismi cessaverint continuandae
sunt doses per plures hebdomadas mi
nuendo
i. febrib. interm. post celebrata sangui
missione et catharsi sursum aut deorsum
vel si febris urgeat neglecta purgatione
modo si non turgeant viae
statim propinandum tertia quaq hora
nullum est certius curationis indicium quam
evacuatio cujus ope venenum febrile mi
nuitur et emendatur
attendendum an febris sit idiopatica vel symptomat.
in morbillis et variolis tempore declinationis
quoque adversus pestem utilissi...
phthisici nonnulli (teste r. Morton) pro
deploratis jam habiti vitam per plures
annos usu hujus corticis protraxerunt
attamen constat experientia pulmoni nocere

56 ℞ cort. peru. elect. in alkool redact ℥ I
syr. febrif. limon. cydon. absynt. papaver
rhae. diacod. decichor. composit q.s. m.f.
opiata dosis ad ℥ II tertia vel 4a quaq hor.
superbibendo haustum vini aqua diluti
vel ptisanæ pector. aut alterius liquoris
℞ cort. per. pul ℥ II vin. rubr. gen
℔ II misce, et macer. in vase clauso per
duos tres ve dies identidem agitando
liquor per inclinationem separatur ad ℥ VI
si valentius desideretur kinæ in pul ʒ add
℞ corticis kin. pulver ℥ I Bulliat in aq. stilla
scorzon. vel cichor sylvest. ℔ II ad ℥ XXVIII
f. colat. dosis ℥ VI vel sola vel cum vino febrifugo
sal nitri ʒ I potest addi
℞ pulv. febrif. ℥ I crem. tartar ℥ß pul
jalap ʒ I ℥ß syr. febrif. q.s. m. f electuar
dosis ad ℥ II in febr. cum hydrope vel
℞ cort. peru. pul. hieræ picr. galeni ā ℥ß
inf. in vin. gen. ℔ I per 24 hor. cyathum I.
℞ kin. pul. ℥ß gum. ammon. depur. ʒ I flo. benzoin ʒß balsa. copai ʒ II syr. febrif. q.s. f elect
dos ʒ Iß 4a quaq hora in pulmonum infarctu
cum febre

℞ cort peru. ℥I coq. in aq. stil. verben.
℔II sub fin. add. fol. erici. hedera. terr.
bugul. sanicul. pervin. alchymill. pipi
a p I. f. col. diss. syr. papav. rhoea. vel
tussila ℥II f. apoz. in 6 doses 1ª singuli
hor. in febr. cum purul. sputo.
℞ Kin. pul. ʒIIII theriacae veter. ʒI
syr. febrif. q.s. f. bol. divi in 4ᵒʳ dose coler
die horis medicatis in febrib. malignis.
possunt addi diaphor. min. ʒII sal am
ʒI syr Kerme q.s. ad diaphoresin
℞ Kin pul. ℥I sal ammo. martial ℈I
syr. febrif. q.s. f. elect. dosis a ʒI
ad ʒII 4ᵉʳ in die in pallida virginum
febr. cachecticis aut contumacibus
℞ cort per. ℥I croci mart. ap. ℥β pul
ari comp. ʒIII syr febrif. q s in f. elec
dos. ad ʒII ter indie in febre cachectica
chronica cum obstructione mensium suppres
℞ Kin pul ℥I discor. fracast. ʒII syr
febrif. q.s. in febr. cum diarrhe. tormin
et vomitu.

58. syrupus febrifug

℞ Kin pul ℥ II infund. in vin. rubr. gen. ℔ II per 3 dies identidem agitando, liquori per inclination separato affund. novi pul ℥ II diger. iterum per 3 dies infusum per philtrum plures trajiciat donec limpidius cum sacch. albi in aq scorso in elect cocti ℔ IV permisceat dosis ad ℥ II. infantibus commode usurpat.

R febr. ℞ Kin ℥ aq. vitae ℥ VIII dige per triduum identidem agitando per inclinati. secernat dosis ad cochlear. I^m vel ope ♁ et vin gene. ea simul misce cl. acida felicius febrem fugare quam alkalia itaq a gutt aliq spirit sulphu vitriol: inde compescunt

qui rectius de febrib. scripsit R. Morton. ex febricitantium sanguine major salis uri nosi copia quam ex sanorum extrahitur a salib. acr. et ptib biliosis seu sulphure adustis cum salib permistis fit nocivus humor. ille salino oleosus in nervorum genus I^{ario} irruit unde sympt. algor languor animi deliquium jactatio horror rigor

oscitatio, pandiculatio, vertigo dolores spasmodici debilitas pulsus ardor, sitis linguae ariditas. perturbato nervorum motu oscillatorio, sanguinis et liquor. motus minuitur secretiones supprimuntur dum vires sunt huic impetui sustinendo pares ex hac sanguinis segnitie totum nervorum genus commovetur successive ac tanta vehementia oscillationes suas restituit ut tandem totum corpus omni incalescat et motus restituatur.
iis successibus tumor repellitur et fibras cum sudoribus aut alia excretione amandat vel in partem aliquam deponitur. in labia nares &c unde exanthemata miliaria pustulae maculae petechiales, bubones alis et inguina, carbunculi furunculi tumores abscessus atque ulcera varii generis oboriuntur.
hinc energia ejus stypticio amarori et acidis particulis debetur.
febris causa inter. et antecedens est cujusdam solitae excretionis suppress. ex laxitate fibrar. nervearum quibus emunctoria huic evacuationi destinata componuntur.

60 amara sua spiritualitate fibras nimis laxatas restringunt acida vero acres causticos toxici febrilis sales retundit sic febrilia symptomata citissime supprimit febrium vero pestilentialium malignitatem emendare nequit aut saltem difficilius reprimit quamdoquidem causa non sit fibrarum laxitas tunc cardiacis valentioribus opus est salibus acidis valentioribus et oleis aromaticis ut sales fixiores et crass. attenuant

Kin. in gangrenis et sphacelis interest. mira praestat et aegros penitus desperatos sanitati restituit

praescribitur ad ℥β sub decoct. vel boli form. 4ª quaque hora partem gangrena affectam therebint. oleo vel alio quovis illiniendo

alia est Kin. species quae cascarilla seu cortex peruvianus griseus intubul convolutus colore intus ferrugin. sapore amaro aromatico odore ad ambaram acc. ad Kin. paululum accedit melior est

pulvis resolvens epositus sthalii
℞ pul resolv. ex testar conchar sine
ign. pp. antim. diaph. et nitri depur
ana p. aequ. fecit ℥iß extract. cascarill
cum aq ʒß m. f pulvis
in febre intestin. inflamator. seu dy
senteria. commendat quoque unn pillul
balsamic.

De Codaga-pala

apud malabaros et Zeylonenses nascit
cort. rubr. fusc et lacteo. saporis amari
et minus pungentis
commendatur in diarrhoea

Simarouba

colori ex albo
flavescenti, nullo odore praeditus saporis
subamari, lentescentibus fibris constans
candido levissimo insipido & radicum
stipitum ligno haerens a quo facile separatur
simarrouba gummi-resinosarum est p[illegible].
saporis non ingrati, levi amarore quo donatur
ventriculum conoborat; p[illegible] suis balsa
mico unctuosis quae ex lacteo colore quem
aquae in qua decoquitur impertit dignoscunt
dolores et termina compescit virtute adstringenti
et vulneraria qua pollet hemorrhagias et alvi
fluxus sistit ex quiniana [illegible] a[illegible]

62 anno 1718 d. De juvicea m. pari, dysentericos fluxus qui purgantib astrin ipsisq ipecacuanhae restiterant, debellavit in decocto ad ℥ii in aq. ℔ ii in pulvere qui radendo obtinetur non contundo ad ʒß

℞ cort. simaru. minutim sect. ℥ii in aq. com. ℔ ii ad ⅓ consumpt. in 4or ptes divi, 3a quaq hora sumend.

℞ cort. vel lign. simaru. pulver. ʒß in aq. pur. ℥ii dilue aut cum adianti syr. redige in bolum pro una dosi probe repetitis dosib. usq ad sanitatem

virtute antispasmodica stomachica narcotica vulgarib antidysentericis praecellit, astringentia longe superat quae non iisque fluentibus haemorroidibus aut mulierum catameniis interius praebentur.

evenit praesertim in seroso biliosis sanguinolentis mucosisq alvi fluxib in quib abest febris

Caput 3ᵐ.
De lignis

Agallochum seu lignum aloes. lign. est leve resinosum molle fere instar ceræ vel mastiches qd dentib et unguibus cedit, prunis q ingestum veluti resina fere totum colliquescit suavissimum spirans odorem sapore amaricante aromatico in fragmentis lignorum affertur ex cochinchinensi seu annamico regno affertur. frusta nonnunquam solida densa ponderosa colore spadiceo striis nigricantib et resinosis distincta interdum foraminata cavernulæ resinam subrubr. odor. continent oleo essentiali uberrimo pollet in lypothy syncope paralysi ad podagram rheumatism corroborant doris in subs. ad ℨi indecoi raro propter amarorem oleum ess. ad gutt XX.

Aspalathus et lignum rhodium lignum odore roseo in offi. occurrit qd rhodium ab insula rhodo, cyprium ab insula cypro etiam pro aspalato antiquor est subflavum pallescens per vetustatem rufescens durum tortuosum nodulis pinguib atq resinosis interstinctum - cor et cerebrum roborat

64 Guaïacum. off. lignum sanctum, indicum, lignum vitae, paulus sanctus. est solidum densum ponderosum resinosum parte interna quae matrix vel medulla di-quaes. exviridi nigricans aut variegatum ex pallido viridi fusco et nigro, exteriusque album num buxeum seu pallide flavescens sapore subamaro nonnihil aromatico odore dum incalescit aut uritur non ingrato. eligatur cortex ligno fortiter haerens qd plurimum nigri habet resinosum ex analysi constat ex sale acido vitriolico oleo et terra sub densioris resinae strictissime unitis ut vix separentur et sal ammoniac cum aliq proprii cujus pars volatilis urinosa avolat in distillatione insulis antillanis oleum guaiaci ponderosum et recens distillatum permixtum cum anatica spiritus nitri portione statim effervescit intumescit flammamque concipit peracta deflagratione fungosa remanet substantia rara levis insipida remanet

crassa incidit et attenuat lenta detergit obstructa aperit sudores urinas sputa juvat stomachum et alia viscera corroborat, internam hydropem aliaque vitia curat capitis

distillationes exhaurit podogram asth
maticos paralyticos stupidos curat
nervorum affectibus ulceribus cacoetheis
luis venereae pustulis. nullû corporis noxa
in calidis regionibus morbo venereo de
bellando sufficit modo ut decet curat
instituatur. dos. in decoct. ad ℥ß vel ℥I
resina ejus ad gr. VIII ad ℈II
℞ rasur. guai. ℥III corticis ejusd. ℥I aq
font ℔ VI macerentur per 24 hor. dein
bull. ad mediae ptis consumption. cyathos
3. 4or vel 5o singulis dieb. in lue venerea
℞ ligni sancti ℥IIII corticis ejusd. et lign
sassaf. a ℥ß lign. aloes ℥II liquir. ras
et mont ℥I sem. corian. ℥ß macerentur
in aq limpid ℔ VII per 24. hor.
deinq. ad medietatem add. sub fin. passular
℥ß
℞ lign sanct. in scob. ℥IV macer: per
diem in aq. com. ℔ IIII bulli. ad dimid
humoris diminut. sub fin coct. addantur
semin anis. ℥I turbith, hermodactyl
a ℥II colaturae capiat ℔ß mane jejuno
in paralysi et rheumatismo

66 tinctura et extractum pro sudo
riferi et diaphoreticis habentur tinct
ad ʒß extract. a gr IIII ad ℈II
℞ rad. minu. milleped ppp a ʒIIII
ol stillat. succi guajac a ʒß gum
amon pulv ʒI syr reg. super ℥ y
m. fiat opiata ad tumores carcinomatoso
decoctum guajaci laudatur in fluore
albo mulierum sub infectionis forma

Lignum nephreticum off
est arbor americana
lignum peregri. aquam cœruleam reddens
C.B.P. ex flavo pallescens solidum grave
saporis sub acris non nihil amarescentis
cortex nigrescit meditullium fuscum est
in aqua maceratam intra dimidium
horam eam mirabili opalis gemmæ
colore cœruleo et flavo tingit ita ut
ut modo cœruleus modo flavus appareat
cœruleus color evanuerit si acidulum
mor infundatur tum fit aureus si vero
oleum tartari aut alkali cœruleus restituitur
ad renum vitia et urinæ difficultate
urinam in leniendo movet necnon
obstructiones reserat in opilatione hepat et lienis: in hydrope

febres extinguit et cholicis medet
lignum assulatim et minutim cisum
in optima aq. macerat. dimidia post
hora aqua a bibente exhausta est et
nova affunditur donec aquae sapor mace
ratione non immutetur.
hujus tincturae cyathum unum seu ℥vii
singulo mane jejuno ventr.

De Santalis 3.^m flavum
vel citrinum off. lig: pondero
solidum pectinibus rectis sapore aro
mat. amar. cum acrimonia non insuavi
totum os implente, odore fragrante mos
chum et rosas aliquantisper aemulante
santalo citrino substituunt lignum ad
citri odorem accedens qd vulgo bois de citron
bois de coco, bois de jasmin, bois de chandelle
sed differt a santalo tum odore tum pec
tinib. brevibus et inaequalib. tum resinosa
substa cujus ope flammam facile capit.
Santal album et ruber inferiores sunt
virtute differunt colore tres species
sale ess. acido oleo spisso et aquâ graviore
exiguâ salis volatilis portione et multa terra
donantur.   nascitur in indiis orientalib.

68 vis incidendi attenuandi astringendi et roborandi ipsis tr. buit
dosis in subst. ad ʒi in decoct ad ℥β
℞ Sant. citri. et rubr. minut concisor a ℥ii macerent in aq. ℔ii per hor 24 coq. s. a. ad ⅓ consump. f. apoz. propinetur solito
℞ rasur. lign. sant rubr. ℥i coq in aq. limp. ℔ii ad mediet. add syr granat. ℥ii. f. apoz in haemorr. et hepatis obstruct.
In febrib ardentib ad capitis dolorem sedandum exter. admovetur santalum rubr sub epithematis forma.
℞ sant. rubr. pulv. ʒi mic. pan. ℥β aceti rosat q. s. f. cataplas. seu epithem cui add. sp. vin. camphor ℥β fronti applicetur in capitis dolorib a febri ardent oriundis
Sassafras sive lignum pavanum
lign. ex rufo albicans rarum et leve cortice fungoso foras cinereo intus ferrugineo sapore acri subdulci aromatico odore fragrant. ad foeniculum accedente ex virginia et brasilia

vis ejus fere tota pendet ab oleosis partibus tenuibus summe volatilibus et essentialibus cum acido tenuiori raro et expanso consociatis,
diaphoresim sudorem et urinam promovet, humores crassos et lentos incidit et resolvit, viscerum obstructiones reserat valet ad cachexiam chlorosin et hydropem, podagricos dolores lenit paralysi et catharrosis affectionibus frigidis medetur. in morbis venereis utiliter adhibetur. dosis pulveris ℥I saepius infus. vel decoct. ab ℥ß ad ℥II
℞ lign. sassa. cum cortice in scob. redact ℥I inf. per noct. in vin. gen. ℔I exhibe per cyathos in catharro et fluxionibus frigid
℞ sassaf. minut incis. ℥II infun. per hor duodec. in aq. limp ℔IIß coq ad ℔II exhibeatur per cyathos
℞ sassaf. guaii. salsaep. a ℥Iß macerent coq in aq ℔IIII ad ⅓ dim. tres cyathos indie in paralysi catharris et morbis venereis ejus oleum ess. a gutt. III ad XX sudorifica huj. oo pars I cum ⊕ II flamma concipit et resinosa substa remanet

Caput 4^m

De Plantis quibusdam maritimis

De corallis et Madrepora

Corallum est planta maritima sub undis nascens absque foliis, fere lapidea ramosa, densa et solida fragilis, cortice seu potius crusta quadam tartarea molli tamen obducta colore diverso, sanguineum carneum flavum fuscum album variegatum. duo notata rubrum et album
rubrum in mediterra. mare circa gall provinciam et alias. non minus sub undis quam extra undas durum re vera sub undis molliori tegitur cortice qui aëre exsiccatus paululum induresci͡t.
non tanquam mere absorbens habendum est sed sale volatili urinoso et oleo bituminoso donari cum terra conjunctis a quibus energia pendet
astringens et mediocriter refrigerans ex dioscoride dosis ℈ ∂1 ad ʒ1 corroborat venenis resistit. corallum in alcohol ante ponendum quibus cumque praeparationibus

sub coralli albi nomine occurunt 71
in off. madreporae species fere liquidam
a corallo discrepant foraminibus parvis
intus cavae

Corallina ramusculis numerosi
ssimis gracilib. fragilib. geniculatis
substa foris tquam elimo circumnato
lapidescenta colore vario odore nauseoso
pisculento sapore salso ingrato sub den
tibus lapillorum instar crepitans et facile
trita in pulverem fatiscens vix sesqui
unciam aut duas assequit in neapolis
reperit
constat sale volatili oleoso copioso multa
terra implicato
a dioscor. ad collectiones cohibendas et po
dagrae ardorem temperandum
hodie facultas vermifuga plurim. celebrat
exhibit in crassiusculum pulverem trita
a ʒß ad ʒi
℞ corallinae, corticis mori arboris a ʒi
rhei pul. rad filic foemin. summita
tanaceti a ʒß aethiop. mineral. ʒii m
f pul dosis a ʒß ad ʒii

Caput 5.m

De Surculis quibusdam folii et floribus

Calamus aromaticus verus caulis est plantæ arundinaceæ instar calami aut tubi cavus tenuis avenæ vel calami scriptorii crassitie geniculatus foris pallido flavescens intus candidus medulla fungosa levi aranearum telis seu filamentis in se collapsis sapore acri suaviter amaricante odore fragrante spudiados et in ceginhia ventriculum roborat et coctionem juvat

Schœnanthus seu juncus odoratus. culmus est cum foliis ex arabia delatus. aridus, rigidus, teres, nitidus geniculatus pedem circiter longus medulla fungosa farctus colore ad radicem pallido prope verticem viridi aut purpurascente sapore fervido sub acri amaricante aromatico non insuavi palearia simili

oleo essentiali aromatico turget sed rarioris est usus

adhibetur ejus pulvis ad ʒj decoct. 73
in vino vel aq. ad ʒij in obstructis
visceribus utero hepate liene in ventri
culi inflatione et urinæ difficultate

Malabathrum seu folium indum
folium est folio cinnamomi simile a
quo differt odore et sapore. oblongum
nempe acuminatum densum et glabrum
tribus a pediculo ad apicem discurrentib
nervis distinctum odore non ingrato
aromatico ad caryophyllos accedente
easdem cum nardo vires sortitur
sed efficacius

Senna vel follicula orientale. folia parva sicca sub
pinguia, firma acuta et veluti lan
ceolata ex viridi flavescentia, odore
tenui non prorsus ingrato, sapore
subacri amaricante nauseoso
duplex alexandrina seu Zeidonensis
aut sidonia gal. sené de Zeide ou de la palte
alia quæ foliis minus acutis tripolitana
nuncupata priori longe inferior foliis
læte virentibus amplioribus sed acumine
obtuso asperis tactu

74 praeterea occurrit senna mechano
cujus folia angustiora et longiora et acutiora
nec non senna italica cujus folia majora
latiora extremo subrotunda et venulis
eminentib dicta prioribus longe inferior.
fructus etiam in usum veniunt folli
culi dicuntr. siliquae sunt membranosae
oblongae incurvae planae compressae
colore ex viridi rufescente aut subnigro
in quibus acini compressi
constat ex duobus salium generibus
ammoniacali uno tartareo altero
oleo crassiori copioso simul conjunctis
unde compositum exurgit gummoso
resinosum a quo purgandi facultas
virtute purgandi per inferiora insigni
donatur nec ullum frequentius catilius
ejus tinctura in ptisanis aut jusculis lar
go haustu epota egregie et minus mo
leste purgat quam in parva aquae dosi
lenientia et mucilaginosa ejus vim
minuunt resinosas involvendo ptes.
observandum valde nocere inflamat

itaq. abstinendum in haemorragiis
inflammatt. et morbis pectoris
folliculi intestina minus torquent
sed longe debilius purgant
raro in subst. a ℈I ad ʒI quoniam nimia
moles et majora tormina parit
in infus. vel decoctione levi a ʒ ad ʒß
ingratum saporem emendant foliis
iquetaiae ex brasilia allatis quae sunt
folia scrophulariae aquaticae majoris
℞ fol. sen. mund. et fol. scroph. aqu.
in umbra exsicc. a ʒII his affund.
aq. calidae ℔I. macerentur donec aqua
refrigerata sit hauriat aeger per vices
ad alvum subducendum.
℞ fol. senn. a stipitib. mund. ʒII sal
absynt. ℈I macerentur per noct. in aq
℥VI f. colatum. sumat aeger jejuno
℞ fol. orient. repurg. ʒII mann. vel
ʒIß rhei el. min. incis. tartar. solub
a ʒI affund decoct. prunor. vel pastular
℥XII macerentur tepide per 6 hor. f.c.
in duos haustus divid.

 ℞ senn. orient. ℥II sal. polychr. ʒI
infund in aq. tep. ℥VI per 6 hor. f.
colat. quâ diss. elect. diapr. solut. ℥II
syr. flor. persic. ℥I f. pot. catharti[ca]
mane duabus horis ante jusculum su-
menda
℞ senn. mund. ʒIII mann. cal. ℥II
tart. solub. ʒIß sem. coriand. ʒI gly-
cyrrhi. exsicc. ras. et cont. ʒI malum
citreum in taleolas concisum unum
his affund aq. bull. ℔II macerat.
per 6. hor. et fiat colat. per vices hau-
rienda
ejus extractum majores ventris [e]ver-
siones excitat dosis ad ʒII

Dictamnum creticum

sub hoc nomine in offi. prostant folia
subrotunda uncialia subvirentia tomento
quodam spissa que lanugine pubescentia
cauliculis saepe inhaerentia ex quorum
summit. velut spicae squamatis foliolis
compactae dependent purpurascentes odore
fragranti non ingrato sapore acri
aromatico fervido ex cretâ insulâ referun-
tur origanum creti. latifol. tomentosum 1. v. h.

oleo ess. uberrimo cum sale volatili
cjuncto donat ut ex odore et sapore cjicere
licet
ejus pulvis ad ℈I in fus. in vino a ℨI
ad ℨß ad partum accelerandum molam
fœtum mortuum vel secundas propellendum
tum in febr. malign. et adversus venena.

Thee et thea folium est parvum
exsiccatum c̄volutum saporis subama
ricantis leviter astringentis non injucundi
odoris blandi fœnum recens et violas
œmulantis q͡d ex sinarum imperio
et japonia affertur
tres occurrunt. vulgatior thea viridis
cujus folia arctissime c̄voluta sunt
subviridia gustu leviter astringentia
odorata et colore pallide viridi
aquam inficiunt
altera pretiosior thea imperialis dr
q͡d magnatib. apud sinas servatur et japones
folio est amplo laxo seu minus c̄voluto
colore virente-vivido odore subtili et
grato
3ª species rubra dr vel subnigra vulgo
Bohé folium est parvum c̄volutum

78 aquam colore fusco tingit saporem
odoremq theae viridis ad rosam accede
refert. omnes hae species ejusdem arboris
differre tantum tpore colligendi et praeparandi
blanda donati astrictione odorem subtilem
et gratum exhalat unde concludere licet constare
salis volatilis oleosi portione cum terra as
tringente conjuncti, sua astrictione ventri
culum roborat et impedit fibrarum laxationem
a nimia aquae tepidae potu,
alvi fluxib et dysenteriis confert aqua vel
lacte exhibitum.
p[ar]tibus aquosis et volatilibus sanguinem ra
riorem efficit lympham spissiorem atte
nuat sic diuresim et transpirationem movet
capitis dolorem sedat catharris laborantes
sublevat si post largam theae potationem
ad sudorem se componant, virtus autem
ejus antinephritica non a foliis sed ab aquâ
calida quae sales acres dissolvit et foras a
mandat
nec prorsus tamen innocuus ō oib̄ evenit
fol. theae ℥i infund. in aq. ferven. ℔ I
macerantur donec aqua coloretur, et sorbillando
sumatur.

℞ fol. the pul ʒβ sacch. ʒıı projice in lactis ferventis ℥viii diserant donec lactis fervor imminutus fuerit hauriat aeger in alvi fluxu et dysenteria praemissis praemittendis

qui tussi laborant aliquam lactis portionem cum theae infusione permiscent

Stœchas arabica sic nuncupantur flores seu summitates floridæ et capitula exsiccata oblonga squamata purpurascentia, sapore subacri, amaricante odore fragrante non ingrato ex insulis stœchadib et gallia narbonensi

oleo ess. pollet a quo pendet odor et energia in affectib capitis et nervorum frigidis urinam et menses ciet et venenis resistit mesue hanc herbam pituitam et atram bilem purgare asserit sed tarde etiam benelliter. oleum ess. eodem modo extrahitur et iisdem virtutib ac lavendulæ.

Crocus safran filamenta exilia inferius tenuiora albicantia aut pallide flavescentia superius latiuscula subtiliter crenata e rufo punicea odore peculiari

 jucundo acri aromatico subtili et late spirante oculos aliquantulum mordicante modice caput gravante soporemque conciliante, sapore amariusculo pars albicans a crocea separata et rejicitur in sola mundo tenui calore exsiccatur et pulverisatur. in sicilia italia gallia &c aperit digerit resolvit et nonnihil astringit sanguineam molem attenuat spiritus recreat unde cordialis dicitur in syncope palpitatione cordis et adversus venena stomachum pulmones a pituita nimis spissa liberat serum acre demulcet tussim compescit unde animum pulmonum apud quosdam in asthmate et tabe feliciter usurpatur menses movet et foetum. amatus lusitanus refert mulierem ab epoto croco duas puellas colore luteo tinctas peperisse. praeterea vi donatur anodina dolores mitigat et ad somnum provocat saepe etiam cum opio sociatur.

in collyriis ad inflammationem compescendam in variolis et morbillis in cataplasmatib ad inflammationes et erysipelas demulcenda et tumora paralytica excitanda.

tamen moderatus et opportunus debet esse ejus usus. adeo abstinere debent mulieres gravidae aut nimis menstruatae praeterea vi inebriante donatur caput gravat mentem perturbat
dosis in subs a ℈β ad ℈1
℞ croci ℈β cinnamo ℈1 dictam cretic ʒβ m f. pul in partu difficili
℞ croc. pul. gr XV myrrhae boracis a ℈β s.q. conserv. flor. lavendul. aut calendul f. bol.
℞ croc. pul. myrrhae a gr XX aloes ℈1 cum syr. de artemisi f. bol. ad menstrua
℞ croc ʒβ infund in vin alb. gen. ℥V cum succo mali aurantii unius digerantur. ad menses
℞ croc. ℈I antihectici poter. ʒII radix ireos flor. ʒβ cum balsam. sulph. anisat gutt XX conser helenii ʒβ m f. opi dos ʒ1 bis terve sumenda in phthysi incipiente
℞ croc. sal. volatil. succi. flo. benzo a ʒβ gum. ammo ʒ1 conser. flor. anthos ʒβ f bol. dosis ʒ1 bis terve in die ad asthma

℞ milleped. ʒIII gummi amon. puri ʒIß flor Benzoin ʒI croc. balsam peruvi a gr XV balsam sulph. q.s. f. massa pilul. dosis gr XVIII ter in die sumen. in tussi chronica scrophulosa et phthysica ad tubercula cruda pulmonum praecavenda, a D Morton sub nomine pilular. balsamic. commendat.

Pilulae Mortoni

℞ croc. pul. ʒI sem. aquilegiae ʒVI tartar. vitriol. ʒß conser. cynorrhodon q.s. opt. in 7. divi. mane jejuno, projiciens

℞ aq. rosa. plant. ā ʒII croc. pul. gr. VI f. collyr. pro illiniant. oculi inrandoli inipia

℞ aq. foenic ʒIIII croc. gr XV tere in mortario dum aqua colore aureo tincta appareat tum liquor per inclinat. secernatur et cum vin. albi tantundem misceatur. f. collyr. in ophtalmia

℞ mica pan. albi manib attrit lacti vacci. q.s. coque. movendo add. sub fin. vitell ovi unum croc. pulv. ʒI f. cataplasm anody. ad tumores inflam resolv. et dolor. sedand

℞ croc. ʒß tachamahacae ʒi fuliginis ʒii terebinthinae q. s. ad emplastri consistentiam febrifugum in carpis ad ... ante paroxism

℞ croc. capitur. a ʒß includantur simul sacc. expans. scarlatino et de collo suspendatur circa scrobiculum cordis ad febrim

Caput. 6

De fructibus et seminibus

Palmulae vel caryotae et dactyli, dattes sunt fructus oblongi rotundi pollicis crassitie, digiti longitudine figura glandium compositi ex pellicula, fulva, tenui, carne seu pulpa pingui, firma, eduli dulci, et ossiculo crasso oblongo duro per longitudinem sulcato. optimi ex tunetano regno qui in hispania nascuntur nunquam bene maturi. ex regno salonae facile corrumpuntur palmis fructus sunt arboris quae dicitur palma major in africa italiâ meridionalib. galliae provin succo pollent viscido et dulci quasi melleo qd in syr. consistentiam inspissatur si ad fermentandum reponatur vinum fit ac idem acetum decocti ad decocta pectoralia cum jujubis pas. sulis et ficubus frequenter adhibentur.

84. ℞ Dactylos a nucleis mundatos N° X
ficus n° XI glycyrr. ras. et cont. ℥ii oriza
mundatae et lotae ℥i decoq. in aq. limp.
℔ iiii ad ℔ iii f. col. per cyathos propin.
moderate astringunt cohibent alvi fluxion.
uterum et foetum roborant. abstergunt
leviter et organa pneumonica demulcent.
sunt tamen oculorum vitia orienti genti
dactylis et orysa vescenti sub dio et in rore
dormienti balneis demum crebrioribus assuetae,
familiaria et vernacula

Jujubae et Zizypha. fructus sunt sub
sole aliquantisper exsiccati rugosi forma
et magnitudine olivari constantes pellicula
crassiusculâ ex luteo rubente pulpâ
subalbida, molli, fungosa, et ossiculo
oblongo, utrinque acuto, rugoso, saporis
dulci et urinosi
eligantur recentiores majores ponderosiores
minus flaccidae, carne intus multâ succu-
lenta, laxa et dulci vinosa tamen.
colitur vulgo in gallo provincia
constant ex partibus oleosis salino acidis et
terrestribus adeo involutis ut mixtum dulce

et glutinosum inde exurgat a quo vis eorum pendet. mistam illud differt a melle et saccharo lentore majori ob uberiorem terram Galenus dicit stomacho inutiles esse imbecille nutrire et difficile coqui. In mucagine hu mores leniunt et acrimoniam obtundunt non in oib pectoris affectib in iis solum ibi irritationes tusses asperas pituitam acrem demulcendas ardori urinae et vesicae ad inspissandum non vero attenuandum

Sebesten vel myxa fructus sunt parvis prunis similes, nigricantes turbi nati in vertice acuminati, rugosi, semi ex siccati, calyci insidentes facile cedenti acetabuli instar cavo. Constant ex pulpa fusca, viscida dulci, pertinaciter adhae rescente ossiculo, quod alias tribus costis donatur alias compressum pruni nostratis ossiculum imitatur. in aegipto et oriente componuntur ex ptib oleosis salino acidis et terrestribus unitis unde dulces et glutinosi magis lentum et tenax quam jujubae ob majorem olei quantitatem et salis al Kali tum volatilis tum fixi, unde vis attenuandi et resolvendi et demulcendi in tussi ex acrimo in dyspnea pleuritide et vocis raucedine.

 ℞ hord. mund ℥ß glycyrr rasæ contu ℥iß bull. in aq. com. ℔ııı ad ⅔ dim sub fin. add jujub et sebest a Nº XII decocto ab igne semoto injice flor tussil et papav. rhœad. a ℘ macerentur per cyathos exhib

℞ gram. mund. et contus. ℥ı sebes Nº XV jujub N XX bull. in aq. com. ℔ıııı ad 4 ptis consumpt fiat colat. per vices exhib. in ardore urinæ

uvæ passæ seu passulæ st fructus maturi vitis viniferæ vel caloris exsiccati vel solis unde dulciores vel clibani unde dulco acidæ tria passular. generis maxim. seu dadamas damascen. minores seu passes vel gores nostrates, et minimæ quæ corinthiacæ aliqui monspessulani uvas passas parant fervente lixivio addito olei paululo immergendo quoad flaccescant ltum et corrugentur deinde perticis imponunt binos ligatos filo racemos ut siccescant ac post triduum quatriduumve insolant

ex uvis passis in aqua fervente choris macerati et fermentatis vinum efficitur

succo dulci et melleo pollent minus viscido quam jujubæ aut sebesten

humores crassos et tenaces diducunt et crudos ad coctionem disponunt.
admodum astrictoriae sunt si cum acinis seu gigartis edantur ... jaquntur in dysenteria in alvi fluxu et hepatica ... in febrib. inflammatoriis ... bile. bilem enim atterunt et humorum effervescentiam adaugent.
in ptisanis ad humorum acrimoniam ... gigartis exemptis. thoracis pulmonum praescribuntur ad ℥ I pro singulis liquoris ℔
℞ passul. damasc. exacinat. et minutim concis ℥ IIII coq. in aq. ... ℔ IIII ad ℔ III col. pro decocto pectorali.
℞ hujus decocti et aq. calcis a ptes aequ misc. et ad ℥ VI bis terve in die ... efficax remedium ad catharrales affectus
℞ rad. sarsaepar. ℥ VI uvar. corinth. ℥ VIII coq. in aq ℔ XII ad $\frac{1}{4}$ dim. colaturâ ex ... calcis vivae ℔ ß subsidat liquor et limpidus per inclinationem separetur.
in affectibus catharrosi pulmonum ulcerib et strumis ℥ III pro dosi ter quaterve die iteranda.
℞ uvar. pass. gigartis exemptis ℥ II liquir ras. et conc. ℥ I coq in aq. com ℔ III ad ℔ II

sub. fin add. fil. sem. ℥iiii macerati tepido per hor. 1 aut alterum f. col. per cyathos exhi. blandum erit purgans nec ingratum

ficus passæ seu caricæ sunt ficus maturæ in sole exsiccatæ. 3ª genera magnæ et flavæ quæ ficus pingues dicunt. magnae et violaceæ. ac idem parvæ quas massilienses gustu suavitate præstantiores. eligantur, molles, graves cute tenui, molli succo intus et semine flavo et plane melleo sapore

caricæ maturatæ mediocriter nutriunt alvum molliunt pulmonibus renibus conducunt. earum frequentior usus flatum generat carnem laxam fungosam efficit eas cavere debent qui viscerum obstructionibus sunt obnoxii. est post ficus sumptas affatim bibendum ne in ventriculum putrescant et febres putridas accendant

exsiccatæ spissiores pectoris humores coquunt maturant et expurgant renes ab arenulis liberant, partum faciliorem reddunt. pustulas exanthemata et sudores provocant unde in morbillis et variolis. earum decoctum in plumbariorum colicis affatim epotum

tumores et abscessus aurium ad suppu-
rationem perducit
Mithridates de antivenenum paravisse ex
foliis rutae N° XX caricis V II nucib. jugl
siccis N II simul tritis cum grano salis
caricae tamen bilem fermentant et rarefaciunt
unde bilescere dicuntur sicut mel saccharum et
caetera dulcia, unde in febrib. bilio et
hepatis et lienis inflam. vitandae.
cavendum ne nimia quantitate assumpeantur
indecoctis ne viscidiora ventriculum gravent
℞ liquir. exsicc. ras. cont. ℥ I caric. N° XII
coq. in aq. com. ℔ I ad medias colet et
fiat julap. cochleatim in tussi vehem.
ad acrimoniam demulcend. et expectorat. pus
removendum
℞ ficuum pingu ℥ II contus macer. in
℥ ℔ I ß per diem integr tincturam
exprime et accende ad syr. cõsistentiam
per cochlearia in tussi raucedine et asthmate
℞ caricas duas macerentur per noctem
in aq. vitae asthmaticis mane comedendae
℞ fol. hyssop m. I caric. N° VI bulli
in aq. limp. ℔ II ad medias col. in
asthmatis paroxismo calide exhibendum

9° oryssæ mund. et lotæ ℥ß ficus pingues
et dactylos enucleatos a № VI jujubas
select a № XII passul. ab acinis purgat
℥VI fol. pulmo. capill vener. a m. i.
flor. papav. rhœad. et tussilag. a
p I glycyrr. exsiccat. rasæ cbus ℥iß
bull. in aq. com. ℔ VI ad 3^x. ptis dim
colet decoctum pectorale.
℞ rasur. C.C. ℥ß caric. ping № XII
sem. aquil.^{rr} fœnicul a ℥II f. decoct
s. a. in s. q. aq. com. per cyathos
calide exhib. ad variolas et morbillos
eruptionem juvandam.
℞ ficus ping. exsicc № XII minutim
concisæ macerantur calide per 3° hor.
in lact. ℔ i dein bull. leviter et decoct
percolatum servetur pro gargarismate in
faucium et tonsillas. inflam.
Caricæ externe in cataplas. torrefactæ
vel coct. in lacte tumores coquunt dis-
cutiunt maturant. - cum fermento et
sale tritæ bubones pestil. ad suppu. bravi.
hæmorrhoidib dolentibus dolorem cito
sedant.

Myrobalani fructus sunt inter 9!..
se diversi exsiccati
citrinae. offi. oblongi rotundi turbinati
quindecim lineas longi. 9. lati utrinque
obtusi. quinque utplu. striis majorib
disjuncti cum totidem minoribus intermediis
includunt sub cortice glutinoso et gummoso
sesqui lineam crasso, amaro, austero, et
subacri, ossiculum dilutioris coloris angul.
oblong. et scrobiculis quasi excavatum
cujus nucleus corneus candidus tenui mbrana
fulva obducitr
chebulae offi citrinis majores colore obscu
viridi intus ex rufo nigricante pulpa
crassiore
indicae seu nigrae. offic citrinis minores intus
bituminis instar splendentes excavati
dentib adhaerent salivam exprimunt
Bellivicae. off. nucis moschatae fma ad
flavedinem vergentes uncium longi 10 lin
lati carne minus solida chebulis aut citrini.
Emblicae, sphaerici ferre 6 angul.
e cinereo nigric diametri semiuncialis
omnes in indiis orientalib
aqua in qua macerata fuerunt chartam
caeruleam purpuream efficit pptr salem
essentialem acidum

 analysi chymica sulphuris copiam multum liquoris acid. salis fixi paululu cum abundante terra
recensentr inter medula quae alvum citra noxam solvunt sua astrictione roborant, quapropter in alvi profluviis et dysenteria ubi simul purgand. et astring vim purgant. valentior. cohibent
sed infarctus et obstructione augent dicunt omnes praescribunt analica dosi ad ʒI in infus. vel decoct. levi. in subs. a ʒIV minime in subst. purgare sed astringere asserunt: infus. blande purgat
decot. magis purgat et astringit
mesue dicit ab earum usu senectutem re morari corpus floridum et juvenile servari
℞ myrobal. citr. pulver. ʒI rhei pulver ʒß syr. de cichor. comp. q. s. f. bol ad purg in alvi flux.
℞ myrobal citri. tost. pulv. ʒI nucis mosch. ʒß laudan opiat. gr.ß conserv. rosar. rubr. q. s. f. bol astr. in alvi fluxu
℞ quinque mirobala crassiu. contus a ʒI rhabar ʒI maiore. in aq. cal ℥VI per 6 hor. f. colat. syr. rosar pall. ℥I f. potio purg. in alvi fluxu

℞ quinq. mirobal. cassiae. pulv. ā ℥ii
rosar. rubr. ℥iii macerant in aq. comm. ℔ II
supra cineres calidos f. colat. cui add.
syr. berber. vel granat. ℥i hauriat aeger
per cyathos in alvi fluxus
℞ mirob. citrin. contus. ℥ii macer. in aq.
rosar. et plant. ā ℥iii f. colat. pro collyrio
in ophtalmia
Colocynthis fr. sphaericus pugni
magnitud. pulpa exsiccata fungosa quasi
cellularis foliolis membranaceis composita arida
candida levissima ad nos affertur exempto
cortice flavescente sapore intense amaro
acri, cum immersis seminibus exiguis
compressis duris albis vel rufescentib.
eligenda est medulla candida, arida
rara laevis et intenso amarore praedita
nascitur insulis maris aegei. ex alepo affert.
duplex inest in colocynthide partium
genus oleosarum et salinarum quae
quidem propria in aliis purgantib. valentiorib.
observare licet tabaco elleboro.
haec autem oleo acerrimo pollent cujus proprium
est nervos irritare et vehementer convellere

94 si enim olei tabaci guttula vel minima in animali vulnus inseratr convulsiones statim patitr per totum corpus et brevi moritr
ab oleosis particulis catharticor valentior actio potissimum pendet ab iis nervosae intestinor membranae vehementer succutiuntr unde fortius compressae viscerum glandulae humores propter suam spissitudinem in illis stagnantes exprimunt et ad intestina propellunt. ad illud quoque confert aliud proprium scil. particulae salinae acres tum fixae tum volatiles quae vasor ostiola subeuntes vasa peragrantes cum succis permiscentr. eos solvunt et colliquant et saepe totam sanguineam massam laxant hinc uberior serosor humor. affluxus ex toto corpore ad intestina jam oleosis partib stimulata
colocynthis purgans est valentissimum ad humores crassos et lentos vacuandos pituitosos potissimum quos ex distantissimis et reconditissimis partib educere opinantr. in morbis inveteratis et contumacibus in affectionibus nervor. articulor. obstructionib

in cephalalgia hemicrania inveterata apoplexia epilepsia vertigine asthmate dispnoea morbis articularib frigidis dolore ischiadico. colico flatulento hydrope lepra scabie deniq ubi malo nodo malus cuneus quaerendus non enim curamus graves morbos inquit C Hoffmann quia nunquam expedimus a lenientibus
praeterea menses movet
vehementer ventriculum viscera corpusq totum conturbat nervos laedit et non numquam vehementer concutit venas aperit et sanguinem elicit intestina corrodit gravibus torsionib itaque caute adhibeatur
plures ejus noxas emendare tentarunt sed illarum emendationes admittendae quae ejus substiam extendere valent
si fortiter purgare velis pulpa adhibeatur accurate trita et divisa qualis sub trochiscor. forma adhiberi solet
si minus vehementi sit opus catharsi decoctum colocynthidis ex aqua vel vino in quo eadem infusa fuerit. vel extractum cum aqua vel cum musto fermentatio

 extractum vero cum spiritu vini minus purgat et longe majores ventris cruciatus gignit
Dioscorides hanc pulpam ad quatuor obolos jussit cum aqua mulsa, melle cocto, myrrha et nitro sub forma boli vel pilulae exhibendam. pulpam subtilis a gr v ad Ə1 tenuissime trita. in decocto vel infuso a Ə ß ad ʒ1 sed raro propter amaritiem in decocto pro enemate ad ʒ1 vel pro apoplectico ad ʒ11. rite percolandum ne supersint ramenta aut membranulae colocynthidis quae intestinis adhaerentes horrenda excitant symptomata
Si nimia colocynthidis dosis exhibita fuerit ita ut hypercatharsis aut convulsiones superveniant vel metuendae sint curantur oleo affatim epoto et in intestina injecto.
in morbis acutis raro prodest nec convenit biliosis et fervidis nec pueris nec senib nec praegnantib
trochisci colocynthidis in offi. arabica nominatione alhandal dicti dosis a gr VI ad ʒß

℞ pulpæ colocynth. minutis. incise ℥ß infund in vin alb ℥VI macerent per noctem. trajiciatr vinum per chartam emporeticam quo dissolvatr mann calabr. ℥I. fiat potio catharticu.

℞ trochis. alhand gr XII pulp. cass recens extract et mundat. ℥I m. f. bol ex pane azymo devorandus.

℞ trochisc alhan gr X scam. gr VI el diaprun ℥ß f. bolus

℞ trochisc alhand. gr VI pulv. jalap gr XV aquilæ albæ gr X cons. rosar q. s. m. f bol.

℞ extract colocynt gr VI aloes lotæ ℈I croci pulver gr X cum syr. de absinthio m. f. bol. ad menstrua provocanda

℞ pulp. colocynth ℥Iß radic. pyrethri ℥ß coq. in aq. com. q. s. ad ℥XII add colaturæ vini stibiati ℥III sal. gem. ℥II f. enema in affectib soporosis in apoplexia exterius umbilico admota cum felle bubulo non solum alvum dejicit sed vermes necat et expellit. quin etiam odore et tactu alvum movere dicitr

praestantissimum colocynth. extractum
℞ pulp. colocynth. ℔ I exemptis sem. bulliat
in aq. Cim ℔ XII per sex vel octo horas
fiat colatura cum forti expressione tum
massae residuae nova affundatur aqua
eadem quantitate. bulliat. et adhuc 3a
vice iteretur. tum decoctiones simul
evaporentur ad extracti solidi cosistentiam
oleo quodam essent. aromatico irrorando.
blande purgat a gr IIII ad XV

Cassia solutiva, cassia nigra,
siliqua aegiptiaca offic. siliqua est
teres et cylindraica cubitalis, unciam
circiter crassa, c̄posita ex putamine lig
noso, tenui duriusculo foris ex spadiceo
nigricante intus flavescente in varia local
a dissepimentis transversim positis parallelis
ligneis tenuibus medulla in his inclusa
molli nigra mellea subdulci cum acredine
in qua delitescunt semina oblonga depressa
dura fulva nitida
altera orientalis seu alexandrina et aegiptiaca
cortice tenuiori intensius nigricante pulpa
dulci nec ingrata gustu

altera occidentalis in americanis insulis
maxima copia et minori pretio cortice
crassiore magis aspero et rugoso medulla
acri et nauseosa aliae longe inferior
eligendae ponderosae recentes plenae mutae
non situ obductae
medulla in usum sola venit quae propter
extrahitur e siliquis et per setaceum tra
jicitur
in pulpâ cassiae inest sal acidum volat
aliud fixior qui non nisi igne violenti
cum oleo pellitur. parum salis urinosi
et mediocris terrae portio.
pulpa cassiae vim suam obtinet a sale
essentiali cremori tartari simili sed
tenuiore seu terreis particulis minus implicito
et oleosis blandis magis temperato
pulpa cassiae facile acescit. eademque
aquâ plurimâ diluta per plures menses
in dolio asservata salem essentialem cre
mori tartari plane similem deponit
catharticum est benignum et innoxium
omni sexui aetati temperiei gravidis et
puerperis. in febrib. ardent. et inflamator
in affectib. pectoris renum et vesicae.

 non solum ut catharticum magna dosi sed etiam ut alterans parva dosi et usu diuturno praescribitr in affectib. rheumaticis arthritide cathartico calculo haemorrhoid. cephalalgiis hemicraniis &c.
medullam cassiae infantibus recens natis exhibitam, colostrum in intestinis stagnans purgando eos a variolis immunes facere plures asserunt. ℥II vel ℥III. jusculi vitulini aut seri lactis ℥VI dissolvuntr et cochleatim exhibentr intra octo vel duodecim horarum intervallum antequam mammis admoveantr.
praescribitr medulla a ℥II ad ℥IB decocta vero ab ℥B ad ℥IIII in potion. vel enematib.
℞ medull. cass. recent. extract et mundat ℥I rhei pulver. ℈I cremoris tartar ℨB m. f. bol jejuno. superbiben. jusculum ex carne vitulina.
℞ medul e siliq aegiptiaca extract. ℨVI pulv. cornach ℈I f. bol. superbibendo seri lactis vel ptisanae cyathum unum
℞ pulp cass ℨB rhei pulver ℈I pulv jalap gr XII aquil. alb. gr X syr flor persic. f. bol.

℞ cass. mundat ℥ß sacch. candi glycyr
pulver a. ʒß fiat. bol. ineunte prandio
vel cena sumendus ad alvum emolliend.
ad arthritidem praecavendam aut lithiasim
et ad catharrosos affectus
℞ floris cass. et pulpae tamarindor
a ʒii m. f. bol paulo ante pastum
exhibendus ad melancholicorum aut
histericarum alvum segniorem aut
nimis astrictam emolliendam et sub
ducendam.
℞ medul. cass. alexand. ℥i syr. violar
vel flor. persic ℥i dissol. in seri lactis
vel ptisanna pector. vel tinctur folior
senn. aut decoct. tamarind ar ℥vi
f. potio
℞ fol. senn ʒ rhabarbari et tartar
solub a ʒi macerentur per noct. super
cineres calid in decocti gram ℥xii
tum manna calab ℥iß in hac infusione
liquescat. f. colat. qua diss. syr. rosar
pallid. ℥i medul cass. ℥iß div. in
2as doses 4or horar. intervall exhibendas
interjecto jusculo

 ℞ medull. cass cum nuclei extract
℥i mum. calabr ʒiß rhei elect, sal
veget a ʒi bull. leviter in liquoris c
venienti ℥vi f. col. 3t. hor. ante jusculum
℞ pulp. cass ℥i mell. violat ℥ii diss
in decoct. emoll ℔i f enema in hemorrh
inflamati
Tamarindi fructus sunt quorum
pulpa lenta et viscida in massas
coacta ad nos afferte coloris nigri
saporis acidi cum permistis siliquae
corticib et mbranis, nervis aut fila
mtis cartilagineis nec non seminib
duris, spadiceis, nitidis fere quadrangul
depressis
eligenda recens pinguis acida non
exsucca, non prunorum carne adulterata
mundatr e mbranis et filamtis
in aegipto arabia utrisq indiis aethiopia
tamarindi acido et sulphure abundant
majori quantitate acidi contra in pulpa
cassiae sulphur acido copiosius
catharticum est mite et blandum et
quandam astringendi vim obtinet

praeter vim purgantem humorum acrimoniam temperant bilis et sanguinis fervorem compescunt febres acutas ardentes pestilentiales icterumque sanandi sitim et omnem viscerum ardorem extinguendi et vomitum sistendi.
in haemorrhoidib hydrop ab inflammatione diarrhoeis biliosis renum morbis et gonhorrea
aliorum purgantium vitia corrigunt scammonii tithimalorum laureolae eorum enim ptes salinae acres et oleosae acido tamarindorum sale ess. saturant.
Ardorum vero et dulcium qualia cassia manna vis purgandi magis intendit eorumque fermentescendi facultas coercet.
emeticorum ex stibio vis, tamarindis augetur, acidaque enim e vegetabili regno stibiatorum vim emeticam intendunt cum e contra eandem acida mineralia minuant
commendantur in febrib ardentib, putridis scorbuto, diabete, verminosis puerorum morbis in ictero

 nocent ut omnia acida tussientibus
ventriculis frigidis intestinis exulceratis
dysentericis.
pulpa eor. per setaceum trajecta sacchar
sub forma boli aut liquore diluta a ℥ii ad
℥i vel decocta ad ℥iii
℞ tamar. mund. medul cass. mund.
a ʒß rhei pulv. gr xxx m.f. bol
℞ pulp. tamar. mund ʒß scam. pulv
gr xii m.f. bol
2 tamar pinguium ℥ii seri lactis ℔ii
bulliant leviter diss. syr. viol ℥ii
f potus per cyathos propinandus ad
sitim extinguendam in febrib. ardentib
et sguin aut bilis aestum compescendum.
℞ tamar. pingui ℥i bull. leviter in
aq. com. ℥vi hoc decocto macerent
fol. sena ʒii rhei minu conci ʒi
dein dissol manna calabr. ℥iß f colat
jejuno
℞ tamarind ℥ii medul cass. cum
nucleis ℥iii bull. levit. in seri lactis
℔i colatura dividatur in duos haustus

Vanilla seu aracco aromatico
est siliqua angusta pene teres non
nihil compressa sex circiter uncias
longa 4or lineas lata rugosa rufescens
molliuscula oleosa pingui fragili
exterius quasi coriacea, intus pulpa
subrufa seminibus innumeris, sapore
subacri pingui et aromatico per
gratum balsami peruviani odorem
referens. ex peruvia et mexicano regno
analysi chymica plurimum olei ess.
aromatici liquoris acidi portionem
non mediocrem perparum vero liquoris
urinosi et salis fixi continet.
ventriculum roborat et calefacit affec
tibus frigidis memoriam firmat menstrua
provocat. rarioris est usus in medicina
usurpatur in compositione quae chocolata
dicitur cui gratiam conciliat
quam specificum habetur apud anglos
ad melancholicos affectus in substantia
gr XII ad ʒß decocta ad ʒII
attamen nimia dosi sanguinem accendit

106. Cardamomum tria st genera majus matthioli fructus est exsiccatus oblongus ficum magnitudine et figura cum umbilico insummitate lato et circu lari, in medio tripartito includens sub involucro tenui mbranaceo tenaci lento fibroso rugis striato coloris fusci vel subrubri semina ii 3a locul. divi inoequalia nitida subrubra multis mbranis involuta. semina melegettas appellavere quidam qd milium indicum referant, saporis acuti aromatici ad camphoram lavendul et thymum accede odis jucundi et suavis quo fructus est ut grana paradysi a quibdam vocitent.

cardamomum medium raro ad nos venit.

minus magis usitatum est siliqua mbranacea brevis 5e lineas longa trigon ad pediculum acutior obtusa in extremo dilute rufescens striata cortice tenui in ciborum condimentis in summo usu est apud malaios ex sinensibus nobis oleo ess. pollent cardamomi species grana potissimum usurpant exempto cortice seu utriculo

ventriculum et cerebrum roborat. ad
apoplexiam et vertiginem praecavendam
comendatr: in subs. ad ∂I in pus ad ℥ß
Ammonum fructus est siccus
racematim congestus mbranaceus cap
sularis, sem. refertus
oleo ess. aromat. tenui et volatili co
pioso donatr qd in distillatione effundit
in aqua prius maceratum.
veneris vesicat humores crassos attenuat
spiritus torpentes excitat. diaphoresin
promovet.
Cubebae fructus sunt seu grana
exsiccata sphaerica, piperi similia
interdum paulo majora pediculo
longo tenui donata cortice e cinereo
fusco rugoso cum testa tenui uni
capsulari, sem. subrot. foris nigricans
intus albidum sapore suavi acre
aromatico piperi inferiore ex java indiae
oleo ess. aromatico pollent in apoplexia
paralysi oris foetore ventric. et cerebru.
roborant venerem provitant in vino macerata
ad aphoniam et raucedinem in subs. a gr III
ad ∂I in vino macerat ad ℥II

Piper 3a genera

nigrum off. vel rotundum fructus est seu
granum exsiccat; parvum pisi min.
magnit. rotund. cortice rugoso nigro aut
fusco quo detracto subtilia cuticula du
riuscula extus ex viridi flavescit intus
albicat et scrobiculum in medio
vacuum relinquit, sapore acri et
fervido totum os et fauces adurente
ex indiis orientalib. batavi affer
eligatur majus, ponder, et minus rugosum
album. offi. rotundum nihil aliud est
quam nigrum decorticatum ante insola
tionem
Longum off. et macropiper. fructus
est immaturus exsiccatus unciam aut
sesqui unciam longus teres cylindraceus
spiratim striatus cum tuberculis reti
culatim positis intus in plures cellulas
distinctus in quib. sem. unicum
sale volatili oleoso plurimo turget
album mitius longum saporis minus
grati et acrioris
calefaciunt exsiccant attenuant resolvunt
aperiunt spiritus recreant fibras firmant

in quib. cstitutionib. ardorem excitat
et inflamasem ventriculi
ejus vis valde volatilis itaq sub finem
coctionis adhiberi debet
in febrib. intermitt. a pluris praedicatr
grana 7 – 8 vel 9 integra vel crassius
contusa aliquot horis ante paroxism
imo quartanam continuato usu pro
fligari asserunt. qquam male multis
multis tamen profuit sive qd vomitum
provocaverit vel uberrimos sub finem
paroxismi sudores excitaverit, saltem
horrorem febrilem disculit, et eo cstio
ante accessionem allium calidam q
aquam cum pipere laudat c Celsus
si vero tardius paroxismo iam instante
assumatr febrilem ardorem augent.
commendatr tquam alexiterium contra
venena coagulantia vertigines et ca
tharros
verum frequentior ejus usus noxius est
aestum humorib accendit
dosis in subs. a gr. ad X tincturo ad ʒ i

externe in apophlegmatismis gargar: et sternutatoriis ubi acri subtili et stimulante remedio opus est pro incidenda lympha crassa faucium glandulas infarciente, sedat odontalgiam denti cariosae impositum. in cephalalgia et dolore capitis ì humaci piper longum pulveratum et sacculo inclusum vel suturae coronali vel temporibus
oleum ejus. egregium stomachicum in ventriculi laxitate. tres vel 4^or gutt. cum extracto gentianae in febrib. quart. ante paroxismum. immanes horrores et rigores demulcet modo spina dorsi vel stomachi regio hoc oleo cum oleo laurino aut nucis moschatae inungatur idem ptibus paralyticis conducit
℞ piperis nigr. gr. 9 integra hauri aut ex haustu vini duab hor. ante paroxismum in febr. intermitt. purgato prius ĉpore vel
℞ pip. nigr. crassiuscule triti ʒß summitat. absynthii p.i. macerentur tepide in aceti ℥iii per noct. colatura propinetur incunte paroxismo

℞ pipe. long. gr VI alum. pul. gr V
m. f. pulvis valvae relaxatae seu tumidae
applicandus
℞ pip. long succin alb. a q. s. pulverata
sacculo includantur et suturae coronali
imponantur in frigida capitis intemperie
℞ pip. nigr. pulv. q. s. m. cum album
ovi f. cataplasm temporib vel imae
colli vertebr. admovend. saepius repeten
du diutur. capitis dolore
℞ pip. nigr. caryophill a q. s. pulv
cum album. ovi misc. cataplasmatis
fina lateri dolenti applicanda in dolore
lateris punctorio
℞ macropip. hellebor alb. a ℥I ma
joranae ʒß m. f. pul: sternutat. ad
soporosos excitandos
℞ piperis nigr. rad. ari, pyrethr, cu
bebar, cardam a ʒII sp. vol. sal. ammon
℥I.I sp. vin. recti ℥VI macerentur per
octo dies. tincturae per inclinationem se
paratae add olei succi. et lavendul a ʒII
fiat linimentum quo membra paralytica
foveantur.

192 Caryophyllus aromaticus, anto
phyllus et caryophyllus regius.
clou de girofle fructus sunt immaturi
exsiccati semiunciam longi instar
clavi quasi quadranguli, rugosi, ex rubi
gine nigricantes, quatuor in summo
stellatim decussatis apiculis donati
quoi medio capitellum pisi parvi
magnitudine insidet e foliolis squam
matim duplicatis contextum quib
patentibus fibrae quam plurimae apparent
rufescentes inter has stylus. saporis acris
amaricantis et grati odoris fragrantis.
probant graviores nigriores pinguiores
fauces pene deurentes cum odore eximio
oleosam quamdam humiditatem premendo
exhibentes.
leguntur antequam flores expandant.
in insulis moluccensib
recentes oleum expressione fundunt
spissum rufescens et fragrans. distilla
oleum ess. aromat. copiosum, 1° limpidum
et flavescens, dein rufescens grave aquae
fundum petit tandem oleum empyreu
maticum crassum cum liquore acido.

vis calefaciendi et exsiccandi illi tributa adversus omnes cerebri frigidos affectus vertiginem visus debilitatem cephalalgiam lypothymiam, cordis palpitationem ventriculi imbecillitatem, impotentiam veneream mensium supp. aëris ctagio resistunt suffimento vel esu dosis in subst. a gr. III ad ℈ I infus a ʒß ad ʒ II externe usurpatur in sacculis ventriculo dicatis ad vomitum compescendum et ventriculi dolores a causa frigida in ore masticati salivam movent in catharrosi oleum ess. vel per descensum vel per alambycem qd ad cariem ossium et odontalgiam gossypio exceptum carioso denti dolorem sedat. dosis intus est gutt. I aut II

℞ caryophill ℈ I cinnam ℈ I nucis mos chat gr XV sacch. ʒ Iß m. f. pulvis in cruditatib et ventriculi flatib. vomitu ex vino rubr. sumend

℞ caryoph. nucis mosch cinnam a ʒ II macis sem. carvi, foenicul. summitat absynthii a ʒ I m. f. pul. crassus, sacculo inclusus vino rubro vel canarino immersus ventriculo admoveatur vel capiti in frigid. intemperie

114 ℞ rad. angelic. exsicc. ℥ii caryophyll
nuc. mosch. macis ā ℥i iridis floren
flor. lavend ā ℥iß styracis calamitae
oliban, succini ā ℥i f. pulvis crassius
qui bombace exceptus et panno serico
intersutus formetur ut aiunt est pro cucupha
quae singulis noctibus fumo succini et
mastiches super prunas injectorum
calefacta, super caput gestetur in affec
tib capitis humidis pituitosis et frigidis
℞ olei caryophyl gutt ii olei cinnam
gutt viii tincturae ambrae gutt i sacch
crystal in tenuiss. pollin reducti ℥ß
m. f. pulvis in vase vitreo accurate
clauso servet. ad usum doris ℥i in
vino rubr vel hispan. ad ventricul. robor
℞ olei caryophil: roris mar. salviae āā ℈i
olei nucis mosch. per express. et oleum
palmae ā. ℥iß m. f. linimentum quo ii
ungantur membra paralytica et catharris
affecta. ...
fructus maturus antophyllus appellatur
caryophyllus quia molucensibus regulis
et magnatibus ad superstitionem usque in pretio est

Anacardium offi. fructus est vel potius nucleus compressus, avicula cordis figura, nigricans splendens, unciam circiter longus in obtusum mucronem desinens ex pediculo rugoso totam basim occupante appensus. includens nucleum albicantem subdulci amygdalæ vel castaneæ sapore, inter involucri duplicaturam in fungosæ cujusdam substãæ vel diploes cavernulis subnigra melligo saporis acris et exurenti continetur. ex indiis orient. plures vim causticum et deleterium ei tribuunt.

Cajous vel acajous. noix dacajou est fructus vel potius nucleus castaneæ magnitudinem æquans tectus cortice cinereo vel fusco lineam circiter crasso quasi ex duplici mbrana intermediũ substãã fungosa quæ melleaginem in suis cellulis continet rufescentem acrem et mordicantem. ita ut cuti leviter illita ignis modo urat nucleus sub hoc cortice albus dulci sapore in insulis americanis brasilia indiis. melligo quam geminus cortex continet

 ferragineo colore linteamenta colant maculata qui difficulter admodum eluuntur acri illo succo vel praestantes ad lichenes impetigines scabiem vermiculos necando

Nux Ben nucula est avellanae magnitudine, figura nunc oblonga nunc subrotunda triquetra putamine tecta albicante mediocriter crasso cui nucleus subest avellanae aut amygdali consistentia pinguis amaro sapore.
crescit in indda.
praeter oleum crassum plurimum oleo quodam ess. acri et deurente parva quanti cum sale ammo. juncto pollet
ab hoc oleo subtili acri pendet vis vomitum excitandi et alvum subducendi.
sed segnioris sunt operationis ppter oleum crassum. stomacho adversatur viscera turbat
ab aromatariis illud oleum prae ceteris aliis celebratur qd vix unquam rancorem contrahat et nullo alio odore peregrino florum odores inficiat.
ea est florum odores extrahendi ratio
In vase vitreo vel figulino in imo

strictiore in summo latiore super-
rates e setis equinis factas et circulo
ligneo formatas unam super alteram
cum intervallo dispositas. stratificentur
flores et gossypium tenuissime carptum
et oleo balanino imbutum per hor. 4or
tum novi flores prioribus rejectis cum
eodem gossypio denuo stratificentur, idque
que repetatur pluries donec oleum suffi-
cienter sit impraegnatum florum odore
tunc q oleum ex gossypio fragrans et odorum
exprimatur.

Cacao nuclei sunt ~~amygdalis~~
seu potius pistaciis quodam modo similes
majores tn olivar. magnitudine oblong.
subrot. putamine tenui duro fragili
nigricante circum tecti. quo sublato
substantia firma, densa, sicca, subpinguis
externe fulva et quodam modo rubens
intus spadicei coloris aut fusci in
plures aut dispares divisa particulas arcte
inter se cohaerentes subamari et leviter
acerbi non ingrati tn saporis. apparent
praestantius cacao majus ex nicaragua
deterius minus ex insulis

118 ex analysi liquet multum olei crassi seu pinguedinis cum terra copiosâ et salium tam acidor: tum aerium portione mediocri conjunctae continere. unde ipsum exurgit gummoso-oleosum, pingue et crassum a quo vis pendet crassum suppedit nutrimentum si cru dum comedatur sanguinem inspissat et humores crassiores efficit, obstructiones gignit si nimia copia sumatur. id circo leviter a mexicanis ustulatur cum aromatis permiscetur. unde exurgit illa compositio seu massa quae chocolata et succolata dicitur quae q apud diversas nationes diversa est; quam hoc praescribit..

℞ nucleor. cacao ex nicaragua major
℔ XII nucleor. cacao ex insulis major
℔ V sacchar alb. ℔ X vanillae siliquas
N XXVIII ambari cinerici ʒ cinnam
℥ VI, nuclei cacao a putam. mund. rite torrefacti supra lapidem commoluntur in massa tenuissima tunc sacch. miscetur idem vanilla cinnam. et ambar. in pul. massae inducitur in panes redacit. servari pt per plures annos

massæ hujus ℥i circiter in ℥vi aq. tepidæ aut lactis et coquendo donec solutio leniter bulliat deinde per horæ quadrantem digeritur supra cineres calidos ac idem ligno versatili et idoneo fortiter agitatur donec in spumam abeat tunc calide haurit.
potus ille optime nutrit ventriculum roborat spiritus recreat vires debilitatas instaurat et inter aphrodisiaca recensetur commendatur phthisicis et tabidis praesertim cum lacte modo rite torrefactum ob eo abstinere debent hypochondriaci et ceteri quorum perferuida sunt viscera ut enim butyrosa et oleosa omnia ipsis noxia sunt

Pistacia pistaches fructus sunt seu nuclei avellanar. mani hedic et fimu oblong. angul. altera parte elatiores altera depressiores acuminatæ costa notatæ, duplici putamine donatæ, ext membrana arid. tenui frangit virid. dein rufo. altero lignoso lente fragili candid in quib nucleus virescens pinguis saporis

 olevsi subamari dulcis rubra pellicula tectus. in persia arabia Syria india italia oleo dulci copioso turgent. palato et stomacho grata ut pistacia. ad aegros emaunctos inter analeptica recensent
phthisicis et tussientibus sicut et nephriticis acrimoniam demulcendo
in emulsionibus sola vel cum pineis et amygdalis ad N. 10. vel 12 pro emulsionis lb I
℞ pistaciorum et pini nucleorum a ℥ß
amygdal dulces N XII contundo in cremore ex oriza parato, expressum inspissetur leni igne cum tantillo sacch et cinnamom. ad tabidos reficiendos

Pinei. et nuclei pini pignons doux
nuculae sunt quae substantia oblonga teres candida, pinguis, dulcis; tunica rufescente inter testam lignosam crassam et duram inclusa. hae nuclae in conis seu pini fructibus deliterunt. inter duras eorum squammas reconditae.
eligantur albae sicce vetustate enim flavae et oleosae fiunt rancorem que contrahunt

in gallia narbonensi frigoris impatiens
huic arbor.
multo et subtili turgent oleo qd expressione
castratitur.
plurimum nutriunt succum praebent
laudabilem at vero nonnihil crassum
non facile coquuntur id circo saccharo
condiri solent. phthisicis et tabescentibus
utiles pulmones mundant ejus ulcera
abstergunt, acres sanguinis sales demulcent
opitulantur urinae ardoribus et stillicidiis
lac et semen augent sicut caetera in
crassantia alimenta. dosis a ʒß ad ʒi.
saepius in emul. cum pistaciis et amygd
vel sem. 4or frigid.

℞ pineor dulcium ʒi contunde simul
affundendo decoct. orysae vel decocti
pectoralis ℔i f. col. in quo diss. sacch
rosati vel syr. de althoea vel syr. de
sumpt. ʒi fiat emul in duos haustus
divid in tabe aut tussi veteri exhi
℞ pin ʒi sem. 4or frigid maj a ʒi
cum decocti ᵹran ℔ii f. emulsio
syr. de althoea ʒi. edulcanda

 Ricini ricinoïdei nuclei purgante
pignons dinde quatuor genera
nucla cathartica 1.a ricini vulgaris nucleu
catapuția major. cherva major et granum
regium off. grains de ricin. semen est
oblong ovatum una gibb. altera depress. et
cum quodam capitello seu umbilico in vertice
posito sub putamine tenui fragili, lituris
nigricantib et albidis eleganter asperso
glabro, carnem medullosam firmam amyg-
sini, biparttitam pinguem candid. subdulci
acre tria semina in uno fr. trigono tri
caps. et molliter echinato continent.
in aegipto et oriente et occidente
oleo dulci temperato turgent sed praeterea
inest olei tenuioris acerrimi portio adeo
caustici ut fauces exurat unde vis cathartica
in subst. a pond gr X ad XX in emul ad ℥I
in aq. com ℥VI
verum rarissimi est usus qd vehemens
sit catharticum et periculi plenum, sed
cater. eius oleum contra aff. frigid.
nucula cath. 2.a curcas dictus et faba pur-
gatrix indiae occidental. off. pignon de barbarie
sem. fabae minoris magnitud. putam. nigr.

surditati gutt. 3 cum lacte mulier. auriumq dolorib. ejus oleum cū sol.
et cutis vitia illitū expurgat
vehementius purgat quam ricini vulgaris
Nuclu cath. 3ª avellana purg. C.B.p.
medicinier d'espagne sem. avellu. magni,
subrot. et quasi triangul avellanae sapore
haud absimili
non minus purgat quam caetera
Nucl. cath. 4ª ricini indici semina
grana tiglia off. pignons d'inde, graines
de tilli ou des molluques
sem. ricini vulg. forma sapore acri cum aliq.
nauseoso
recens violenter purgat cum etiam siccum
blandius purgat si parciori dosi sudorem
elicit in hydrope leucophleg. morbis
chronicis. recens in subs. a ℈ i ad ʒ ß
annosum ad ʒ i in infus. vel decoct ad ʒ ß
ad sudorem datur in subs a ℈ ß ad ℈ i infus
a ʒ ii vel ʒ iii. decoctis sudoriferis pro
stimulo addi potest.
adeo potenter seminia humores serosos
viscidos et tenaces incidunt ut colocynth
superent. eorum vis posita videtur in duab membran
seu folioli primo germinantib quae in granorum
media substa latent

124 dat integra nucleor. substia rejecto
cortice exteriore
exhibetr. quoq oleum ex semin. express.
ad gr I valentius purgat quam ricin. indy.
corrigitr glycirh. amyg. dulc. succo limon
jucul. pingui ss torrefactione sub cineres
eorum vis tperatr.
olei expressi usus frequentia externe
in alvi nimia astrictione umbilicus eo
inungitr
2 olei granat tigli expr. gutt XII
olei colocynth. ℥iß unguent. de artha
nita ℥i m.f. lin. ad abdomen
ex eodem oleo pomum regium cathar
ticum ab indis paratr. cujus odore solo
delicatiorum alvus movetr
malum aurantior vel citreum per mensem
i ūm in oleo ex gr. tigli express. maceratr
postea eximitr. si fortiter manibus
fricatur ita ut incalescat narib admo
veatr ejusq odor fortiter attrahatur
alvus paulo post movebitr:

Caffe sem. est durum faba paulo minus ovatum 4or aut 5e lineas long. 3o 4or ve latum altera pte convexum altera planum et insigni sulco notatum flavescens vel e cinereo aut viridi pallens saporis farinacei leguminosi odoris fere expers. duplex in officinis
alterum crassius pallidius quod ex mocha arabiae felicis emporio advehitur
alterum minus crassum subviride qd ex cairo affertur. ab annis 60 notum planta dr jasminum arabicum lauri folio
Sem. caff. torrefacti ℥ß ctinet extracti spissioris ℨI gr LXVIII salis acid. gr I circiter salis volatilis urinosi gr VIII olei ad axungiae csistentiam appropinq. gr XIII salis fix gr VIII cinerum seu terrae shedel gr IIII
oleo crassiori empireumatico admodum favorabili cum potione salis volat. urin non mediocri pollet
℞ torrento semine ab involucris expurg subtiliter pulveranto dein huj. pulveris ℨI cum aq. com. ℔II leniter decoquitur et decocto adhuc calens a faeculo pulvere

 in fundo vasis praecipiti per inclinat. separato, addito sacchar. momento propinatur, non tam ratione valetudinis quam garriendi et tempus terendi gratia. non tn. inutilis in crapula ventriculi imbecillitate doloribus colicis flatulentis mensium suppressione, somnolentia morbis soporosis feliciter exhibetur. spiritus animales recreat ingenium acuit sanguinis motum suscitat, humores spissos attenuat obesis praesertim confert verum macilentis biliosis et iis quorum humores nimis soluti sunt et salibus acribus turgidi admodum noxia nec non melancholicis et hypocondriacis quorum sanguis crassior activis et spirituosis particulis destitutus et salibus fixis acribus turgidus est. potus enim caffe sulphureas sanguinis partes nimium quam par est solvit spirituosarum dissipationem promovet sicut cruoris sales acres sui juris facti et in motum acti multas turbas excitant inde sanguinis dissolutio et acrimonia quas hemorrag. hoc morbo vigiliae corrupt. cutaneae affect. cordis palpitat. spas. et hypocond. affectus

non inepte lacte separato. Butyrosis lactis particulis sulphureae tenuiores caffee partes et sales urinosi volatiles tantisper coercentur et irretiuntur, quin etiam actioni caffee partibus lactis coagulatio impeditur ejus partes butyrosae blandae paullisper attenuatae per totum corpus facilius circum vehuntur et distribuuntur sic se se mutuo contemperant eam ob rem tabidis et emaciatis proficuum putat

decoctum seminum caffe crudorum non torrefact. in aq. com. a nonnullis tanquam specificum commendatur in calthorrosis affectis et reipsa eos saepe sudores proliciendo sanat

Nux moschata vel myristica et aromatica off. nucleus est firmus spachus in pilam fragilis tamen nec difficulter in hos hula dissiliens pinguis et odoratus, extus nonnihil rugosus et coloris fere cinerei intus variegatus venis spadiceis ex flavo albicantibus undatim hinc inde discurrentibus duae sunt species una figura olivari odore aromatico grato sapore acri aromatico non nihil astringente quae foemina dicitur maxime venit in usum.

altera quae mas. longior et fere cylin
dracea, non odoris et saporis amaris expers
aliae praeterea sunt nuces moschatae syl
vestres illar. praecipua major oblonga
inutraque extremitate obtusa veluti quadrato
odoris fere expers et saporis ingrati. facile
a vermibus corrodith
hae nuces a batavorum mercatur societate
ex india orientali
eligatr subrotunda seu olivaris seu femina
quae probatur recens gravis pinguis et quae
acu puncta succum mox reddit oleosum
Macis. off. fleur de muscade. est substia
membranacea crassior veluti cartilaginea
oleaginosa. reticuli [videtur] aut lacinias in modum
supra putamen lignosum nucis moschatae
protensa, coloris rubentis 1° et eleganti
sed postquam aeri exposita fuit flavescenti
odoris aromatici, acris cum amarore et
oleaginem quamdam expressione fundens
si recens sit. affertur separata a fructu
probatur recens lenta oleaginosa, colore
ad croceum accedente et odoratissima
Nux moschata mas seu sylvestris nullius
est usus in medicina. tn a quibd. super
stitiosis ad philtra parando quibus admi
randa praestare existimant

abundat oleo ess. tum subtili tum
crass. cum sale acido et terra nonnihil
astringente juncto. distillationis ope. chym.
et multa aq. macerato prodit olei tenui ℥i
per ℔i. oleum sebi instar aquis innatat
crassum fere inodorum.
express. ex ℔.i. extrah. ℥III ℥II olei
sebaceae cõsistentiae nucem moschatam
odore et sapore apprime referentis
Macis oleo tenuiore et uberiore turget
nux mosch. stomachica vomitum cõpescit
viscera roborat flatus discutit colicos dolo
res sedat alvi fluxus sistit sanguinis motum
auget venenis resistit, in catharris et fri
gidis nervor. affect. ad paralysin
soporem inducit unde homines somno
lenti pigri et obliviosi redduntur.
in affectib. uteri flatulentis in dolore ejus
et inflatione post partum ab aëre frigido
tanquam expertum remedium suffitus e
nuce moschata praedicatur.
ejus vis astringens torrefactione augetur
idcirco in alvi fluxu dysenteria torrefacta
praescribitur dosis in substantia a ℈ß ad ℥ß
torrefactae ad ℥i

 macis iisdem viribus donatu minus tn
astringit nec minus est periculi si copia
peccetr
℞ nuc. mosch ʒß cinnam. ʒii caryoph
ʒß sacch ʒi m. f. pulvis cujus ʒii post
pastum sumantr in haustu vin. gen. ad
ciborum coctionem.
℞ nuc mosch. torrefactae ʒß terrae
catheeu ℈i mivae cydon. q. s. m. f. bol
bis terve in die iterandus ad diarrhaeas
℞ nuc mosch ʒi theriaces andromacha
ʒß diacod q. s. f. bol in colicis dolor
dysent. tenesmo ad dolorem sedandum
et somnum conciliandum
℞ macis ʒß anisi coriandri a ℈I sacch
albi ʒiß crassiuscule contusa infund. per
aliquot hor. in vini haustu infusio calida
coletr et propinetr ad colicam flatulentam.
olea nucis mosch aut macis prosunt
in torminib ventris in nephriticis dolorib
a gutt i ad IV. extrinsecus commend
in nervor. affec. paralysi catharris asthm
umbilico admota infantum tormina com
pescunt, temporibus blande somnum conciliant

oleum nucis mosch. ad mamillas puellar. quam par est graciliores exter admotum tquam proficuum vaius com mendat. brevi enim tporis spatio in tumescere et sororire incipiunt.
haec olea distil. ex pilulis purg. saepe com pant ad catharticor. resinosor praesentia vim tperandam et demulcendum.
℞ medul. bovinae, urinae sanae, vini rubr a ℥ II coquantr lento igne. ad humidit. totius evapor. fiat colat cui add tepenti olei lumbric. ℥ß spermat ceti ℥ II. olei nucis mosch. ℥ I m. f. liniment quo spina dorsi quotidie vesperi inungat in rachitide;
℞ ole. nuc. mosch et ol. palmae a ℥ Iß oleor majoranae, rorismar, lavend. et salviae a gutt X m. f. balsam. cephalicum quo caput inungatr ad affectus frigid pituit. et catharrosos discutiendos cephalar hemicran sedand. in apoplexia.
℞ ol. nuc. mosch. express. ℥ II balsam peruv. ℥ß oleor. stillat macis absynthii menthae. cinnam. caryoph. a. gutt XII

 in f. balsam quo inungantur scrobi
culum cordis et epigastrica regio, in
lipothymia, cordis anxietate, singultu
nausea vomitu ventriculi imbecillitate.
℞ ol. nuc mosc. bituminis judaici a ℥ii
castor pulver. gr. VI oleor stillatit.
succin, rutae, matricar, absynth. et
tanaceti a gutt XV gagati gutt
XX m f. balsam hystericum.

Nux vomica. lignum colubrinum
et faba sancti ignatii.

nucleus est orbiculatus planus depressus
unciam circiter latus 2ae 3ve lineas
crassus substantiae durae corneae, coloris
cinerei. foris parum lanuginosus cum
umbilico utrinq medium occupante altera
facie depressiore saporis amari
ex india orient. cum ligno colubrino affertur
Canes, feles aliqq quadrupeda specifica
quadam vi toxica enecant, corvis pariter
coturnicib et aliis quibusdam ad ℥ii
hominem interimit
huius venenum nervos potissimum afficit
hinc anxietas, rigor, horror, tremor: convul
siones et respiratio inordinata

lignum colubrinum dicitur arbori
quae nuces vomicas parvas profert.
lignum est vel potius radix lignosa, bra
chium crassa sub cortice ferrugineo et
maculis cinereis notato includens materi
ponderosam saporis acris et amari, odoris
nullius affertur ex insulis Solor et timor
sic dictum quia morsus serpentum sanat.
laudatur in febrib intermitt, quartanis
ad vermes necandos humores noxios per
sudorem, vomitum et alvum expellit
sed si majori dosi exhibeatur convulsiones
et spasmodicos motus excitat. tantum au
nosum usurpatur a ℈II ad ʒß in infuso vel
decocto ex vino absynthide vel ex aqua
cardui Benedicti aut centaurii min.
℞ lign. colubr. ʒß infund. in vin absinth
℥VIII macerent per noctem f. colat.
exhibeatur in quartana duab hor. ante paroxi
℞ lign colub. et sem. contra verm. a ʒß
sal absynth ℈I inf. in aq. graminis
vel portul ℥XII macerent tepide per
XII. hor f. col. in 3as dos per 3es dies
singulo mane. ad vermes necandos

131 internus hujus ligni usus non periculo vacat vi quâdam maligna donatus ut nux vomica nervos afficit.
Faba ~~febrifuga~~ igasur ~~. et~~ seu faba sancti ignatii off. nucleus est nuci vomicæ similis subrot inæqualis veluti nodosus durissimus semipellucidus quasi corneæ substantiæ saporis seminis citri multo intensius amari coloris inter album et glaucum in philippinensibus insulis
a nucis vomicæ facultatibus non multum discrepat.
Cartamus cnici semen safran batard graine de perroquet
ejus semina in usum medicum veniunt raro flores quorum usus ad sericum pannos et plumas colore roseo tingendas quandoque ad cibor. condimenta
semina probantur recentia, nitentia candida licet non respuant quæ ad rufum vergunt, medulla candida pingui quæ in in aquam injecta in fundo subsident eorum medulla tantum separato cortice in usum venit
psittaci semen quod illud avide et immodice

expetunt et comedant eo pinguescunt
homini catharticum est. oleo acri
turget aucto(?) purgans
humores serosos lentos spissiores incid.
attenuat et educit hydropi tussi asthmati
colica flatu. ictero. senibus potissimum
confert in subst ℈I vel ℈II. emulsio
ex ʒVI vel ℥I in sero lacti vel jure galli
verum stomacho adversatur fastidiosum est
proreetin in substa. sed emendatur aromat
stomach. et salibus alcali
℞ sem cartam. excortic ʒVI. tunde
in mortar. marmor. simul affundendo
aq. com. ℥VII f. colat. in quo dissolve
syr. flor. persic ℥ f. emulsio quae aro
matizetur cum oleo sacch. cinnam. q.s.
vel aq. cinnam.
℞ sem. cartham ʒIIII tunde cum scam
gr VI in aq. com. ℥IIII et aq. flor
aurant ℥ f. express in qua diss. sacch
alb. ℥β
electuarium diacarthami praescribitur a
ʒII ad VI solum. permistum vero a ʒII
ad ʒIIII

 carthami semen ingreditur electuarium
diacarthami cui nomen dedit licet hujus
vi catharticâ debeat scammonio turbith
mannae et hermiodactyli
℞ sem: mund ℥ii sal absynth ℈I
infund. in s.q. aq. font. per 6. hor.
in colat ℥VI dissol electu. diacartha
℥II vel III syr. rosar. soluti cum sem
et agari ℥i f. pot in catharrosis affec
paralysi arthritide et hydrope
fucus roseus hispanicus rouge des
pagne crocea carthami stamina aquâ
limpida pluries eluuntur donec aquam
flavo colore non amplius tingant
tunc illis admiscentur cineres clavellati
et aqua calida superaffunditur. omnia
accurate agitantur et inmoventur deinde
liquor relictus crassioribus partib ad fundum
depositis in aliud vas paulatim affunditur
a faecibus, et per aliquot dies reponitur
faecula tenuissima intense rubra a liquore
paulatim secernitur et vasis fundum petit
effuso liquore exsiccatur et purificatur
sic compactior fit ne in auras evanescat

Semen contra vermes poudre aux vers

santolina offic. pulvis est crassior constans
ex minutis capitulis oblongis squamosis
ex viridi flavescentib. sapore ingrato
amaro cum acrimonia quâdam aromatica
odore aromatico graviusculo nauseoso cum
foliolis surculisq. aut stipitib. minutissim.
striatis.
nulla res magis usitata et cujus origo minus
cognita dubitant num semen sit vel capsula
seminalis vel foliorum aut florum gemma
quaenam sit planta quae eam profert an
Zedoaria absinthii aut abrotani species
an chamaecyparissus num in gallia pa
lestina persia vel in solo regno Boutan
in indiâ orientali.
adversus lumbricos quoscunq. quoquomodo
sumptum utile tum propter intensum ama
rorem quem vermes ferre nequeunt tum
etiam ratione salis ammonico similis
cujus ope viscidam incidit et dissolvit pi
tuitam intestinor. plicaturis adhaerentem
quae vermes recondit eorumq. semina re
tinet et fovet. insuper ventriculum roborat
flatus discutit ciborum appetentiam provocat.

138 utilius exhibetur cum aquila alba aut alia quacunque hidrargyri præparatione et rhubarbaro conjuncta sic in vermes non solum enecantur sed enecati cum verminosa saburrâ foras propelluntur Sem. pulv. usurpatur a ℈1 ad ʒ1 in haustu vini vel aq. absinth, portulacæ vel sub forma boli, nonnunquam semen oblinitur saccharo quo facilius ab infantibus comedatur.
℞ sem. contr. pulver. ℈1 aquil. alb. gr V rhei pulver. gr XVIII misce cum syr. absynth q. s. f. bol jejuno dand. et per aliquot dies iterandus
anisum indicum stellatum offic anis de la chine ou de siberie semence de badiane fructus est stellae figuram repræsentans qui constat ex sex septem pluribusve nuculis vel capsulis radiorum in modum in centro coeuntibus triangul quinque octo vel decem lineas longis 3-4 vel 5 latis, leviter compressis per basim coadunatis compositis ex gemino cortice exter. aspero spadiceo

interi.[?] propemodum osseo laevi et splendente bivalvi qui per latus in siccis dehiscit manifestum praebet nucleum singularem laevem splendentem oblong. coloris sem. lini qui recondit sub fragili testa carnem albicantem pinguem. dulcem palato gratam saporis medii inter anisum et foeniculum sed violentiori, iisdem viribus ac anisum et foeniculum imo praestantioribus ventriculum roborat flatus discutit urinas promovet

sinenses hunc fructum in ore post pastum detinere solent ad suavem halitum efficiendum. aeris impuri contagium arcendum ventriculum robor. et coctionem juvandam illud etiam cum radice ninzin in modum theae bibunt. cum potu theae et caffe mixtum gratiam ipsis conciliat

Caput. 7um

de plantar. succis liquidis et concretis

Succi nomine non humorem quemcunque per plantar. vasa dimanatim indiscriminatim intelligimus sed illos tantum modo liquores qui vel sponte, sæpius autem vulnere illato delabuntur et lacrymatim profluunt; unde lacrymæ nonnunquam nuncupantur quiq in usum medicum veniunt. humores illi plerumq concrescant vel in resinam vel in gummi vel in mediam quandam naturam inter gumi et resinam verum in officinis sæpius confundunt quod quidem resinis quibusdam gummi nomen tribuunt sicut et plurimis gummi resinis, sed ut accuratius distingui possint quid sint quærendum

resina est humor pinguis oleaginosus inflamabilis qui in aqua non dissolvitur sed in oleo duntaxat. constat autem ex partib sulphureis cum acido sale conjunctis ratione consistentiæ duplex est liquida quæ lenta est et tenax, sicca quæ friabilis ut plurimum calore tamen mollescit inter liquidas numerant opobalsamum seu balsamum judaicum, peruvianum,

album, rubrum, tolutanum, copaivum
liquidambar; storax liquida. therebentina
vera scechia, laricea, abietina, pinea.
labdanum
inter solidas resinas Styrax benzoinum
tacamahaca, olibanum, mastiches, san
daracha, sanguis draconis, copal, anime
caranna, elemi, hederae, camphora.
Gummi est succus concretus qui in aqua
facile dissolvitur in igne nec liquescit nec
flammam concipit, sed duntaxat crepitat
compositus ex modicâ sulphuris portione
cum terrâ aquâ et sale conjuncta ita ut
simul juncta mucilaginem constituant.
et sunt gummi tragacantha arabicum
nostras et manna.
Gummi resinae plurimae vendunt
succi concreti qui in aquâ et in oleis
aeque dissolvuntur, et quidem omnino aut
pro majori parte. compositi sunt ex ptib
resinosis et ptib gummosis simul coadunatis
si partis salinae quantitate sufficiens
donentur tota eorum substantia aquâ solvitur
si vero mediocris sit hujus salis portio
remanet in aqua resinosae substantiae nonnihil

 in oleo vel spiritu vini tantummodo
solubilis. Bdelium, myrrha, assa
foetida, ammoniacum, euphorbium
galbanum, opopanax, sagapenum
sarcocolla

De resinis liquidis

Opobalsamum seu balsamum
judaïcum. balsamum olim arboris
balsamiferae nomen nunc generica
vox est quae pluribus rebus diversis
tum nativis tum arte praeparatis tribuitur
hic vero de succo pingui et resinoso
ex balsamo arbore stillante agimus
et de quibusdam lacrymis resinosis
balsamicis dictis ex aliis plantis sponte
vel per incisionem diffluentibus.
opobalsamum balsameleon, balsamum
judaïcum, gileadense, syriacum, e
mecca, constantinopolitanum. off. beaume de judee, beaume de gilead, du grand
caire resina est liquida pretiosa albicans aut leviter flavescens, odoris fragrantis ad citri odorem accedentis saporis
acris et aromatici.
probatur recens fluidior magis oleosa et
odore fragrans. therebentina adulteratur
facile odore et sapore dignoscitur.

praeter opobalsam. adhuc venditur et carpobalsam. seu balsami fructus et xylobalsamum seu balsami fructus.
Carpobalsamum est bacca oblong, sub rot: piso minor in parvum acumen desinens, pediculo brevi donata, cortice rugoso fusco quatuor costis distincto: includens dum bene matura est exiguam medullam balsamicam oleosam albicantem odore et sapore opobalsami grato.
Xylobalsamum et balsami lignum off. sub hoc nomine afferunt surculi seu ramusculi lignosi, tenues, contorti, nodosi et brachiati, plumae anserinae et minoris digiti crassitie duplici cortice circumtecti exteriore tenuiore rugoso rufo interiore pallide virente saporis et odoris non nihil resinosi ad opobalsami odorem accedentis cum recens.
legitimum raro in officinis reperitur aut saltem annosum et inodorum. pro eo etiam substituunt lentiscinos ramulos opobalsamo pertractos
oleum praebet tenue fragrantiss. resina rufescens remanet quae igne oleum ad therebint

144 opobalsami vires validae celebris diversi recens tenuib. ac unctuosis et volatilib. phil copiosis donati et majoris efficaciae quam annosum. inter viscerum putredinem et corruptionem tollere abscessibus pulmonum hepatis et renum conducere fama est. in chronicis febribus et crudis frigidis q. tumoribus obstructionib. q. viscerum nihil utilius et praestantius quam opobalsami ℈II vel ℥I per os quotidie exhibere ab eo abstinendum in inflamationib. externa ad vulnera et sordida ulcera non vero in vulnerib. contusis
opobalsam exhibetur a gutt VI ad ℈ß
℞ opobalsam. gutt XII excipiantur sacchar. tenuiter pulverato fiat bol. in gonorrh. albo mulierum fluore et dysenteria
℞ balsam judaici ʒß vitell. ovi N II sacch. in aq. rosar. ad syr. consist. cocti ℥II fiat mixtura cujus cochlear unum in decoct. pector. ℥VI vel lactis tepentis haustu propinetur in tussi ferina vehementi phthisi incipiente et ad cruda pulmonum tubercula resolvenda.

℞ opobalsam. et olei amygdal. recens expressi a ℥ II diligenter misceantur in mortario vitreo, ssim affundantur spiritus vini ℥ VII assiduo movendo cum pistillo. liquor in ampullam vitream effusus quiescat donec oleum totum in ima ampulae parte separatum appareat spiritus supernatans rite ab oleo secretus servetur ad usum, hujus spiritus ℥ I cum aq. ℥ VIII permixtus lactescit mistura ideo lac virginale ad faciem lavandam plurimi aestimatum. nulla fit in hoc lacte praecipitatio.

Balsamum peruvianum album et fuscum.

album offi beaume blanc du perou succus est fluidus tenax therebinthina tenuior resinosus inflamabilis, limpidus ex albo flavescens saporis acriusculi aliquantum amari odoris fragrantis et suavis ad styracem accedentis

fuscum vel nigricans offi. beaume brun du perou succus fluidus resinosus tenax therebentinae similis odore fragrans benzoinum suaviter referente, subacri

 sapore linguam leviter mordicante
igni admotus flammam concipit, suaviter
olentem fumum spargit.
prior succus ex inciso arboris cortice
extillat alter coctione elicitur.
sive album sive fuscum ad eadem inservit
quib balsam arabic inventis et eodem modo
exhibetur a gutt IIII ad XII in asthmate
phthisi dolore nephritico mensium suppr
ssione extrinsecus lenit dolores ex humor
frigidis. cavendum ab eius odore qui
caput afficit et gravat.
℞ conserv. rosar. rubrar. ℥I balsami
lucatelloe ʒß balsam peruvi gutt III
m f bol. in tussi inveterata phthisi inci
piente, ulceribus internis, casu ab alto
et dysenteria.
Balsamum peruv. cum vitello ovi
solutum longe acrius fit observante
etmulero et magis fauces vellicat quam
per se sumptum

Balsamum tolutanum beaume
de tolu beaume damerique beaume de
cartagene beaume dui beaume sec.
succus est resinosus tenax medioe inter

liquidum et densum c̄sistentiae. coloris ex spadiceo ad aureum vergentis odoris fragrantiss. ad Benzoini et citri odorem accedentis saporis dulcis et grati nec nauseam movet ut caetera balsama.

eadem pollet virtute ac balsam peru a quibusdam praestantius et facilius hauritur

℞ balsam. de tolu ℥ii aq. limp. ℥xii coq. in vase clauso balneo arenae per 2^am 3^am ve hor. colatur. frigid. add. sacch albis ad electu consist. coq et fiat syr apud anglos usitatiss. in pharmacop. lond.

Balsamum copaiba seu brasiliense baume de copaü succus est resinosus liquidus dum recens oleosae c̄sistentiae per tempus tenax et glutinosus ex albo flavescens, saporis acris amari aromat odoris fragrantis ad ligni calambourg odorem accedentis e Brasilia alusitanis in europam advehitur

duae species occurrunt altera limpidior colo ris pallidi vel flavescentis odoris grati saporis amaricantis consistentiae pro aetate fluidioris vel spissioris adhaerebant. accedant quae praestantior

 altera crassior albicans minus pellucida tenacis et melleæ consistentiæ odoris minus grati therebenthinæ proximi saporis amari injucundi cum aquæ herbidæ portione in ejus fundo hoec species videtur vel adulterata aut saltem coctione ex arboris cortice et ramulis extracta id circo improbatur, oleo tum subtili tum crassiori et sale acido simul mixtis c̄ponitur a quibus energia fuller medicus cantibrigiensis observat balsam copæ odore violaceo urinam non perfundere sed saporem intensæ amarum ei impertire urinæ muriatatem et salsedinem demulcet spicula salina involvendo. sanguinem oleo sis p̄tibus depauperatum restituit ejusq̄ cachexiæ scorbuticæ rancidæ putredinali medetur. valet tam externe quam interne ad vulnera, prosathin nervorum, dysent et alvi fluxus sicut fluorem alb. et gonher sistit, item praestantissimum thoracicum tusses horrendum periculosas et phthisim aperte nuntiantes percurat
a gutt V ad XV vel XX si ad ʒII vel ʒIII propinetur catharsim promovet ut therebinthina

℞ balsam copaivae ℥ß vitellos ovi
No II syr hederae terr: ℥II vini gener
℥VIII fiat mixtura cujus cochlear 1um
aut alterum mane et vespere propinetur
in pulmonum ulcere et tuberculis
℞ balsam cop gutt XV gly pulv. succin pp
a gr XV antihect. pot: gr XII syr. heder. terr
q.s. m.f. bol. ad pulmo. ulcus
℞ rad. bistortae pul. et liqui. pul a ℈I. bal. cop
q.s. m f. bol man. et sero ad ulcus renum et vesi
℞ lap. haemati. mastich. sang dracon. a ʒß
ter. catechu. coral rubr pp. a ʒI bals. cop.
q.s. m.f. elect. dosis ʒI bis die in fluore albo
℞ rhei pulver ʒIII panac. mercu ʒI bal
cop. ʒIß m.f. elect. dosis ʒI mane et sero
ad gonor. viru. 4a quoque die purgando pil. mercu
Ex supra recensitis balsamis variae
extrahuntur tincturae multis encomiis praedi
catae haec sit pro omnibus.
℞ lign. aloes rad. angel. ire. flor. aristol
rotu a ʒI fol dictam creti. summ. hyper. ros
mar. lavend. croci a ʒß spir. vini ℔ß diger
in vase vitreo exacte clauso sub sole per mensem
seorsim quoque digerantur myrrh, aloes, benzoin

 olibani a. ℥ß his affunde sp. vin. ut
digerantur quoque eodem modo per mensem
tum ambo liquores percolati misceantur
quib. affundatur balsam copa. ℥ii opobal.
bals. peru. bals tolut. styrac. liquid. et therebint. cypriae a ℥i digerantur denuo per
15 dies servetur liquor ad usum int. et extr.
Cavendum tn ab interno balsamicorum
usu ubi febrilis aestus adest, sanguinem
enim accendunt et ad phlogosim conducunt
saepe etiam difficilis coctio balsamicorum
usum comitatur itemque longe a parte cere
nimia dosi
Liquidambar et ambarum liquid.
succus est resinosus liquidus pinguis instar
terebenthinae similis ex flavo subrubens
saporis acris aromatici odoris fragrantis
ad styracem et ambarum accedit. ex nova
hyspania virginia et aliis americae ptib.
quoque etiam oleum illo tenius fragrantius
asportabatur olim
liquidambar nunc vix cognoscitur
ab autoribus dicitur utile ad pleraque morbos frigidos
hodie sicut alia odoramenta obsolevit ab his
enim capita laeduntur gravantur et mulieres
in hystericos affectus inducuntur.

151

Styrax liquidus

Styrax liquidus succus est resi[nosus] cujus duplex in off. purum et impur. autem Styrax liquidus purior succus est melleae et tenacis substiae thereb. similis semipell[ucidae] lucidae coloris fusci aut ex fusco rubentis odore valido ad styracem solidum accedens sed ob vehementiam fere ingrat; sapore acriusculo aromatico oleoso probatur lentus fulvus pellucidus odoratissimus.

Styrax minus purus est resinosus feculentus opacus pinguis minus odoratus

easdem virtutes ac ceteris balsamis attribuunt intus a gut III ad XII ad ulcera interna abstergenda et sananda frequentius externe ad putredinem et sphacelum arcendum unguentum de styrace dictum sic paratur olei nucum opt. ℥V gumm. elem. cerae nov. a ℥III ʒIII colopho ℥VIIß omnib. fusi add. styr. liquid et nitid ℥III ʒIII f. unguent. in nosocomiis pari. felix et frequens usus

Therebentina.

quatuor genera Chia succus est resi. liquidus ex therebin[tho] arbore effluens colore candidus, sub flavus vitreus. aut ad caeruleum non nihil vergens

interdum pellucidius consistentiae modo
firmioris modo mollioris lentae ac glutinosae
ita ut inter digitos fricata nonnunquam in
micas teratur saepius tamen mellis solidioris
instar digitis cedat et adhaereat odore acri
non ingrato gustu modice amarescens acris
analysi chym. ℔ i ß prodbuerunt olei
tenuioris limpidi et aquei coloris ʒ i X
olei flavescentis ʒ V spissioris et rubescentis
ʒ XXXI. liquoris acidi gr. IX caput
mortuum in retorta superstes pendebat ʒ VII
gr XXX ex quo per 8 hor calcinato nihil
salis fixi extractum fuit
usus exter. et inter. externe emollit digerit
discutit resolvit ulcera expurgat et vulnera
recentia glutinat sed resina laricea usu in lynthia
nec viribus inferior. sed interne minus
acris est in viscerum exulcerationibus
i fest veteri tussi sputo purulento phthisi
et incipienti urinas provocat et odore
violaceo perfundit verum non adhibenda
quia abiit inflammatio.
in podagra et omnib. articulor. morbis si
accipiatur quantitas nucis avellanae singulis
matutinis jejuno

nec mirum quod calculo confert etiam podagræ prodesse cum cognati sint illi morbi alvum quoq movet in senibus optime et sine noxa ex galeno ad ℥ß et ultra.
exhibetur a ʒß ad ʒiß sub forma boli vel in aqueo liquore vel vitello ovi dissolu a nonnullis in aqua inspissatur verum spirituosæ subtiliæ coctione plurima deperdit
Veneta lavigna vel laricea est resin liquid. limpid. lent. tenax oleo crassior melle liquidior quæ ab intincto digito con tumaciter et æqualiter defluit aliquantulum translucida vitri instar coloris flavescentis odoris resinosi, fragrantis, acris, non ingrati aliquantulum tn gravis, saporis tenuis acris amaricantis quæ acredine et calore terebinthi resinam superat probatur recens pellucida candida liquida nulli inquinamentis conspurcata et cujus guttæ ungui adhærent non vero diffluunt veneta dicitur quia olim a venetis afferebatur nunc vero ex delphinatu et sabaudia fluit ex arbore quæ larix folio deciduo conifera

151 iisdem ac therebinti resina virtutibus
donatur apud nos prae caeteris ad usum
internum anteponitur. balsamica est
vulneraria diuretica et alvum simul movet
ad pulmonum viscerum apostemata re
solvenda vel maturanda si quidem
nonnunquam purulentam materiam a
pte affectu subducit et per urinam amandat
a riverio ad calculos renum praecavendos.
in dysenteria intestinor. exulcerationib.
dolore nephritico urinae suppressione
clysteres cum therebin. utiliter injiciunt
nec tamen absq cautione usurpanda
Spiritus thereb. intern. ad gutt. aliquot
urinas movet venit in urinae suppress
a muco spissiore, in mictu cruento ac
purulento in affectionib pulmonum.
in pleuritide a bartholeto quod humores
in thorace impactum solvat. et ad vias
urinarias perducat. externe spiritus
et oleum tymum balsamica et vulneraria
Colophonia digerit resolvit et consolidat
minas detergit et penetrans quam ipsa the
rebintina.

℞ therebint venet ℥II olei amygdal
dulci. ℥ß m. hauriat in asthmate ne
phretide et urinæ suppress.
℞ thereb. ven. ℥II conser. rosar. m. f. Bol
℞ ther. ven. ℥ß sacch. pulver. vel pulve
liqui. q. s. m. f bol. in ulcere pul. re. vesi
℞ medul. cass. recen. extr. ℥VI ther. venet
℥ß glycij pul. q. s. m. f. bol in ulcer. int.
℞ ther. ven ℥ß rhabar pul. ℥ß. f. bol
in albo mulierum profluvio
℞ ther. ven. ℥ß rhei pul. ℥III panni
marrur. ℥I m. f. opiata cujus dosis
℥I bis die ad gonnorh. praemis praemitt
℞ ther. ven in ovi vitell. dissol. ℥ß mel
rosat ℥I lact vacci ℥VIII f. enema
bis in die in dysenteria et intesti ulcerib
℞ decoct. fol. malv. pariet. flor chamæ
melilot ℔I in qua dilue tereben. ven
vitello ovi dissol. ℥I sal. prunel ℥I
f. enem in dolor nephri
℞ thereb. lavica et cass. recens mund
a ℥I diss. in seri lactis ℔I. f enema

therebentin. abiegna seu abietana argentoratensis off. de strasbourg resine liquide des sapins, bigion. subtilia resinosa liquida dum recens est lariceâ pellucidior minus lenta. minus q tenax odore magis grata et amara magis corticis mali citrei odorem et saporem quodam modo referens per tpus flavescit et spissescit ex argentorato affertur manat ex arbore abies taxi folio fructu sursum spectante i.r.h. sapin thus colore et odore aliquatenus siccata menthe sic ejus loco aliqdo sufficitur iisdem pprijs instructa ac veneta iisdem fere virtutibus donata paulo tenuioris constare ptibus, existimant offmarmus cum sapor ejus magis sit acris et amarus ͞csistentia q fluidior eam obrem calidiorem et majori cum cautione usurpandam

Thereb. communis et resina pinea off. gross therbenthine. ou commune subtilia resinosa lenta tenax crassior et magis ponderosa quam aliae nec pellucida albicans ͞csistentia fere olei frigore nonnihil densati odoris resinosi gravis saporis acris amaricantis nauseosi

in gallo provincia circa massiliam et tolonem in aquitaniam circa burdigalam therebi. com. raro ad medicos usus adhi...

ex resina candida liquata cum therebinth. communi et oleo therebinthino fit pix lenta burgundiaca

De resinis Solidis

De anime et copal.

duplex anime resina oriental. et occiden. orientalis anime [struck] dicitur resina est pelucida, magnis fragmentis varii coloris et myrrhae quodam modo similibus quae dum incenditur jucundum spirat odorem ex brasilia affertur rarissime reperitur in offici. occidentalis seu resina courbaril ei subtitutur quae est alba ad thuris colorem non nihil vergens seu ex albo citrina pellucida, resinâ copal magis oleaginosa nec tam candida ac orientalis, gratissi odoris quae prunis imposita facile consumitur. ex nova hispania brasilia illius suffitus ad roborandum caput et reliquas corporis partes frigore affectas postibus nervosis confert resina in oleo aut spiritu vini soluta et illita vel cerati aut emplastri modo

Copal resina improprie gummi copal resina est solida, pellucida, aquei coloris aut ad citrinum vergentis odorata sed non perinde ac animae. ex nova hispania. a detecto novo orbe nobis solummodo innotuit rarissime in usum medicum venit, utilis tamen ad frigidos capitis morbos saepius vero ad vernices nuncupat.

Benzoïnum vel assa dulcis offi resina est arida indurata fragilis inflammabilis ex variis splendentib micis seu frustulis, modo flavescentib modo albescentib in massam coacta saporis resinosi ac pinguis odoris suavis et fragrantis dum incenditur.

duplex in offi. amygdaloides qd vel pallidum vel ex rubro fuscum, grana candida continet, alterum nigricans nullis aut paucis maculis ex regno siam. optimum amygdaloides.

praecipuus ejus usus ad odoramenta et suffumigia. intus expectorationem promovet in asthmate tussi diuturna. ejus flores praesertim, ad sudores movendo. ... et ... faciei dolet. dolorem dentium mitigat masticatum. flores sulphuris et benzoin ana in ovo sorbili. ... ad ... in asthmate inveterat

tinctura fit ope spiritus vini, cujus gutt
aliquot in aquam injectae statim liquorem
turbidum et lactescentem efficiunt unde
a quibusdam lac virginale dicitur.

℞ flor: benzoi. et sal succin a ʒß croci
℈I gum. ammō ℈II iservae emul
camp. ʒII m. f electu. dividatur in 15or
doses 6ta quaque horâ exhibend. in asthmate.

Camphora duplex resina sub
hoc nomine altera rudis quae in massas
friabiles cpactas ex plurimis granulis
semi pellucidis, rufescentibus aut cinereis
salium grandi similibus odore fragranti
sapore acri et sordibus inquinata.
altera purgata quae pinguiuscula sub
dentibus aliquantisper lentescens candida
pellucida levis in panes orbiculares
depressas nonnihil concavas, nitidas
cornuta 4o vel 6o digitos longas unum
aut alterum latas saporis acris amara
ricanti aromatici, totum os inflammantis
cum quodam tn frigiditatis sensu, odoris
roris marini sed vehementioris. adeo vo
latilis ut aere libero sensim minuatur

facile flamam capit et nullum carbonem terram ve post se relinquit ex japonia occident: rudis in Belgium affertr ibi repurgata per totum europam diffundtr.

de camphorae virtute authores non conveniunt. camphora per nares castrat odore mares, alii e contra calidam affirmant quorum argumenta sunt inflamabilitas odor uro multus sapor acerri. tenuitas et volatilitas partium qd probabilius videtr quamvis in multis affectib ut in oculor inflamaoib erysipelate aestu febrili refrigerantem potestatem obtineat illud per se non operatur sed humorum acrimoniam demulcendo stagnationem removendo coagulationem resolvendo solutas particulas per cutis poros compellendo itaut inflammationis causa remota, cessat calor et dolor quod etiam de spiritu vini et aliis medicamentis quae actu calida dicuntr quotidie experimur.

intus anodyna est diaphoretica veneni resistit unde frequens usus in peste febribus putridis, et morbis malignis moris.

menses provocat et urinas suffocationi
uterinae subvenit in gonhorrea et fluore
albo dosis a gr III ad ℈I sub forma boli
vel cum olei amygdalar. dulcium solutae
praestans cantharidum correctorium
urinae ardoribus ex cantharidib
in paralysi rheumaticis inflam. eresip
in febribus intermitt. in nodulo suspendit
circa praecordia ad ʒI
observandum nimium ejus usum caput
gravare vigilias inducere et sanguinem
ad inflammationem disponere
℞ rad. petasitid et bistort pul. camph
a ʒI C.C. philosoph. pp ʒII m. f. pulvis
cujus dosis ʒI in peste et febrib maligni
℞ camph. gr XV olei cinnam gutt
III laudan opiat gr I cum s. q. conser
flor roris mar. m. f B. ad sudores
℞ camph gr XII conser. flor calend
q. s. f. bol. in mensium suppressio
℞ camph, castor, ass. foetid a. gr V
myrrh. aloes pulver. a gr X olei succin
gutt III conservae rutae q. s. f bolus
℞ camphor. q. s. dissol in ol amygd dul. fiat linimentum
super nares in coryza

℞ camph ʒii thereb. ven: ʒii sang
dracon ʒiii m. f. pilul. dos ʒß in gonorrh
℞ aq. foenicul ℥ii spir. vin camphorat
ʒß m. f. collyr in ophthalmia
℞ tinct. myrrh, aloes ʒiiii spir vin cam
phorat ℥i f. mistura ad ulcera et vulnera
putrida foetida et ad sphacelum inclinantia
℞ sacch saturn. ʒß camph ʒß olei lin
olei ovor a ℥i f. linim. in ambusti.
℞ olei lumbric ʒiii sp. vin. camphor
℥i ol thereb. ʒß sp. salis amm. ʒi
m. f. linim. in paralysi et rheumaticis
doloribus.
spiritus vini camphoratus fit solvendo
hysteris affect. apoplex, epilep. dos a gutt vi ad xx
camphorae ℥iß in spirit vin ℔i in vase
vitreo amplo et clauso sub sole vel in
arena tepida, eodem modo paratur
aqua vitae camphorata, in doloribus et tumoribus ...
contusionib erisipalatib gangrenae paralysi dentium dolori colica
Caranna off. vulgo caragne. substantia
resinosa concreta tenax, et picis instar
ductilis dum recens est, inveterata dura
friabilis, foris e cinereo nigricans, intus obs
cura, fusca, saporis resinosi subamaricantis

ad myrrham aliquantisper accedunt odoris dum accendit fragrantis ex america in massulas junceis foliis involutas sparta afferuntur
ex hac resina oleum ess. subtile aureo rubr et summe odoriferum extrahitur. ab hoc oleo pendet ejus virtus tumores resolvendi dolores sedandi, et nervos roborandi.
externe Ptum adhibetur in podagra, arthritide ischiadica et dentium doloribus sub forma emplastri vel sola vel cum therebin. oleo succistive aut alio.
temporibus admoveri in odontalgia suturæ coronali in cephalalgia, ventriculi regioni in ejus imbecillitate
℞ caranna ℥i ceræ flavæ ℥ß olei verbasci q. s. m. f. emplas. antipodagricum

Elemi duplex
verum seu æthiopicum est resina flavescens vel ex albido tantillum virescens extus solidior licet non penitus sicca, in glebas cylindraceas coacta ad ignem ardens odore valido non ingrato, fœniculi

 glebae foliis arundinis, aut palmei involuta raro in officinis occurrit

spurium seu americanum est resinae species virescens aut flavescens, pellucida ad pini resinam accedens mollioris aut siccioris consistentiae, odore resino gravi frequens occurrit in officinis probatur recens pellucidum viridiusculum pingue lentum odoratum

utrumque elemi externe admotum tumores resolvit ulcera detergit et dolores internos demulcet et sedat, corruptioni egregie resistit inprimis pro vulneribus et contusionibus capitis et tendinum commendatur rarissime ad usum internum attamen quam diureticum praedicatur

ex ea paratur balsamum digestivum arcei in vulneribus capitis apud chir. usitatissimum

℞ elem. terebent. abietinae a ℥iß sevi castrati antiqui et liquefacti ℥ii pinguedinis porcin. antiq. et liquefactae ℥i m. f. linim.

plurimae resinae flavescentes albicantes aut cinereae pro elemi offeruntur quae elemi viribus et odore inferiores

Resina hederæ seu lacryma, impropriè gummi hederæ. est substia resinosa arida, dura, compacta, colore fusco rubiginoso obscuro nonnihil pellucida et rubra si in parva fragmenta disrumpatr cum rubiginosis intercurrentib micis, sapore subacri, leviter astringenti tantisper aromatico; inodora. flamæ admota claram et pertinacem edit flamam cum odore non ingrato ad thuris odorem accedente ex persiâ et oriente affertr.
balsamica virtus seu detergendi et consolidandi vulnera ipsi tribuitr.

Ladanum vel labdanum est substia resinosa cujus duæ species. ex cretâ insula una in massas compacta grandiores molles ad emplastri vel extracti cōsistentiam accedentes intra digitos lentescentes crass, odore grato colore ex rufonigrescente vesicis seu pelliculis involutas. labdanum en masses ou en pains hoc eligatr.
altera in paltes contortos siccos duros fragiles calefacti paululum mollescunt arenula tenui nigra permistos colore nigro odore debiliori labdanum en tortis frequentius reperitr.

per analysim patet constare ex oleo tenui
et crasso cum sale essentiali ammoniacali
sed ℔ II ladani, arenae ℥ XXIIII circiter
continere. haec arena ferruginea est unde
calcinatione rubrum.
externe emollit concoquit attenuat et
resolvit, interne astringit roborat et do
lores sedat. minus frequens usus internus
ad ventriculum roborandum coctionem juvand
adversus serosam colluviem et catarrhos in
dysenteriis ℈I pondere praescribit
laudat in frigida cerebri intemperie applic
applicatum in odontalgia temporibus. in ven
triculi imbecillitate ejus regioni. adhaere
antiqua sinuosa cum tumore et durit[ie]
℞ ladani puri ℈I nucis mosch ℈ß
cardam ℈I mastiches gr VIII jalap
pulver ℈I olei cinnam gutt VI syr
de stoechad q. s. f. massa pilul dosis gr.
XV vel XX hora somni in catharri
a causa frigida.
℞ ladan. puri ℥I corall. rubr pp ℈I
mivae cydoni ℥II m. f. bolus in
ventriculi imbecillitate et dysenteria

℞ ladan. ℥ß styra. Calam. ℥iii Benzo ℥ii ligni aloes, cinnam. santali citr. aa ℈ii caryophyll. macis, lavendul. cort. citri aa ℥ß camphor ℈i cum styracis liquid. q.s. f. mass. in mortario calido addendo si volueris ambrae et moschi momentum ex ea globus formetur manib. gestiendus vel collo appendendus ad aeris contagium inhibendum

Mastiche mastix et resina lentis cina. resina est arida eleganter pellucida, ex flavo pallescens in lacrymas vel grumos concreta, pisi minoris vel orizae crassitie fragilis quae statim sub dente dessilit mox tn calore lentescit adinstar cerae prunis injecta flammam concipit odorem q non ingratum spirat, sapore leviter aromatico resinoso et subastringente.

eligenda candida, ad citrinum vergens pellucida arida fragilis stridens odorata. nigra viridis livida aut impura nullius est momenti. ex chio maris aegei insula resinosae quaedam massae aridae ad medicinam prorsus inutiles, ad lapidum scissuras replendas

constat oleo multo denso ac spisso sale acido plurimo exigua salis alcali et terrae portione, parum tenuiumetvolatil inter astringentia et stomachica re censetr. humorum acrimoniam demul cet salium spicula involvendo et mbra nas illiniendo. intus a ℈β ad ʒβ haemoptoe et veteri tussi. diarrhoeas sistit et purgantium acrimoniam de mulcet. Simon pauli adversus cathar et gravem auditum pyretro et tabaco anteponit quippe quae majorem sali vam moveat grati sit odoris et saporis surditatem masticatione sanari asserit cum materia peccans in meatu a tym pani cavitate ad palatum elicitu pro licitr. temporibus defluxiones et odon talgiam sanat.
℞ mastich grana selectiora, cerae instar dentib. atterantr ad salivationem in catarrhis et gravi auditu
℞ mastiches ʒβ coquatr in aq. ℔ııı ad 3^am^ ptis dim. detr in diarrhoea pro potu solito.

℞ conserv. rosar. veteris ℥i mastich selec. ʒβ diacod q. s. m. f bol. in tussi ferina et catharr.
℞ mastich ʒβ jalap pulver gr. X elixir pp̄rieta vel balsam peruvi: q. s. f. pilul. vespero exhiben. ad catarrh.
lignum lentisci arboris ex qua exudat mastiche omnibus suis ptibus astrictorium a Wencku doctore medico, magnopere comendatr et ejus decoctum qd auri potabilis vegetabilis titulo insignitur in articularibus morbis catarrhis. ventriculum roborandum demulcendo salium acrimoniam. idem decoctum dentes vacillantes firmat gingivas astringit
℞ ligni lentiscini in virgulas tenues scissi ℥v aq. com ℔VI macerentr per 3.as 4.or ve dies in vase clauso, adhibeatr pro potu solito
℞ lign. lentis ℥v aq. com ℔VI macerent per triduum posteā coquant tanti ebulli ad 3am ptis dimi. mane jejunio ℥VIII et hora somni propinent.

160 Olibanum thus et thus masculum encens ou oliban substia est resinosa ex flavo pallida et pellucida in la crymas mastychi similes sed majores concreta et indurata; saporis amari cantis modice acris, et resinosi non ingrati, odoris fragrantis. flammae admota statim in luculentam et per tinacem flammam exardet nec acensa diffluit ut mastiche. guttae alias singulares alias gemellae testiculos aut mammas prout majores vel minores fuerint imitantes unde maris aut foeminae cognomen

probatur candicans pellucidum purum nitidum siccum, ex arabia aut aethiopia plus terrae et salis ammoniacalis quam mastiches continet salinae verae et oleosae ptes intimius commistae interne ad varios capitis et pectoris affectus ad alvi uteri q profluvia tussim sanguinis excreationem diarrheam et dysent. acriores succos et lympham prae cipue salsam demulcet a ℈I ad ʒII

singulare specificum habet adversus pleuritidem praesertim epidemicam in hoc casu quercetanus laudat pomum excavatum olibani pul. ʒI repletum postea operculo tectum et sub cineribus coctum qd aeger degluttiat superbibendo aq. card. benedic ℥III postea contectus sudet riverius testatur sibi feliciter successe ad extrema post venae sect. bezoarticum licet non semper

capitis et nervor vulnerib. ext. educit liquor ex thure per deliquium parat. si pulvis ejus in ovi albumine cocto et calenti reponatur in cellâ, thus ita resolvitur in liquorem ad maculas faciei et cavitates cicatricum delendas non contemnendum.

℞ olibani pulve ʒß flor. sulphur ʒI excipiantur s.q. Zingib. cond vel conserva apii f. bolus in asthmate

℞ thuris masculi ʒI agaric trochis. ℈IV cum hyssop succ. fiant pilulae n° X adversus tussim a pituita et catarrho quarum unam tantum quotidie sumat aeger vesperi hora somni.

 ℞ thuris mastich a ℥II luti armen
℥I corallior rubr. pp. c.c. ust a ℥ß
lapid haemat ℈II omnia accurate
pulv. simul misc. f. pul. dosi ℥ß
in dysent.

Sandaracha vox est tribus
diversis substis attributa
1º cuidam arsenici rubri speciei
2º resinae juniperi
3º substiae mediae inter mel et ceram
quae saepe invenitur in favorum
inanitatibus seposita et est apum
dum operantr cibus haec inusitata et
in officinis incognita
itaq hic de arabum sandaracha vernix
et gummi juniperinum off. substia
est resinosa, arida inflamabilis, pellu
cida pallide flavescens vel citrina
in guttas mastichi similes teretes
saporis resinosi, odoris dum accen
ditur fragrantis et suavis quae in aqua
non dissolvitur, in oleis ttum vel spiritu vin.
ex africa affertr per massiliam
ad mastichem accedit sandaracha
plus tn salis ammon. et olassa ptes tenuiores

eaedem fere quae mastichi virtutes
varius tri ad usum inter. a ƷI ad ʒI
intus sumpt. haemorrh. et diarrhaeis
antiquis medet. ulcera interna abs
tergit et consolidat.
externe sanguinem sistit ulcera putrida
sanat artuum dolores demulcet
illius suffitus ad catharros. oleo rosaceo
vel alio soluta ad dolores et tumores
haemorrhoi. utilis. et hiantibus frigore
manuum pedum q. scissuris succurrit
℞ sandara ʒIII mastich ʒI benzoin
ʒß rasum succ. ʒII m. f. pulvis pro
suffitu in catarrhis et coryza

Sanguis draconis sang de
dragon. subst. resin. sicca friabilis
igne facile liquescens, inflammabilis
obscure rubra. quae trita elegantem
colorem rubrum sanguineum reddit
dum in laminas tenues extenditur
pellucida, saporis et odoris expers nisi
cum incenditur tum exhalat odorem styraci
duplex occurrit durus scilicet in gru
mos seu massulas concretus pollicem

174 longas et semi unciam crassas quae foliis longis et angustis quasi junceis vel palmeis involutae: impuras cortibus ligni terra aut aliis heterogeneis per mistas in massas convertas
saepius quoque spurius venali prostat in officinis qui facillime a genuino disgui pt. massae st gummosae rotundae compressae obscuri et sordidi coloris rubri conflatae ex variis gummi specieb legitimo sanguine draconis vel brasilio ligno tinctis, quae nullo modo flammam concipiunt, sed in igne bullas agunt crepitant q gummi instar lentescunt et solvuntur in aquâ quam mucilaginosam reddunt; prorsus rejiciendae sunt
probatur qui in guttas puras, nitidas obscure rubras inflammabiles et foliis involutus affertur; qui pulveratus colorem coccineum exhibet
vi pollet incrassante exsiccante astringente in dysenteria haemorrhag. vehementioris fluxib ac ulcerib internis a ʒß ad ʒ1

externe glutinat exsiccat. commixtus dentes firmat et gingivas roborat.
℞ sanguinis draconis, corall rubr. ā ℨI m. f. pulvis qui dividatur in sex doses 4ª vel 6ª quaque hora exhibendas in cruenta expuitione aut haemorragiis.
℞ sang. drac ℨI alum cristall ℨII conserv rosar rubr ℨIII m. f. elec. cujus dosis ℨI 4ª quaque hora iteranda in hemorrhagia vehementiori
℞ sang drac. coral. rubr. terrae japon et boli armen lotae ā ℨß mirae cydon q. s. f. elect. in dysenter.
℞ sang. drac ℨIII camph ℨII terebint venet. ℨII m. fiant pil. ad gonorrh. doses ℨß
pictoribus inservit et ex ea fit vernix rubra qua cistae et pixides sinenses obduci solent.
Styrax vel storax duplex liquidus et solidus de liquido jam egimus
solidus est subtilia resin. cujus duae species
Styrax calamita storax en larmes est subtilia resin. nitens solida, non nihil

176 pinguis sub dentib lentescens, ex can
dicantibus vel rufescentibus grumis concreta
sapore resinoso subacri non ingrato
odore fragrantissimo praesertim in prunis
injecta, quae igne cito liquatur flammae
admota flammam concipit, et claro
incendio lucet. olim ex pamphylia
Styrax vulgaris seu in glebas compactus
resine de storax, e flavo rubens vel
fusca, splendens, pinguis melleum
liquorem veluti exudans aliquot micis
candicantibus respersa ejusdem cum
priore odoris et saporis.
ex india per massiliam affertur
tandem scobs quaedam lignea nonnihil
resinosa odore styracis perfusa, venalis
prostat in officinis sciures de storax
prorsus abiicienda
minorem salis ess. volat. quantitatem
continet quam benzoinum plus vero
olei tenuioris.
Benzoino paulo fragrantior ob majorem
olei tenuissimi copiam. minus tamen de
beryit propter minorem salis ess. quantitatem

ab ejus suave olentem fragrantiam
ad spiritus animales recreandos et ob
ejus vim anodynam. dolores capitis et
tussim inveteratam sedat. raucedini
gravedini et capitis distillationibus
a ℈ß ad ʒß externe in suffitu caput
roborat, vertigini paralysi et doloribus
a frigore
℞ styr. calamit Benzoin a. ℈i succi
liquir. ℈ß laudan op. gr ß elixir prop
q. s. f. pil. hora somni exhib. in
cephalal, coriza, catharr et tussi invet.
℞ styr ʒß balsam peruvian ʒß f.
linim. ad artus paralytic aut rheum.
dolorib. inungendos.
ejus oleum odoratum ad ulcera intern
praesertim pectoris gutt 8 vel 10

tacamahaca subtilis est resin
arida odore fragrans. cujus duae species
una quae praestantior, sublimis et in conchis
dicitur. en coque. resin. est certe pinguis
tamen et molliuscula pallida nunc flaves
cens nunc virescens in conchis collecta foliis
cooperta, odoris aromatici fragrantissimi.

178 ad lavend. et ambar ciner. accedens saporis resinosi aromatici raro in offic altera species vulgaris et in granis vel in glebis albicantib flavescentib, rufescen, virescent. aut variegatis semipellucid odoris fragr. ad prioris odorem accedentis, sed minus grati ex insula madagascar multum salis acidi sed tenuioris cum oleo subtili ējuncti obtinet mediocrem olei crassioris portionem et aut per parum terrae, ideo tenuiss. donati pt̄b raro interne usurpatur a quibdam in pectoris affectib.
tumores resolvit et maturat, defluxiones in oculos et alias faciei ptes revellit linteo excepta et emplastri mode tem poribus aut post aurem applicata aut suffitu naribus attracta. umbilico imposita passiones hystericas et suffoca tionem uterinam sedat ventriculi regioni applicata illum roborat. in febrib. malignis hoesterus refert emplastr de tachamacha capiti raso admoto surditatem se curasse

℞ tachamahacæ ℥iß · styrac. calamit.
℥ß olei nuc. masch q. s. f. emplastr.
ventriculo impon. in ventriculi dolore
imbecillitate et colicis doloribus.

℞ tachamah. ladani a ℥ß castorei
℥ß olei succin q. s. m. f. emplastr.
umbilic. applicand. in passione hyster.
et suffocatione uteri.

℞ tachmah. et caranniæ a q. s. dissol.
in olei ess. lavend. q. s. f. linim.
quo ptes paralysi affectæ vel dolorib.
rhumaticis inungantur.

De Succis gummosis

Gummi arabicum succus est
teretus in grumos, nucis juglandis
magnitud. et amplius, globosos alias
longos et teretes vermium instar pellu
cidos ex flava pallescentes aut omnino
flavos aut rutilos superficie fere ru
gosos fragiles, et intus splendentes vitri
instar, in ore lentescentes dentib. adhær
aquæ in qua dissol. lentorem viscidum
conciliantes, saporis expertes ex ægypto
arabia et africanis oris affertur.

probatur candidum vel pallide flavescens pellucidum, nitens, siccum nullis co inquinatum sordibus.

Analysi Hii exhibuerunt phlegm in odori saporis expertis et limpidi ℥III ʒV acidi et rubescentis ℥X ʒIII gr IIII liquoris alcali ℥I ʒVI gr XXXVI olei tum tenuioris tum spiss. ℥I ʒV gr XXIII massa nigra in retorta superstes pendebat ℥VII ʒVI quae per horas 3a quae crucibulo igne reverberii calcinata reliquit cinerum leucophaeorum ℥I. gr XXXVI ex quib salis alkali fix ʒIII XXXVI extracta sunt.

igne in carbonem conversum non flammam concipit unde liquet compositum esse sale salso cum oleo crasso et terrae portione non mediocri conjuncto

pectoris mix mucaginosis lympham acrem demulcet tenuiorem inspissat vehementiorem humorum motum sedat in faucium asperit. raucedine tussi catharrosis, haemoptysi, stranguria et urinae ardore a ℈I ad ʒII.

evenit quoque ubi mucus quo pectoris interne

obducuntur abrasus sunt velut in faucibus ventriculo intestinis vesicâ et urethrâ meatus enim mucagine sua obiicit. praeterea utiliter cum medicamentis acribus miscetur ad eorum vim temperandam externe vulneri ac malum sanguinem sistit at optime pulverata in mortario calido obtundi debet

℞ gum. arab. ℥I succ. glycyr ʒß sacch. candi ℥ß aq. flor. aurant. q.s. fiant trochisci vel rotulae ad faucium asperitatem raucedinem et tussim diuturnam

℞ gum. arab. ʒß pul. glycyr ℈I f. pul in urinae ardore

℞ gum. arabic ʒß dissol in aq. scabi ℥III dilue theriac ℈I diacod ℥ß aq cinnam. spiritu ℥I f. potio cochleat noctu sorbillan. adversus tussim vesperinam inter decumbendum in lecto vehementer divexantem.

℞ gum. arab. ℥I coq. in aq. hord. ℔II ad solutionem. cum ea et sem melon papaver alb. amygdal. dulc. excorticatur.

182. ℥ fiat emuls. cui add. syr. althææ ℥III hauriat per cyathos in quolibet urinæ ardore.

℞ gum. arab. ℨß solv. in aq. pulegii vel papav. errati q. s. solution. add olei lini recenter express. ℥I syr. de ibisco vel de symphyto ℥II m. f. linctus in tussi catharrali hoemoptoë

Gummi senega vel senica aliud est gummi genus arabico proximo simil ex provinciâ nigritarum juxta fluvium senum

Gummi nostras ab arabico discrepare non videtur ex cerasis, prunis, pomis, persicis & stillat iisdem virtutibus cum arabico donatur. verum ad usum medicum gummi arabicum anteponitur

Tragacantha gomme adragant succus est gummosus modo in filamenta longa, teretia diversimode contorta exiguos vermes referentia, modo in grumos circulus candidus semipellucidus nonnunquam flavescens rubescens aut nigricans, siccus aliquantisper tñ lentescens sapori et odoris expers ex creta, asia, et graecia.

rufescens et nigricans rejicitur.
iisdem fere propriis ac arabicum gummi
paulo plus tn acidi continet minus autem
olei paulo plus terrae, aquâ maceratum
admodum intumescit. exigua hujus
muci portio ad magnam pulveris molem
in massam compingendam sufficit.
iisdem virib. et eadem dosi ac arabicum
ingreditur pulverem sympaticum qui
convenit in vulnerib. cum contusione ossium
fractura et allis ubi suppuratione opus est
conficitur ex aequali vitrioli romani sub sole
calcinati et pulveris tragacanthi portione
accurate permixtis. tragaca. vitrioli vis
trichionem minuit.
℞ succ. glycyrr terrae japonicae a
ʒI sacch. candi ʒIII opii gr II mu
cilag tragacanth spissior q.s. fiunt
trochisci sublinguales ad excipiendos
humores catharrales et tussim sedandam
℞ tragac. contusi q.s. digeratur in aq. sub
q.s. donec syr. consisten nanciscatur. tunc
℞ hujus mucilagin ʒIII aq. naphae ʒI
olei amygdal dulci ʒI syr de althae ʒII
m f. looch

184 ℞ mucilagi. tragac. dilutior ℥II olei lini ℥I syr. jujub et diacod a ℥I fiat looch.

Manna solutiva. cinabra. succus est melleus modo in granula modo in lacrymas stirias aut grumos concretas friabilis candicans dum recens est et quadantenus pellucidus, per tpus rufescens et aere humido liquescens ad mellis consistentiam sapore grato sacchari cum aliqua acredine

probatur manna candida vel flavescens levis in granula vel stirias cavas ēructa sapore dulci nec injucundo minus sordida.

rejicitur pinguis mellea sordida nigrior pinguis et mellea manne grasse pinguis ... ram antepoinitur. qdo quidem haec mellea saepius depravata est tum ab humidiori aëre tum etiam eo qd eistae aqua marina vel pluviali aut alia madefactae fuerint, saepe etiam pinguis haec manna nihil aliud est quam saccharum crassum cum melle et pauxillo scammonii ...

unde haec manna pinguior et mellea
vehementer aliquo purgat.
rejiciuntur quoque massae quaedam
candidae opacae tn solidae graves non
striatae quae nihil aliud sunt quam
saccharum et mannu simul cocta
ad electuarii solidi existentiam
sed facile distinguitr haec artificialis
manna a legitima densitate gravitate
candore opaco et gustu a manna dicum
in calabria et sicilia fluit ex fraxino
et orno. mane columnes praestantior.
constat sale ess. seu tartaro copioso
et exigua portione salis ammoniaci
multo sulphure tum tenui tum crasso
involutis
mitissimum habet modum catharticum
qui tute senibus pueris, foeminis etiam
praegnantibus et delicatis exhiberi pt
conveniet praecipue frigidis nobis, cplexionib
et regionib tperatis humorum acrimoniam
demulcet, lentorem dissolvit unde il catharsis

 et tussi a pituita tenui et acri initio
feliciter exhibetur. in biliosis affectionib
caeterisq in quib adest inflamatio, in pleu
ritide, peripneumonia et abdominis
tensione humorem solvendo et per
alvum subducendo. quid in contrarium
dicant non nulli.
tperamints calidis nocet inquit volfinum
nisi acida illi admisceantur ut tamarindi,
cremor tartari, succ. limon. nitri puri
sal polycrest. vel pulpa cassiae
hoffman. dicit flatuosam esse et facile
fermentescere itaq decoquendam leviter.
siccitatem affert et serosos humores eliminat
quod sit purgans mitis et efficax.
si stimulo egeat sem. aut rhabar. admisce
et potentius tartari stibiati granis ali
quot in plures doses distributis uno
pro singula dosi. sic absq alia mo
lestia, nausea, vomitione aut torminib
copiosa seri biliosi evacuatio promove
bitur
℞ man. calab. ℥ii cryst. min. ʒi c. sol. in jure
alterante. ad alvum blande emolliendum

℞ mann. elect. ℥II tamarin ℥I bulliant
in seri lactis ℥XII f. colat. in duas doses
div. unius horae intervall.
℞ mann. calabr ℥Iß. rhei el. et salis
veget. a ℥I bull. leviter in decoct. rad.
gramin. et cichor. sylves ℥VI colatur
add. succum acidum express. ex malo
aureo vel citrea
℞ medul. cass. cum nucl ℥I mann
calab. ℥Iß sal. polyer ℥I bull. in aq
cichor. ℥VIß f. colat. in qua diss. syr
de pom. comp. vel flor. persic. ℥I f.
potio mane duab. hor. ante jusculum.
℞ medul cass. recent. extr. e siliq cum
nucleis ℥III mann: calabr. ℥II bull
in decoct hord. ℥XII f. colat. in qua
diss tartar. stibiat gr VI dividatur li
quor in duas haus 4ª quaque hora interjecto
jusculo.
℞ mann. calab ℥III tart. stib. gr V
diss. in aq. pur ℔II f. colat. per
cyath. propinand.
℞ mann. calabr ℥iß vel ℥VI lactis vacc.
℥III coq. et exhibe. colat infantibus

℞ man. calab. ℥II sal. com. ʒß diss. in aq. com. bull. ℥IIII in dissol. tund. amygdal. amar: N° VI add. lact. vaccini ℥IIII f. colat. cum expressione calide sumat
℞ fol. orient. ʒIIß cinn. et corian a ʒß glycyr. rasae et contus ʒII sal vegeta. ʒI macer: in aq. lingu. ℥VIII per 6 hor. in col. dilue mann. cal ℥IIß clarific cum ovi album, et aceti fortis ʒß f. potio
℞ man. cal. ℥II fol. ori. ʒII rhei et min. corii et sal. polych. a ʒI mace per duas hor. in succ: velut ℔ß cum folior. oxyphyl, acetos. cherefol pimpin. lactuc. portul et cichor sylves a m I. f. colat. in qua tunde cor ticem extern. flavum pluriu citreor tenuiter sectum coleh denuo et calens exhibeatur.
℞ mann. calab. et confect. universali a ʒI bull in aq plantag ℥VI f. colat in diarrhea et dysenteria.
℞ mell. aerei ℥Iß electuar cathol cum rh duplic ʒI bull. paullisper in decoc. gram. ℥VI f. col. cui add olei amygd. dul. ʒI

propinet in colicis doloribus et viscerum inflammatione ubi purgatione opus est.
In quibusdam purgantibus et alterantibus loco conservae mannam adhiberi potest.
℞ mann. elect. ℥II pul. jalap. gr XII pulv. cornach. ℈I aquil. alb. gr X syr. de rhamno cathar. q. s. f. bol
℞ man. elect. croci mart. cum sulphure maiorib. pp. a ℥ß myrrh. croc. orien et aquil. alb. a ℥II aloes lotae crem tartar. et gum. ammoniac a ℥III diacrid ℥Iß misc. cum syr. de cichor. comp. c. rh. q. s. f. s. a. mass. pilul mesenteric. dari ℥ß quotidie vel ℥I 3° vel 4° quoque die.

De Gummi-resinis

Ammoniacum gummi succus est concretus inter gummi et resinam medius dum manibus tractatur calore mollescens, modo in majores glebas coactus et ex grumis congestus unguibus lactei coloris nitentibus aut rufis disseminatis per substantiam coloris obsoleti et fere fusci

inseo in lacrymas seu grumulos densos
solidos q̄ teretes thuri non dissimiles
foris flavescentes vel fuscos intus can-
didos aut flavescentes nitidos et splendentes
sapore 1.ᵐᵒ dulci, postea amaricante,
odore fragranti ad galbanum acce-
dente sed virosiore. sub dentibus
facile diducitur sibi cohaerens magis
albescit. carbonibus accensis injectum
inflammam exardet aceto vel aquâ
calida solvitur ex alexandria aegipti
lacrymae pro usu intern. glebis antepon
per analysim liquet multo sulphure
tum crasso tum tenui constare cum
sale tartareo et ammoniacali paucâ
vero terra.
vires duras emollit humores crassos
incidit, lentos ac tenaces resolvit
collectos discutit, asthmaticis prodest
cruda pulmonum tubercula dissipat
viscerum scirrhos resolvit menses
promovet obstructiones aperit, articu-
lorum tophos discutit et alvum nonnunquam
sblande[?] moderate ducit a ℈ß ad ʒi

externe in scirrhis, tophis scrophul.
resolvendis adhibetr.

℞ gum. amm. elect ℥ß dissol. in mort.
cum aq. hyssop ℥IIII vin alb. ℥II
colatura sit pro duab dosib. in asthmate

℞ gum. amm et flor. benzoi a ʒß
balsam sulph anis q. s. m f bol. ad
pulmon. infarctu dissol

℞ gum. am. purissi ℥Iß flor benzoi
ʒI pulv. milleped ℥III extrac croci
balsam peru a ℈ß balsam. sulph.
terebenth q. s. f pilul. a rich morton
in phtisi scrophulosa incipiente plu
comendat dosis gr XII ter in die

℞ gum. am.. aloes lotae a ʒI myrrhae
sol. senn pulver. croci a ℥ß syr
de absynth q. s. f pilul. in uteri et
viscer. obstructione dosis ℈I quotidie

℞ gum. am. pul. millep a gr XX aethiop
min. ʒß conser. flor. calend. q. s. m
f. bol. singul. dieb. exhib. ad scrophulas
purgando 4° quoque die cum bolo sequenti

℞ gum. am. aquil. alb. a gr XV tro
chisc. alhandal gr X syr. flor persic
q. s. f. bol.

℞ gum. am. aloes, croc. martis aper.
a ℥I cinnam. nuc mosch. a ℥β
tartar vitriol ℥II conser flor. calendul
℥III syr. de absynt q.s. m.f. electu
dosis ℥II bis die in mensium supp
et hepatis uteriq obstruct.
℞ gum. am. cremor tartar a ℥ sem
pulv. ℥VI diaph. min. ℥III agaric
trochisc ℥II trochisc alhandal ℈II
diacryd ℈I electu catholic vel benedi
laxativ ℥II syr flor. persic. q.s.
f. electu. cujus dosis ad ℥III alternis
diebus in mezenterii obstructione invetera
℞ gum. am. emplastri de cicuta ana
m. fiat emplas. schirrho hepatis lien
℞ gum am. q.s. olei caryophill arom
et olei amygdal dulcium a q.s. fiat
linim. ad tumores scrophul. et articul
tophaceos resolvendos.
oleum flavum per retortam extrahitur
in asthmate et difficili respiratione
oleum vero nigrum ultimo prodit ad
tumores scrophulosos resolvendos utile

Laserpitium, stercus diaboli

Assa foetida. assae nomen duob[us]
succi concretis tribuitr. unus assa dulcis
qd Benzoinum de quo inter resinas actum est
alter assa foetida ob vehement. graveolentiam
est gummi resinae species compacta cerae
instar lenta et sequax ex variis splen
dentibus grumis partim albicantib. et
rufescentib. aut violaceis in glebas gran
diores, odore viroso ad allium accedente
sed vehementiore, sapore amaro acri
mordace: una pura altera impura
ex persiâ et indiâ asportatr

componitr ex sulphure foetido tum tenuiore
cum crasso copioso, non mediocri salis
acidi portione, exiguâ salis volatilis uri
nosi portione, medicâ terrâ unde pro sali
no sulphureum cujus portio non medio
cris spiritu vini solvitr et major pars
aqua calida.

utiliter in colicis flatulentis aff. et hystericis ext. et
int. pellit menses, diaphoresin et sud. movet
nervor. affect. paralysi. a gr. XII. ad ʒi
in asthmat. cum ovo sorbili sumpta commendatr.
tquam efficaciss. contra vim opii et caeteror
narcoticor. odore mulieres a suffocatione
hysterica liberat: externe emollit et resolvit

194 ℞ ass. foetid ʒß salis ammon: gr XVIII extract. papav. rhoead q. s. m. f. bol ad diaphoresin promovendam.
℞ ass. foetid et myrrh a ℈ extract. croc gr II cum conserv. flor. calend q. s. ad menstr: promove.
℞ ass. foetid ℈I castorei gr VI succin pp gr XX extr. meliss q. s. f. bol in pass. hysterica.
℞ ass. foetid granor junip. et castor a ʒß mell ℥IIIß f. elect dos. ʒI adversus soporem nimium ab opio aut aliis narcoticis
tinctura anti hysterica ex assa foet. cum spiritu vini tartarisato cujus dos ad ʒII

Bdelium est gummi resina in glebas diversae figurae et magnitudinis, extus myrrham vulgarem aliquo. referens coloris ferruginei rubentis intus quoddam modo pellucida, et taurino glutini aliqua tenus similis, fragilis in ore mollescens dentibus adhaerens, sapore ~~amaro~~ amaro longe remissiori quam in myrrha, odore non insuavi praesertim dum incenditur, saepius cum myrrha in cistis permixtum reperitur flammam emittit luculentam durabilem crepitando

emollit discutit aperit atque abstergit
secundum aetatem recens emollit magis
vetus abstergit magis intane varie etiam
commendatur tū in affectibus pectoris
tussi respiratione difficili pulmonum
apostemate ad urinam ciendum et cal
culos expellendos
pilulae de bdellio in fluxu haemorroidali
valde laudantur a pluriminis potenter enim
fluxum inhibet imprimis si accedat
suffitus bdellii receptus per anum
℞ bdell. opthin ℥ XII sem ammeos ʒ III
myrobal. chebul. indor. bellirior. em
blicor. conchar venear. ustar. succin. pp
a ʒ I I ß cum mell. rosat q. s. f. mass
pilul dos ʒ. I in fluxu haemorroidali
Euphorbium est gummi resina
concreta in guttas vel lacrymas ex pallido
flavescente aut coloris aurei splendidi
modo rotundas, modo oblongas ramosas
et cavernosas saporis acerrimi exurentis
nauseosi: odoris expers in africa per
salam urbem.

 est acerrimum omnium ardentissimumque hydragogum
adeo tenuium est partium ut vel odore solo sternutatorium sit; ejus oleo perunctae nares aquoso multo stillant humore.
ejus pulvis naribus exceptus tantum excitat irritationem ut saepius haemorragiam nimiam provocet et cerebri m̄branas inflammet.
externe tumores crassos et lentos incidendo digerit imo ruborem infert, inflamaõem excitat et nonnunquam exulcerat. quapropter a mesue c̄mendatur quam proficuum resolutis convulsis stupidis tremulis cæterisq nervorū morbis a frigore si ex leucoii oleo laevigatum exterius inungatur. jecori lieni que inunctum eorum dolores a frigore et flatibus provenientes tollere. occipiti confricatum veternosos obliviosque juvare asserit comendicis et paralyticis confert
permanus scirrhosos tumores paucis dieb euphorbio oleo soluto dissolvit. egregium dr pulveratum ossib cariosis solum vel cum iride vel aristol rot.

℞ euphor sect ℈i terebent venet ℥ß
ceræ parum. fiat unguentum calide
applicandum loco puncturæ nervi

Galbanum substa est pingui,
ceræ instar ductilis semipellucida splen
dens, mediæ naturæ inter gummi et
resinam, accenditr igne ut resina et ut
gummi igne aqueo solvitr, non oleis.
colore albicante fere translucido dum
recens est postea flavescente aut ruso
sapore amaricante acri, odore vehe
mente cum gravitate quadam virosa
aliud in grumos seu lacrymas, en larmes
aliud in massas en pain ex syria per massiliam
constat sale tartareo et oleo crasso fœtido
intus viribus cum ammoniaco convenit
licet debilius pituitam tenacem resolvit
unde asthmati conducit et tussi veteri
flatus discutit, menses movet ejus suffitu
in uteri suffocatione. externe incidit po
tenter attrahit emollit et maturat.
℞ galb. ass. fœtid. myrrh a ʒß castorei ℈i m
f. trochis pro suffitu in hister. paroxismo

 ℞ galb. gum. am. ā ʒII vitriol mart. river ʒß diacryd. ʒX syr. de rhamno cathar. q. s. m. f. massa pilul dosis a gr V ad ℈I in mensium supp. et retent. post partum purgamenti, modo absit inflamāo.
℞ galb. ass. fetid. myrrh a ʒI camph. sal succin a ℈ß boracis ℈II syr. de arthremisi q. s. m. f. mass. pilul dosis ℈I in hyster. pass. et purgam. post partum suppress.
℞ galb. q. s. dissol in olei succin et ol spicæ a. q. s. fiat linimentū quo ptes cvulsæ et paralyticæ inungant; vel
℞ galb. ℔I gum. heder ʒIII ol. tereb ℔ß oleor. laur. et spicæ lavendul a ʒI digerant per duos hesre dies postea distillent ex retorta et serves ad usum

Myrrha succus est resinoso gummosus in fragiles teretes glebas variæ magnitudinis modo avellanæ modo nucis magnitudine, modo majores colore flavo, rufo aut ferrugineo, pellucidas nitentes quae fractæ venas albidas

semicirculares seu lunares ungium modo ostendunt; sapore amaro subacri aromatico nauseoso tn odore gravi nares feriente, dum conteruntur, nec insuavi suffitu dum comburuntur. probatr friabilis levis undequaq con color. amara, acris, odora. ex aethiopia est acretum ex resina, tartaro, et ammoniacali sale adeo accurate permiatis ut a se invicem separari vix possint sguinem crassum ac viscidum, bilem grumescentem et humores glutinosos et concretos potenter dissolvit. menses et haemorroidalem fluxum movet; pulmonum infarctu discutit, in asthmate tussi ictero, in scorbuto et cachexia vermes enecat amarore, ventriculum roborat, in febrib malignis putridis morbillis et variolis putredinem arcendo blandam transpiraoem in ulceribus sum internis sum exter. t quam balsum putredinem uleerosam corrigit, in dysenteria sub forma boli a ∂ß ad ʒß raro soluta ob insignem amaritiem.

 externe attenuat, discutit, et egregium traumaticum, gangrenæ et corruptioni vulnerum ex defectu spirituum in parte læsa, cariei ossium medetur.

sed non semper innoxia siquidem ejus odor dolorem capitis inducit quosdam quocunq in loco sanguinis eruptiones excitat et auget quapropter illius usus in illis qui sputo aut mictu cruento aut hoemorragiis, malum sopitum revocat, neque gravidis mulier. exhibenda ejus præparationes notatiores sunt tincturæ et olea. tinctura a gutt V ad ʒß

aliud oleum per deliquium paratur si ova recentia ad duritiem cocta in duas partes incis. exemptis vitellis cavitates impleantur myrrha electa pulv. mediocriter juncta et filo leviter constrictæ in cellu vel alio humido loco suspendantur ita ut liquorem in vas distillet. humor ille blando igne vase aperto ad quartæ partis diminutionem exhalet et servetur ad usum commendatur ad lentigines varos faciei et deformes vulnerum cicatrices delendas.

℞ myrrh. elect. gr XII croci mar
apon et gum. am. a gr X syr de
absynth. q. S. f. bol man et sero
cahib in mensium supp.
℞ myrrh gr XV. boracis ℈I cinn
am. gr XVIII f. pul. conser. absyn
vel calendul. q. S. excipiend. f. bol
ad menses supp: aut puerperar purga
menta et ad fetum mortuum expellendum
℞ myrrh. et olibani a gr XV croci
pulver. gr VI balsam. aegiptia qS
f. pilul incipienti phthisi ad pul
mon. tubercul. resolvenda.
℞ myrrh elect ℈ß diaph. ciner
viperinae virginia a ℈I m. f. bol
cum f. q. syr caryophyl. hort. in variol
morbillis et febrib maligni morii
℞ rad. aristol. rotund. ireos florent
euphorb. a ℥I myrrh. aloes a ℥Iß
m. f. pulvis ossi carioso inspergendus
vel ex eodem pulvere extrahatur tinctu
ra ope spiritus vini ad putredinem
carnium arcendam.

Opopanax succus est gummosus et resinosus concretus in grumos, pisi circiter magnitudine, nunc majores nunc minores, foris rufescentes, intus vero ex flavo albicantes, intense amaros, acres graveolentes, aliquantisper nauseosos, pingues friabiles tamen. sordidissimas in glebas compactus sub inde affertur ex rufo nigricantes, caulium festucis aut quisquiliis permixtas eliguntur lacrymae nitidae, pingues friabiles, colore foris croceo interne albido aut sub fulvo sapore amaro odore gravi. affertur ex oriente. flammam concipit sicut resinae aquâ solvitur ut gummosae substantiae sed aquam efficit lacteam ratione olei copiosi constat ex tartaro. sale ammoniacali et oleo arcte conjunctis. tumores viscidos discutit et alvum citra molestiam purgat. unde in cerebri et nervorum morbis paralysi epilepsia mensium suppress. a ℈ß ad ℈I

externe tumores emollit et discutit
scirrhos nodos et ganglia resolvit
℞ op op ʒß croci gr VI cinnam ℈I
cum syr. de absynth q.s. m.f. bolus in
mensium supp.
℞ opop rad. irid. flor. agari. [illegible]
a ʒß syr de erysimo q.s. m.f. bolus
in asthmate.

Sagapenum succus est
medius inter gummi et resinam, modo
guttis magnis constans veluti thuris
modo in glebas magnas compactus
externe rufescens, intus corneo quo
dam colore praeditus, sub dente vel
etiam digito lentescens, albescensque
mordaci et acri sapore, odore vitoso
gravi, ad porri et pinus saporem
accedente et quasi medio inter assam
foetidam et galbanum. candelae ad
motus flammam capit et aqua et
vino vel aceto super prunas incoctus
totus resolvitur, impuriores occurrunt
in officinis concretae et veluti fusae co
lore obscuro aut sordido sapore et odore simili

 ex persia et oriente nobis affertur.
constat ex sulphure sale acido et vola
tili urinoso cum paucā terra que
compositum constituunt resinosum et
salinum ammoniacale.
potentissime aperit discutit et attenuat
non leviter etiam abstergit et debilitat
purgat. in affectib. pectoris a ℈i ad ʒi
menses movet et fetum enecare dr.
commendantur pilulae ad quartanam a
quercentano
℞ sagap. elect. ʒvi ammon. puriss ʒiii
extract. trochis. alhand ʒi samm. pp.
ʒi salis gem. ʒiβ m. cum syr. vio
laceo acidulo tincto. fiat mass. ex
pilul. efficiantur pisi aut ciceris magni
unica pilula exhibeatur initio paroxys
continuando per aliquot dies. conducunt
etiam hypocond. infarctib. a crass. glutin. humor.
cater. viscerum, incantamenti instar,
obstructiones tollit
Sarcocolla succus est gummosus
aliquantisper resinosus minutis et veluti
friatis constans granis albicantibus

aut rubentibus spongiosis friabilibus micis lucentibus subinde mistis, sapori sub acris, amari, cum quadam dulcedine obscura ingrata, nauseam provocantis, sub dent. lentescit in aqueo humore dissolvitur, candelae admotae primum ebullit, postea in clarum flammam exardet, eligenda est rara spongiosa candida amara expersa et arabica affecta.
constat oleo copioso, inediderri salis acidi portione, sale alcali tum volatili tum fixo ubernimo unde compositum gummosum seu saponaceum at aliquantisper resinosum. hoffmannus inter num illius usus priorus refricit ceter: abstergit et consolidat
℞ sarcocoll. lacte nutricis ℥i tuthiae pp. ℥ß mucilag. sem. cydon in aq. rosar. extract ℥iii m. f. collyr. in oculor inflam.
℞ myrrh aloes et sarcocoll a q. s. m. f. pulvis pro consolidandis vulneribus

Caput 8

De Succis arte quâdam e plantis extractis.

Aloes præstantior seu soccotrina est succus inspissatus purissimus nitens pellucidus pinguis hyeme friabilis, aestate molliusculus in manibus lentescens ex purpureo rufescens pulveratus colore aureo nitens, aromaticam amaritudinem recipiens odore gravi nec tamen adeo ingrato myrrhæ proximo. ex insula Soccotora in coriis affertur.

Aloe minus praestans seu hepatica obscurior est minus splendens magis densa et arida jecinoris colorem referens odore graviore sapore intensius amaro. ex oriente et occident. ex mexicano regno, brasilia

Aloe fœtida vilior et caballina odore suo ingrato ac vehementi a cæteris distincta, licet cum vulgari cæteroquin sat bene conveniat, imo adeo lucida præparatur ut a soccotrina nisi odore tetro distingui possit.

aloes soccotrine ad usum intern. ab omnibus fere expetitur licet contra sentiunt non nulli qui hepaticam tum ad extern. tam ad intern. praestantiorem esse asserunt. Clariss. Simon Boldus multum discriminis inter diversas aloes species observavit quod quidem in aloe soccotrina lucida minus resinae seu sulphuris plus substiae gummosae seu salinae quam in hepatica contineri per suam hor: extractionem deprehendit. siquidem in aloes socco. ℥IIII affusa aq. bull. q. s. et igne arenae maceratis tota aloes substia dissoluta fuit verum solutione in loco frigido per aliquot horas reposita portio quaedam resinosa spissior et gravior vasis fundum petiit liquore aqueo supernatante. separatis liquoribus resinosum sedimentum solis radiis expositum et exsiccatum pendebat ℥VII gr XII. hanc resinosam substiam spiritu vini dissolvit remanente quadam quasi arenosâ et terreâ portione non dissoluta ponderis IX granor vini autem spiritu fluido calore exhalato resinosum extractum residuum et prorsus

208 inflammabile pendebat ℨVI gr XXIIII
liquor aqueus et gummosus balneo cinerum
exsiccatus reliquit extracti gummosi ℨII ℈I
Similiter aloes hepaticae ℨIIII solutis
resinosum sedimentum pendebat ℨII ex
quo ♁ exhausit ℈XI remanente salino
terreâ portione ad pondus ℨIIII gr XXXVI
quam salem ess. tartaro fere similem sus
picor. ex evaporatione extracti gum. ℨVI
unde concludere licet aloen socc. majore
partium volatilium, tum salinarum tum
sulphurearum copia donari quam hepaticam
resinosa portioni dimidio minorem quant
gum: sui tie fecre duplam. pres parum
terrae et sali fixi.
idem autor experientia compertum habuit
resinam seu sulphuream partem vi dejec
toria fere destitui, solam gummosam
purgare et quidem vehementius cum
a substia resinosâ separata fuit.
asserit soccot. vehementius purgare quam
hepaticam, ratione majori partium volatil
et acrium copia instructa a quibus
potissimum vis cathartica pendet.

insuper salina pars in hepatica arc
sinosis debite temperatur
nec ad usum caterinum socc. praestantior.
imo longe inferior hepaticâ quae majori
sulphureae et balsamicae ptium copiâ
donatur: nec non etiam expertus fuit
resinosam aloes substiam insigni balsa
mica virtute donari et in vulneribus
efficaciss. unde hepaticam socc.nae antepond
analysi chimicâ aloes cstat ex sulphure
crasso et copioso salis amoniaci portione
non mediocri, tartari modico cum
multa terra cjuncti. unde salino gumos
et resinosum.
fuit ab omni aevo comendatiss, purgandi
viscera roborandi venas aperiendi vulnera
et ulcera glutinandi et sanguinis profluvia
sistandi facultatem tribuerunt. unde proverbium
qui vult vivere annos noë sumat pilulas de aloe
non omnes tn sic sensere e contra ventri
culo jecori nocere vitam abbreviare. amarore
vellicat et acrimoniâ. adversiss. illis qui
sanguinem vomunt aut ex alvo aut utero.
inutilis naturis calidis et siccis extenuatis nec
puero nec praegnanti nec seni excrementis vacuo
conveniens ex galeno cardano scaliger et fernelio

hoffman dicit ejus usum suspectum esse
nisi ad sanguinem ciendum.
quotidina experientia. constat diuturnum
ejus usum haemorrhoidum fluxum promovere
menstrua mulierum profluvia excitare foetum
pellere, corpora excrementis vacua laedit
sicca et biliosa magis ac magis exsiccat
et in atrophiam inducit, viscera jam fervida
inflammat et in haemorragias inducit; vestra
autem quam sanguinem magis accendit, hecticis
phthisicis nocet, infestissima in morbis
acutis et inflammatoriis.
verum aloes usus assiduus et immoderatus
nocet moderatus ac legitimus prodest. prae
sertim magnatibus et opulentis crassos
viscidos humores incidit et resolvit
obstructiones aperit menses et haemorrhoidas
movet ciborum coctionem juvat et appetitum
excitat vermes necat convenit in morbis
a viscerum atonia et obstructione oriundis
cachecticis frigidis humidis quam corporibus
externe ad ulcera sordida abstergenda
et sananda.
℞ aloes. elect. pul. ℔ß succ. rosar. ad eminent
4^or digit. m. et in pultem redigatur. cribro setaceo

tecta solis radiis exponantur ad melli con
sist. inspiss. novus succus affund. et evaporetur
idq novies repetatur. tandem exsiccata massa
vesicâ excipiatur ad usum. est aloe rosatû
ex eô formentur pilulae quo minores sunt eo
eo efficaciores. eodem modo aloe violata.
℞ aloe rosat. et extract rhabar a ℥I mastich
℈I extract. gentian et absynth a ℥ß m
f. pilul ad alvum solvendum ventriculum
roborandum et coctionem juva. ℥I ante cibum
℞ aloes hepat. pul. jalap, a ℈ß trochisc
alhan gr II agari. trochisc gr X olei anis
gutt II syr. flor. persic q S. m. f. pilulae
purgantes cephalicae jejuno ventriculo
℞ aloes lucidae gr. XV gummi gutt gr II
agaric. alb. gr. VI syr. de rham. cath.
q. S. f. pilul. hydragog. cum olei cinna
gutt. I aromatisandae
℞ aloes hepat. scam a ℥II mastiches
succi glycyrr a ℈II syr rosar solut. q. S.
m. fiant pil. cum oleo caryophil aromat
isandae dosis ℈I vel ℥ß
℞ aloes lucidae ℥I myrrhae ℥ß croci gr
XV cum syr de absynt q S. m. f pil ad
alvum solvendum ventriculum robor. et menses
promovendos dosis ℥ß

℞ aloes socco, et gum am. a ℥VI croci martis aper ℥V extract. centaur min ℥IIII syr. de absynth q. s. m. f. massa pilul. aper in chlorosi et cachecticis affect. dosis ℥I mane et vesperi
℞ aloes soccot ℥ß vitriol. alb. gr V aqu. fœniculi euphrasiæ a ℥III; f. collyrium
aloe usta a quibusdam expetitur sedimentis est hæc præparatio quæ ejus substantiam destruit aloes in substantia exhibetur a ℈I ad ℈II sub forma boli raro sola prescribitur

Scammonium

alepense est succus concretus levis varius, fungosus, friabilis e cinereo nigricans et splendens, dum frangitur in pulverem albidum aut cinereum abiens cum digitis tractatur saporis amaricantis cum quadam acrimonia et odoris virulenti ex alepo affertur.

Smyrneum nigrum est, magis non derosum et densum. alepense smyrneo utique eligatur tenerum fractu et pulverulentum nitens linguam parum vehementer urens mad. cum lactescit et albescit. rejicitur nigrum ponderosum arenulis aut alii heterogeneis refertum.

tota ejus substantia aqueis menstruis sol
vitur sed lacteo colore tingitur solutio
ob resinosas partes salibus et aqueis intermixtas
convolvulus syriacus hunc succum profert
est purgans violentissimum ad humores
biliosos pituitosos educendos, in corporibus
frigidis et serosis in febrib. intermittent.
magis autem in robustis et aetate consistente
duplici ratione catharsim moliri mihi
videtur tum fixis partibus acrioribus ventri
culi et intestinor. mbranas irritando et
ad contractionem sollicitando, tum etiam
volatilibus oleosis particulis acribus nervos
convellendo, caeterum massam sanguineam
et lympham non aeque solvit sicut manna
jalapium et caetera hydragoga.
verum cum omnia purgantia corpori
sint infensa scamonium ut inter valen
tiora validissimum sic inter infensa infensiss.
praeterea est maxime infidum et incertum
scam. elect. a gr II vel III ad XII ad
summum exhibendum et rarissime nec
absque sollicitudine de operatione quae semper incerta est.
quod in ventriculi et intest. parietes muco

 fæculento uberrimo et tenaci obducunt- tunc scamonium hoc muco involutum irritum per intestina permeat.
cum e contra nullo fere muco ~~involut~~ membranæ illinuntur scamo. vel in rugis ventri. et intest. cellulis inhærens ob resinosas suas ptes mbranas fibras irritat convellit inflamat et exulcerat unde etiam ab exiguâ dosi superpurgaões tenesmi et dysenteriæ. in aqueis liquorib solutum tuto propinari nequit qd resinosa pars paulatim grumescit et subsidet
scam. quocunq modo paratum diacrydium dicitur;
sulphuratum diacrydium basis est pulveris de tribus vel pulvis cornachini ab eius præcone Marco cornachino vel pulvis comitis varvicensis cponitr ex scamonio sulphurato antim. diaphor et crem tartari a. præscribitr a gr VI ad IX pro lactentibus ad ℈I vel ʒß pro adultis eædem cautiones quæ in scamonii et cæteror. purgant. requiruntr
Dhequet dicit nullum esse medicam quod in medente plus consilii in ægro plus oportunit. et in utroq plus requirat ordinationis et apparatus.

apud veteres usurpebatur exterius in linim. et unguen. ad scabiem, affect. capitis frigid. et humores duros scirrhosos et ischiadicos dolores solvendos et lana subditum ad menses movendos

℞ scam. elect. pul. gr VIII vitelli ovi ʒII terantur paululum in mortario marm. cum pistill. ligneo donec scam. solutum appareat add. syr. capil. ven. ℥ m. ssim affunde decoct. hordei ℥VI aq. flor. aurant. gutt. aliquot f. potio par. jaus palato grata

℞ scam elect pul. gr XV amygd. dulc. excort. ʒIII tundantur et terantur in pultem tenu. aff. decoct hord ℥XII f. col. cum expres. diss. syr. viola. vel capil. ven. ℥Iß aq. cinn. vel tinct. ʒß f. emulsio purg. pro duab. dosib.

℞ diagryd glycirisat. pul. gr. VI sacch. alb ℥I tartar solub ʒII terant. et misce his aff. aq. comm. ℔I expres. malor. citr. ducor. succ. et aq. naph gutt X f. limonata catharticum per cyathos propinandum.

℞ scam. pul ʒV sp. vin ℔I digeu. per 3 dies f. col. per chartam bibul. distil. ad dimidium adhuc calenti add sacch albiss ℔ß f syr.

216 olei cinnam. guttis aliquot aromatisandur
dosis a ʒß ad ʒI in quovis liquore eveniate
℞ scam. ℈IIII cinnam. ʒII caryoph.
ʒß sp. vin. rect. ℔I diger. sub sole
per q dies identidem agitando. liquor
limpidus ss.im affunditur. huic add.
syr. cydon. ℔I misceantur et mixtura
servetur ad usum dosis a ʒß ad ʒIII
℞ diacyd. glycirrh. gr VI rhabarb. pulv.
℈I. mixe cidon q.s. m. f. bolus
℞ ... gr VI pulv. jalap
gr XV aquil. alb. gr X. medul. cass.
recens extract. ʒII f. bol.
℞ sem. pulv. rhei et crem. tartar. a
gr XV diacyd. gr III conser. ros. f. bol
℞ dyacr. sulphur. diaphor. min. a ʒß
croc. mar. ap. cinnam. a ʒII gum. amm.
ʒI syr. de absint. q.s. m. pil. a gr VI ad
℈I in cachexia et obstructionib.
℞ dyacr. cydoniat. ʒI aloes lucid. ʒIII tro
chisc. alhand. ʒII mastich. macis a ʒI croci
ʒß syr. flor. persic. q.s. m. f. pil. gr X ad ʒI
℞ diacr. cydon. aquil. alb. a ℈I. calyb. et fla
mar. et gentia a ʒI f. pil. dosis a ʒß
ad ℈II

cambodium
Gummi gutta succus est ārctis resinosus et gummosus inflamabili siccus densus durus nitidus opacus ex croceo flavescens in massas vel in baculos cylindraceos spachu odoris nullius saporis fere expers, in spirit vin et in aqua dissolvitr quam lacteam efficit vel flavescentem. ex china et amerika nomen ab arthritide vulgo goutte quam sanaveri veteribus ignotus nec nisi paucis abhinc annis notus et usitatus multo magis apud pictores.

probatur purus coloris fulvi qui ad ignem exardet et salivam vel aquam flavo inficit

hic succus est c cretum salino sulphureum seu resinosum et gummosum c stante ex sulphure tenui sulphure crasso et sale tartareo aliquantisper ammoniacali qui purgandi ejus virtus pendet a sulphure tenui cum salib. vol. certa proportione tperata quatenus ptor salino sulphu. succo stomachali evolutae et a crassiorib ppiis segregatae mbranas vellicant unde nauseas vomitiones et alvi dejectiones

aquea ejus solutio cum syr. violaceo vir cem suscipit. non ab alkalino sale sed ab intermistione flavescentium et ceruleorum colorum qd pictores quotidie experiuntr.

218 inter valentiora purgantia recenset.
non diu moram in corpore trahens et
absque molestia et torminibus. hinc ejus
usus in hydrope cachexia tussi dispnoea
asthmate, ictero, catarrho, arthritide, scabie
succos viscidos et tenaces in quâ cunq corpori
parte stagnantes et adhaerentes potentissime
dissolvit eos q qui in ventriculo sunt per
vomitum caeteros vero per inferiora pro
pellat dosis a gr II ad VII ad summum
gr XV. ad gr. IV absq. vomitu.
a gr IV ad X per superiora et inferiora
blande copiose et absque violentia purgat
nec eâ dosi correctione eget modo li
quore copioso diluatur et extendatur
si sub forma boli exhibeatur facilius
vomitum excitat, rarius vero cum mer
curio dulci conjunctum.
iisdem nocumentis obnoxium atque
validiora purgantia, iisdem cautionibus
♃ gum. gut gr. VII diss. in decoct. hordei
℥ XII add. syr. violar ℥ II f. potio viridis
in duas doses in anasarca et serosa colluvie
♃ gum. gut gr VI aq. com ℥ VI succum
ex malo citrio expr. sacch albiss. ℥ß m f
s.a. ad limonatum hydragogum

℞ mann. calab. ℥iß diss. in aq. bull
℥VI f. col. in qua diss. gum-gutt gr
IV add. aq. cinnam. ℥ß f. pot. hydrag
℞ gum. gutt gr VI mann. calab ℥iß
diss. in aq endiviæ ℥VI add. sp. ~~vin~~.
vitrioli gutt III sp. citri ℥ß f. potio
℞ gum. gutt gr IIII aq. menth et flor
auran. a ℥III sacch. alb. ℥ß f. haustu
hydrag.
℞ gum. gutt gr VIII aquil. alb. gr X
conser rosar q. s. m. f. bol in scabie
et affecti cutaneis
℞ gutt. gum. gr VI elæosacch. cinn
ʒII m. f. pulvis purgans
℞ gut gum. gr X. olei junip gutt II
mithridatii q. s. m. f. pil hydrago
℞ pulv. jalap gr XII cambogii gr IV
crem. tarta. ℥ß syr de rham cath. q. s.
f bol hydrag.

Opium succus est concretus resinosus
simul et gummosus ponderosus, densus
tenatus inflammabilis ex fulvo nigricans
odoris virosi soporiferi saporis amari acris
in placentas compactus subrotundas compressas
uncium circiter crassas semilibram vel libram
pondérantes papaveris foliis involutas
ex natolia ægipto et india.

 probatum sincerum mollius uelum inflam-
mabile colore fusco aut nigricante odore
vehemente et viroso stupefaciente
ex analysi liquet papaveris partes constare
ex sale tartareo et ammoniacali simul
junctis, et oleo admodum crasso: minus
autem terrae esse in capitibus quam in
foliis et caulibus.
in opio plus inest salis volatilis urinosi
quam in foliis et capitibus. verum etiam
acidus sal et quidem potens reperitur.
ex sale acido, et alcali et oleo conjunctis
exurgit gummosum et resinosum quod igne
inflammabile est cujus maxima pars aqua
solvitur et portio mediocris spiritu vini
Sulphur crassum quod in opio deprehenditur
admodum rarescibile est et ab hoc sulphure
condensato et summae raritati capaci
ejus virtutes
externe tumores incidit resolvit et discutit
emollit relaxat maturat et suppurationem pro
movet. diu cuti admodum illum mitis
madat; pruritum in ea excitat eandem
nonnunquam exulcerat et vesiculas attollit
perineo applicatum ad venerem quoque pronitatem
nonnunquam extinguit harum partium sensus
stupefaciendo.

externe sæpe soporem induit et dolores sedat licet hi affectus admodum incerti capitis saturis nonnunquam interimit. nervos relaxat stuporem et paralysim inducit.

intus justa dosi a gr ½ ad III.
debita dosi quandam circa præcordia gratam sensationem excitat, animum ad hilaritatem promovet, sicut ex modica vini potatione, curas et mœstitiam removet sæpe animum ad sua munia obeunda alacriorem ac vegetiorem reddit, unde audacia sui fiducia, fortitudo. magnanimitas et periculorum contemptus. eam ob rem turcæ ampla ejus dosi sese ad prælium accingunt
sanguinis et spirituum motus efferos compescit dolores demulcet, corpus laboribus gravatum sublevat, hæmorrhagias ab æstuante sanguine oriundas sistit coeteras evacuationes saltem per horas cohibet excitatis sudoribus et insensibili transpiratione. late enim promovet arteriarum pulsum magnum elatum et tardum efficit oris siccitatem affert

 in cute levem pruritum et ruborem excitat; semen auget et venereum appetitum excitat et stimulat praesertim si larga dosi hauriatur.. majorem effectum sortitur in calida et humida tempestate et in corporibus largioris texturae ut in mulieribus et infantibus.
soporem saepius inducit sed non semper. somnia grata et jucunda ut plurimum provocat, vomitum et singultum sedat quandoque excitat sicut et spasmos et ~~[illegible]~~ convulsivos motus; tardiorem efficit in ventriculo coctionem; lac nutricum auget mamarum intumescentiam, penis erectionem somnia venerea et in somno seminis emissionem.
sunt alii effectus minus frequentes fugaces paralyses, vesicae maxillae inferioris relaxatio suffocationes, vomitus syncopes quandoque mors in corporibus summe plethoricis aut summe debilitatis et jam a longo tempore attenuatis. unde illius usus post enormes haemorragias aut evacuationes, metuendus
cessante narcotici operatione ut plurimum regressus affectionum et dolorum quae sedaverat, et saepe graviorum quam antea

nisi sudoris beneficio aut alio modo deleta fuerit, mictio frequens, nonnunquam alvi solutio tristitia et spirituum defectus pulsus languidus ac depressus, cutis pruritus immoderatus spiritus usus provocat partium omnium relaxationem et debilitatem animum hebetem ut in ebriosis.
spirium sanguineum laticem mirum in modum dissolvit expandit et rariorem efficit inde tot phaenomena. observarunt cruorem ex turcarum et indorum in praeliis occisorum in cadaveribus post unum aut alterum diem aeque fluidum dimanare ac si novissime fuissent exsecati.
sanguine sic expanso arteriae per totum corpus distenduntur et pro diversis visceribus in quibus haec subita fit sanguinis rarefactio scenae diversae affectus varii apparent statim atque sanguis per arterias cerebri permeans rarescit arteriolae distensae et majus spatium occupantes nerveos canales intertextos comprimunt plus minus pro majori vel minori sua dilatatione nervos compressos nimis, minor succi nervosi e glandulis effusi copia subit

 et ad p̄tes pervenit, unde c̄poris functiones minus belle se habent, arteriæ tardius vibrant, licet a rarefacto s̄guine plus solito distendantr, unde pulsus magnus elatus sed minus frequens. calor præternaturalis per totum c̄pus accenditur ex eo qd d̄minuto s̄guini motu circulari et aucta fluiditate, motus ejus intestinus seu fermentativus augeatur a quo calor pendet.
ab imminuto succi nervosi ad p̄tes affluxu et ejusdem refluxu a p̄tibus ad cerebrum artuum torpor, motûs et sensus d̄minutio somnus quoq̄ excitatr secundum nervorum ab arteriis p̄pinquorum c̄pressionem, mors denīq̄ si cerebri major pars adeo arctatur ut illas succus nervosus permeare nequeat, dolores sedantr qd succi nervosi ad p̄nium usq̄ influxum impediatr.
defectu succi nervosi secretiones et excretiones imminuuntr aut deficiunt et arteriis nimis distensis excretoria vasa nimis c̄primuntr. perspiratio remanet libera qd per vasorum poros membranæ extensione exitum sibi quaerit. et qdoq̄ sudor qd sudoris meatus in extimis vasis arteriis non c̄primuntr

re vera quaedam evacuationes suppressae non nunquam restituuntur at opio si illa suppressio oriatur a vehementiori nervorum irritatione

qui per longum tempus opiatis utunt saepe experiuntur eandem dosin inutilem ad somnum. illud evenit ex eo qd ex primis dosibus assumptis sanguis certum quemdam fluiditatis gradum adipiscat. quem eadem dosis augere nequet. superfluis enim sanguinis recrementis per sudores vel transpir. exhalatis sanguinea moles imminuta non amplius arterias ideo distendit ut nervos comprimere valeat.

opium salibus tum acido tum alcalinosi noso et sulphure crasso condensato sed summae divisibilitatis et expansionis capace componit. verum non tam a salibus quam a sulphure vim soporiferam pendere existimo. observamus corpora simili sulphure turgida ut crocus nux moschata castoreum &c. in soporem inducere.

opium in ventriculo solutum fermentationem suscipit, et femtosae semi expansa sulphurea ad sanguinem perducta motum fermentativum servant

226 sic totam massam dissolvunt et rarefaciunt
assumpto opio non ingratus caloris sensus
in ventriculo percipitur ex blanda titillatione
partium salino oleosarum sed somnus
non invadit nisi post semi horam aut unam
usque dum ad sanguinem deferatur.
si majori quam par est dosi partes in
ventriculo diutius retineantur tunc ab
incommoda ventriculi titillatione nausea
singultus et etiam vomitio.
opio nimia dosi sumpto medetur 1° venae
sectione et emetico indicantur sed cavendum
ut vires adhuc constent alias pejus
fortasse foret malo remedium.
deinde potionibus acidis, ex succis citri
mali aurantii, granorum ribesiorum
aceto spiritu vitrioli aut sulphuris
sulphureorum enim expansioni obstant
illorum vim coercent et rariorem
sanguinem cogunt. Clysteres acriores
injiciuntur pyrethri aut euphorbii
pulvisculus naribus insufflatur salia
volatilia intus sumuntur, vesicatoria
sinapismi et epispastica indunta plantis
pedum aut imae cervici imposita item

cucurbitulae scarificationes ustiones punctiones et frictiones dolorificae feliciter adhibentur. his nervos concutiuntur et stimulantur fibrium tonus restituitur.

cum nihil in opio veneni recondatur praeter vim somniferam, non correctione opus est sola purgatio a sordibus terrâ arênâ

cum duae sint in opio substiae gumosa una, altera resinosa, aquâ gumosa remanente resinosa quae spiritu vini extrahitur vino, aceto vel aqua vitae auctae dissolvunt

ejus tinctura cum spiritu vini vi narcotica intensiori donatur, caput vehementius afficit saepe delirium inducit.

tinctura cum aceto urinas nonnunquam supprimit

tinctura cum salibus alcalinis ad somnum conciliandum parum utili sales acrimoniâ sua mbranas nervosas sollicitando soporem discutiunt. cum salibus urinosis volatilib.. sudores movet et quibusdam affectibus convenit

opium vero cum aquâ paratum omnium tutissimum et efficacissimum sic sua resina nonnullis medicis reformidanda spoliatur

 opii purgatio cum aqua
℞ opii. min. sect q. ℓ diss. in aq. still. q. s.
digerend in AB. a massa superstite separetur:
refrigerata per chartam bibul. col. nova aqua
residu aff. dige. sic q donec nulla extra
hatur tinctura. solutiones ifusae evaporent
MB ad extracti solidi cisistum dosi a ¼ gr
ad gr I aut II cum opium liquidum
desideratur gr. I in aq convei q ℓ dissolvitur
haec c. tinctura brevi mucorem contrahere
quapropter si servandum est paratur cum
vino vel aqua vitae. laudan. liquid sydenhami
℞ opii in taleol sect ℥II croci minutim
ccisi ℥ cinnam. caryoph. contus. a ℥I
vin. hispan ℥XVI digerantur simul
in MB. per dies duos vel 3 fiat colatura
servetur ad usum. gutt anodinae Talbot
℞ opii lamellatim sect. ℥iß corticis sassaf.
℥ß rad. azar ℥ß aq. vitae ℔ i digerantur
sub radiis solaribus in vase clauso per 9 dies
colatur servetur dos a gutt IIII ad XX
extractum opii cum aqua aliis praestat
cum spiritu vini praeparatum rejiciuntur
necnon cum acidis et salibus
nunquam in ventriculum cibis repletum

ingeratur, quapropter 4.or hor. a pastu
si solidi fuerint cibi et saltem 2 hor. post
jusculum, nec juscula sunt propinanda nisi
urgente necessitate et 3bus hor. post narcoti
Non exhibendum dum fluunt menstrua
puerperarum purgamenta et criticae eva
cuationes ne spirituum defectu in somnum
sempiternum inducant. aut paralysi affici
magna cum cautela debilib constitution
infantib mulierib et senib
illius usus identidem intermittat ne
assiduo usu irritum aut noxium evadat
tres sunt exhibendi indicaoes vigiliae
nimiae dolores acerbi, enormes vomitiones
et dejectiones. in spirituum animalium ataxiis
spasmodicis affect. et passionib hystericis
plurimum juvat, ad suppressa puerperae
purgamenta una saltem vice tentandum
ex sydenhamo.
soporifer ille succus fallacibus induciis aegro
et medico imponere solet et aliena sym
ptomata suscitat naturae conamina ad
crysim infirmat, quandoqdm morbus est
saepe naturae conatus ad peccantem causam
superandam et dolor est illius conaminis ratio

230* quo stimulo saepius a b humore pecc caute natura se liberat. qd opium inhibet.
In intestina clysteribus eosdem prod. effectus ac per os imo saepe majores et graviora saepe inducit symptomata.
quare vero in clysteribus dissolut. sed potius infusa vel decocta ex papaveris albi capitibus nec nisi cum summa cautela.
Externe ~~exterminatae~~ est virtutis galenus monet opiata auribus et oculis admota noxia esse visus enim hebetudinem et auris gravitatem inducit. in vulnera quoq saepius gangraenam inferunt.
Papaveris albi capita fere sola in usum semina vero somnifera non sunt sed oleosa et nutrientia. ex iis olim panem efficiebant papav. tam albi tam nigri quapropter in emulsionib ad humor. acrimoniam demulcendam papa. albi semen usurpat.
℞ papaver alb caput I minut cuitum rejecto sem. coq. in aq. fontis ℥ x ii ad medias f. col. capiat aeger hora somni

℞ capit. papav. alb. № ii ℥ incisa coq. in aq. limp. ℔ i ad 3.am partis dim. in col. ssim contunde sem. papa. alb. et sem melon a ʒß f. expr. in qua diss. syr nenuph ℥ i divid emul. in 2as doses per noctem 4or hor. interval
℞ 4or sem. frig. maj ʒß contu. in decoct hord et rad. alth. ℥ vi f. col. in qua diss. dia cod. ℥ß f. emul. hora somni longe a pastu.
℞ diacodii ʒ x aq. still. papa. errat. portu a ℥ iiii aq. flor. aurant. ℥ß f. potio in 2as dos. una hora somni. altera post si som non superveniat
℞ extrac. opii gr i ocul. caner. pp. ʒß terantur in mort. marm. m. div in 6 partes sexta quaq. hora ad tussim vehementem.
℞ laudan. opiat gr ß extract. croc gr i syr de althaea ʒß diss. in infus. flor papav rhoead ℥ vi f. potio hora somni exhi ad tussim sedandam et somnum conciliand.
℞ laudan opiat gr i coral. rubr. terr japon. a ʒß terantur et accurate misc tum add. pulv cinnam. et nucis mosch pulver a ℈ extrac junip ʒ i syr de absynth q. s. m. f. op. in 4or doses per vices in alvi pro fluviis cum torminibus aut super purgationibus,

 ℞ castorei gr V opiat laud. gr I vel lauda. liquid sydenh. gutt. XII dissol. in aq. flor. aurant, atq arthemis a ℥iii solutioni add. syr. de arthemi ℥I fi potio Echlectim exhibenda ad affectus hystericos compescendos

Acacia vera est succus inspissatus gummosus fuscus extus aut nigricans intus rufescens seu subfulvus cnsistentia fri inioris durae, in ore lentescens saporis austeri astringentis non ingrati in massulas subrotundas 4-6 vel 8 unciarum pondere et tenuiorib vesicis involutus cpactus

probatur: recens purus nitidus qui in aqua facile dissolvitr, nigerrimus et siccissimus vesiculis. ex aegipto per massiliam

constat ex mediocri salis acidi portione paululum salis alcali. terra astringente copiosa et oleo tum tenui tum spisso plu rimo. ex quib cpositum salsum alumi nosum inacagrosum.

inter incrassantia, astringentia et repercutientia medicamenta numeratur, ventriculum firmat vomitum sedat haemorragias quascunq sistit sguinem inspissando humorum acrimoniam demuliendo ad ℥I

ab alpino. ad podagricos dolores in
forte commendatur. sed astringendo repercutit
℞ acaciæ veræ ℥ß conserv. rosar. rubra
℥i corall. rubr. ℈ß syr de symph q.s.
m. f. bolus in cruenta expuitione.
℞ acaciæ ægyptiacæ ℥i diss. in succ plantag
et hederæ terrestr a ℥iii add syr. rosar sicc
℥i m. f. potio cochleatim exhib in hæmor
Acacia nostras seu germanica
est succus inspissatus ex arbore dicta prunus
sylvestris pruneliér
folia cortex et fructus immaturi refrigerant
exsiccant et astringunt. flores et fructus
maturi alvum laxant.
majori aciditate donatur quam acacia
vera quapropter magis refrigerans et
astringens; multo minus olei continet ideo
non tam demulcet.
ad vomitus hæmorr et alvi profluvia ad ℥i
℞ acaciæ nostratis ℥i sal prunell ℥ß
mellis rosati ℥i aquar. stillat. rosar. et
plantag. a ℥iii m. f. gargarisma in angina
incipiente

hyppocistis succus est exsiccatus
niger nitens saporis austeri, ex gallo
provincia eligitur purus nitidus niger
non adustus
ex iisdem fere constat principiis ac acacia
et iisdem virtutibus donatur. potenter
astringit et ad omnes fluxionum affectus
intus a ʒß ad ʒi. in gargarismatibus [illegible]
reperentur sicut acacia
℞ hypocis ʒii syrup de symphyto
et berberis a ℥i mucag gum. tragacant
ʒi aquae plantag. portul a ℥ʃ. looch
in haemoptoe
℞ hypocis ʒi corall. rubr. terr. sigill
lapid. haemati ppator a ℈i syr haed
terrest ℥i aq. plantag et portul a ℥iii
m. f. cochleat. exhibenda.
℞ hypocis, acaciae nost a ʒi conserv
rosar. cynorrhod a ℥ii syr berber.
q. s. f. opiat. in 4or doses quaque
hor. ad ventricul. robor. diarrhoe sisten
observatis observandis
Catechu et lycio veterum
improprie terra japonica vulgo cachou
succus gummosus resinosus induratus

extus c ruffo nigricans intus e rubro fuscus
saporis astring. sub amari post modum
dulcioris et grati, odoris expers.
ex malabar et india.
modice astringit pituitam acrem de-
mulcet ventriculum roborat menses
immoderatos sistit. De teme cachu
dosi nimia nihil timendum. frustula
enim in ore assidue detineri possunt
fragmenta in os ingerunt anisi magni
tudine deglutitur a ℈ß ad ʒß.
℞ catechu ℥I sacch ℥I exacte pulve
misceantur et excipiantur mucagine tra
gacanthi cum olei cinnam gutt I velis
formentur pastilli sublinguales in tussi
catharrali et dd a vomeis
℞ catechu ʒß mica mosch. corall rubr pp
a ℥I. syr cydon. q. s. m. f. opiat dos. ʒI
ter die exhib in hypercatharsi diarrhoea
et dysenteria
℞ terr. catech ʒI haematit pp ʒß diacod
ʒß syr e rosis sicc ʒI aq. porthul et plan
tanas a ℥III m. f. julap in haemopt
et haemorrhag
℞ catech pul ʒIII mucil. gum. tragacant
syr de symphy a ℥I aq. plant. ℥III m. f. looch
adversus haemopthien et tussim catharralem

num catechu idem sit cum lycio in
dico. dubium est: lycium autem in
officinis non amplius reperitur

Succus glycyrrhizæ succus
est extractus et inspissatus in massulas
℥IIII ℥VII foliis laurinis involutas
compactus niger siccus fragilis intus
dum frangitur splendens in ore deliquescens
cum quadam acredine ex hispania et
hollandia.
ad eadem valet ac glycyrrhiza
℞ succ. glyc. hispan ℥II sacch alb ℥IIII
opii ʒß mucil. gum. tragac q.s. in f. trochi
sublinguales ad tussim vehem. et cathar
discutiendum.
℞ succ. glycy ℥I croc. minut. sect ℈I vin
canarin ℔II diger. frigid per 9 dies. detur
huius tinctur cochl. I aut II sæpius die
ad pituitam viscid. et expectorationem.
℞ aq. font ℔II aq. cal ℔I croc. minut.
concis ʒß succ. gly. hisp. in tenuer lamell
redact ℥I mell. narbon ℥II diger calide
in vase clauso per 24 hor f. col. exhib.
calida ad ℥IIII tertia vel 4.ta quaq. hora
in tuss. vehem. in cathar et asthmate
ad pituitam acrem demulcendam crassam
incidendam et expectorationem promovendam

Saccharum est sal ess. pinguis oleaginosus rufus aut cinereus si non dum purgatus fuerit, mellis instar pinguis in longum filum ductili, sapore dulci grato odore fere nullo. ex arundine sacchariferа extractus.

cassonatum est saccharum in micas fractum candidum non nihil pingue odoris aliquantisper mellei non ingrati ad violas accedi. praestat candidum siccum odoratum

saccharum candum vel cantum est durum pellucidum angulorum aliud crystallo simile alterum subrufum ex cassonato factum

rufescens vel fuscum sucre rouge non nihil pinguescens ex residuis cassonati confectum, ejus usus in clysteribus

saccharum est sal ess. constans ex acido sale oleo et terrâ, cum optime purgatum crescit in crystallos prismaticas ex octo superficiebus planis constantes quarum duae bases oppositae aequales sunt et parallelae caeterae sunt parallelogramata nullas aut acidi aut alcali notas praebet

flammam concipit et luculenter ardet
aqua et urina facile solvitur neque spiri
tuosis et oleosis
ex saccharo rite fermentato vinosus liquor
obtinetur si sacch. lb i in aq. 6. vel 8 lib.
et recentis fermenti cerevisiarii cochlear
unum misc. lento igne in vaso clauso
non omnino repleto paucis horis fermen
tescere incipiet magna cum vehementia
post 3^{m} vel 4^{m} septim. liquorem vinosum
praebet hydromeli non absimilem. ex
eo distillato fort. spir. ardens extrahitur
si diutius calori exponatur in fortissimum
acetum mutabitur.
veteres mundum melle condire solebant
ciborum coctionem promovet si post
largius assumptum cibum frustulum ejus
in fine comedat.
ad pectoris et pulmonum vitia ad phthi
sis acrimoniam demulciendam, potus
saccharati pulmonum ulcera abstergunt
urinas pellunt ventrem solvunt et in
pleuritide et peripneumonia salutares.
si autem solum et majori copia sacchar
sumat nocet, praesertim cholericis

fermentescit enim vehementius in ventriculo et intestinis, flatus excitat bilem q fermentatione attenuando flui-diorem efficit: unde saccharum et dulcia bilem producere dicuntur. salinis sacchari spiculis onusta bilis acrior evadit. infantibus vermes ingenerat. dentibus inimicissimum affert enim nigredinem et rubiginem eosq tremulos efficit quare post ejus usum os et dentes aqua diligenter colluenda
tamen De beaufort anglus febre obiit septuagenarius qui per annos 40 saccha-ri et amplius singulis diebus comedere so-lebat hujus aperto cadavere viscera sana et illaesa reperta fuere, dentes integri et firmi. alter D. malors, 100 annos vixit saccharo et melle omnes cibos condire solebat.
forestus riverius montanus valeriola multos saccharo rosaceo phthisicos multos cu-ratos vidisse referunt
externe egregium vulnerarium putredini resistit praecipue si cum tantillo vitae aquae diluatur. turcae solent vulnera recentia abstergere vino et post inspergere saccharum pulveratum. et sic non incommode se curant

saccharum cantum in oculis insufflatum corneæ albuginem dissolvit. idem praestat in aqua euphrasiæ chelidoniæ au feni culi dissolutum. ejusdem ulcera detergit capitis defluxiones si carbonibus imponat offactu et suffitu arcet.

saccharum aquâ vitæ vel spiritu vini non rectificati solutum a quibdam oleum sacchari dictus ad expectorationem pro movendam commendatum, externe quoq utile prædicatur ad vulnera glutinanda ulcera mundanda et detergenda et putredinem arcendam.

Tartarum est substia salina, in durata saporis austeri sub acidi quæ fundo et lateribus vasorum vinariorum accrescit et ex quib abraditur. duplex est alba et rubra. albus tartarus ex doliis quibus vinum album diu asservatum fuit ex germania rubro purior minusq terrestris ruber ex gallo provincia et Italia eligendus albus ponderosus durus apicibus cristallorum istar acuminatus qui conspectus non apparet instar spongiæ porosus ult terra repertus sed densus solidus splendens.

faex vini est ipse tartarus seu sal ess. vini continuata hujus liquidi fermentatione attenuatus et humore spirituoso solutus ita ut major quantitas spiritus vini ex faecib quam ex ipso vino per distill. extrahatur tartarus vero plus terrae minus vero ptium spirituosarum.
raro tartarus ad usum intern. nisi purificatus tunc dicitur cremor vel crystallus tartari qui minorem terrae portionem ... bilis oestum ac fervorem reprimunt, sitim in febrib ardentib minuunt, appetitum restituunt, mucidos ac tenaces humores attenuant resolvunt et blandissime educunt, obstructiones viscerum reserant in cachecticis et hypochondriacis affectionib. cum debilioribus laxantib stimuli loco et felicissimo cum successu admiscentur
Angelus sala de se ipso narrat; tartari pulverati ℥vi ex quo purgatus fuit a cruciatib coliae solutus multis aliis medicamentis frustra tentatis.
cremor tartari intus a ʒß ad ʒii si aperiendi tantum sit animus vel stimulandi cum aliis purgantib. solus a ʒß ad ʒi purgat

in aqua frigida non dissolvitur ac proinde
in fusculis aut potionib calentib praescribendum
aut in opiatis sub forma boli
cum chalybeatis optime consociatur et
ad obstructiones resolvendas maxime pluri
mum juvat. quapropter in opiatis cachecticis
℞ cremor tartari ℥II diacrid gr III m
fiat pulvis purgans in cachecticis affectionib
℞ crystal tart. folior. senn a ℥II cinnam
ʒIII caryoph ʒß m f. pulvis ad alvum
blande subducendam et obstructiones resol
vendas dosis a ʒß ad ʒII
℞ rubiginis martis rore majali ppt gr XV
cremor tartar ℈I croci gr III cinnam
℈I m f. pulvis in chlorosi et cachexia
bis die exhibendus.
℞ cortic peruv ℥I crem. tartar ʒß
pulver jalap ʒß syr. de absynth q.s.
m f. elect. cujus dosis ʒI vel ʒIß ter
quater re die exhib in febr. intermi. cache
cticis cum oedemate aut leucophlegmatia
℞ crem. tart ʒV rosar. rubr. siccat. pul
ʒI sp. vitriol gutt aliquot f. pulvis dos ʒß
bis in die in febr interm ad biliosos humores
in ventriculo et salivam infestantes temperandos

spiritus tartari diureticus est et diaphoreticus in obstructionibus reserandis dosis a ℈1 ad ʒ1

oleum empyreumaticum intus sudores movet extus humores potenter resolvit, rhumatismo et paralysi medetur in cutaneis affectionibus commendatur

sal tartari fixus est alcali acre causticum valentissimum interne rarioris est usus licet diureticus dici. chymici operationibus inservit ad resin et sulph. tincturas extra cum purgantibus nonnunquam miscetur tum ad eorum partes sulphureas juvandas crassos humores attenuando tum ad sulphureas explicandas ejus dosis a gr XII ad ʒß magna aquae copia solvi debet ne oesophagi et ventriculi membranas acredine sua laedat

Tartarus solubilis, sal vegetabilis officin

℞ cristal. tart. ʒ VIII salis tart ʒ IIII simul mixtis aff. aq. bull. ℔ IIII bulliant per semihor. solutio col. et ad pelliculum usque evaporetur in loco frigido reponatur ad cryst iterum evap et cryst. donec liquor pinguis et oleosus non amplius crescat

aperit laxat. purgantium vim auget a ℈1 ad ʒ1 ad ʒ VI vel etiam ʒ1 sine molestia purgat in juscullo vel in apozemati aperienti ℔ II

214. tartarus vitriolatus. solvunt vitriolum in aq. f. q. huic affundunt oleum tartari per deliquium turbidus fit liquor ...... metalli eorum praecipitatione, cum olei tartari affusione liquor non amplius fit turbidus, colat et ad solem exsiccat. iisdem virtutibus et eadem dosi ac sal vegetabilis;

Caput 9m

De tuberibus fungis et adnatis quibusdam vegetabilibus

Tubera cervina et boleti cervini tuberum genus est magnitudine juglandis interdum avellanae et minore subrotundum tuberosum et inaequale, substantiae callosae inter duritiem et mollitiem; atro purpureo cortice tectum coriaceo ex cinereo ad fulvum inclinante, in superficie granulatum cujus medithullium fungosa quaedam substantia ex albido purpurascens occupat. saporis et odoris dum recens gravi muriatici spermatici dum siccum fere nullius sub terra nascitur absq radicibus ...... in germania et hungaria

iis aphrodisiacam virtutem tribuunt tamen nihil aliud olli ascribi potest quam quod ad modum omnium fungorum, crassum succum gignant flatus excitant paullum inflant hac ratione membrorum genitalium erectionem promovent.

Fungus sambucinus sive auricula judae, est substantia fungosa nascens ex imo trunco sambuci veteris, spongiosa coriacea membranacea sinuosa et implicata auriculae instar subtus incana et cinerea supra nigricans inodora saporis terrei et fatui, brevissimo vel potius nullo pediculo nititur, sed caudici arboris inhaeret aut singularis aut geminus vis astringendi et exsiccandi illi tribuitur interne raro sumitur. infusus in vino vel in aqua evenientem fortiter alvum laxat et hydropicorum aquas miro modo pellit. ophtalmiae et fucum in flam

℞ fungi sambuci q. v. ~~spe[illegible]~~ rancao inf. in aq. still. flor sambuc. q. s. macerentur per noctem et aqua separata servetur ad inflamationes oculorum sistendas.

2176. ℞ furf. samb ℥ii hord. mund. glycy ℨß flor. malv. arboresc. pugill ii. coq in aq. plantag. ℥xviii ad 3ᵃ partis dem f. col. in qua diss. sal. prunell ℨi mell rosat ℥ii f. gargar. ad fauceum inflamm

Agaricum est substantia fungosa subrotunda angulosa inaequalis pugni vel capitis magnitudine levissima candoris nivei in farinam digitorum attritu friabilis paucis fibris intertexta cortice qui removeri solet calloso cinereo, sub rufo circum tecta. saporis primum subdulcis mox amari, acris et nauseosi cum levi quadam astrictione. in laricibus truncis adnascitur. rejicitur ponderosum nigricans minus friabile. in Westphalia et alibi ex quercuum aliarumve arborum truncis adnascitur substantia callosa lignosa quae in Amadou decoquitur in lixivio et siccatum tunditur postea in aqua nitrosa rursus coquitur et exsiccatur. mollius fit et ignis capacissimum. constat ex tartareo et ammoniacali sale cum oleo copioso conjunctis exigua terrae portione

quae sigma ita inter se miscentur ut mixtum constituant salino resinosum. agarici ℥II ope spiritus vini praebuerunt extracti resinosi saporis nauseosi et ingrati ʒ VIß. aqua vero perparum ex agarico solvit sed illud in mucilaginosum magna convertit, unde patet quam parum utilis sit agarici maceratio vel decoctio in aqueis menstruis. praecipua ejus vis purgans pendere videtur a spiritu vel oleo tenui acri et exurente, quod in distill. prodit et a quo ejus sapor acris.

purgans incidens et aperiens in catharrosis affect. in iis a quib. febris abest et in quibus serum concretum ac tenacius indigeat a quo liquescere possit in infarctu pulmonum coryza distillationib. asthmate tussi cachexia fluore albo mensium suppressione febribus quotidianis lentis. ab eo abstinendum in acutis et in quib. dominatur atra bilis. biliosis phthisicis hystericis. substa efficacius operatur dosi a ʒß ad ʒI vel II infus vel decoct ʒII ad ʒß

 pria vitia in illo redarguuntur qd ventriculu
gravet et laedat unde nausea et vomitus qd
viscera distendat denique qd tardae sit operationis
nulla tutior est correctio quam trochiscor
praeparatio. agaric sic trochiscatur parantur
℞ Agarici alb. radula rasi et in tenuiss
pulver redacti ℔ß humectetur vino
albo sic parato ℞ Zingib. alb. ctus ℥ii vin
alb ℥iiii macerentur frigide horis XXIIII
colentur. de quo agaricum humectet ut
in mass. solid. coeat et figantur trochisci
in umbrâ exsicc.
℞ decoct. fol. agrim. pimpi. ℥vi diss. agar
trochis. electuar de citro solutiv a ℥ii syr
flor persic ℥i f potio
℞ semi. mund. agaric trochis. et turbith
gum a ℥i cinnam contus ℈i sal tartar
gr XV infund per noctem in aq. fluvial
℥VI in colatur dissol syr. de rham
cathartic ℥i fiat potio in hydrope.
℞ agaric. radula comminut ℥IV rad. irid
flor. ℥ii foli. exsicc nicoti ℈i fol hyssop
thym. a m.i. coq. in aq. com. ℔iii ad
3 partis. dim. in colat. dissol oxym et simpl

℥IIII capiat aegri duos herve hausticalli: quotidie ad ℥VI

℞ agar. trochis ʒß mercur. dulc. gr VII diacrid gr III m. f. pilul purg. cum syr flor persic.

℞ trochisc agaric ʒI jalap pulver et aloes Lotae a gr XII. aquil. alb. gr X olei distill. succin gutt II majoran gutt I conserv flor salviae q. s. f. pil catharrales

Gallae noix de galle corpora sunt quercubus adnascentia quorum genera ha buntur multa quercubus adnascuntur sunt tumores arborum qui insectis originem debent. insecta et imprimis muscae, hujus arb. gemmas, folia, surculos teneriores pungentia, tenera vasa dilacerant succus inde effluit copiosior appellit ob minu tam resistentiam vasa ab humore ampli antur magis ac magis uberius appellente, inde tumores et sunt matrices et uteri in sectorum eorundem ovis excipiendis, tuendis fovendis foetibus excludentis editisque alendis inservientes. si gallae foraminibus perforatae non sint vermiculus aut muscus in eo deprehenditur

250 gallae duo genera alepenses et nostratei
alepenses subrotundae avellanae vel nucula
magnit. angulosae tuberculis asperatae,
ponderosae, colore albicante, glauco aut
nigricante, intus densae et resinosae gustu
astringente et acerbo.
nostratei rotundae sunt subrubrae vel rufae
superficie leves pondere leviores, fractu
faciles substantia rariores, fungosae nonnum
quam cavernosae minus praestant tum in
arte infectoria tum in medicina
gallae multum sulphuris fixi et crassi
continent cum sale ammoniaco.
vitrioli solutionem nigram vel potius
intense violaceam efficiunt dum nempe
alcali sal gallarum sali acido vitriolico
conjungitur metallicas partes ab eo dissi
ciendo. hinc enim metallicae particulae
liquoris fundum non petunt; sed cum
sulphureis gallarum particulis in fluido
natantibus consociantur et sustinentur.
eam ob causam inservit gallarum infus
ad aquas minerales examinandas si in salem
vitriolicum vel quod martiali aut venerei continent
ab hoc infus vel decoct, nigro violaceo parum

pureo aut subpurpurascente colore in
ficiuntur prout plus vel minus salis me
tallici continent.
gallae vehementer astringunt, et nuperrime
febrifuga virtus in illis detecta fuit a ℥β
ad ℥i ineunte paroxismo in febrib. inter
illis praesertim a nimis laxo ventriculi tono
externe etiam ad astring. vaperant. ptes
roborandas ad insesms uteri contra vulvae
et sedis procidentias fluxiones decoctum
℞ gall. malicor a ℥i fol salviae lauri
chamaemel fl. balaust. a p ii coqu. in
vin. auster. et aq. chalyb. applicet pro
fotu ad procidentiam ani.

Atramentum scriptorium
℞ aq. fluvial ℔ iiii vin alb ℔ ii gall
alepp contus ℥ iiii macerentur per 24 hor
identidem agitando. dein bull. per semi
horam cum pluma despumando. vase
ab igne remoto add. gum. arab. ℥ iiβ vi
triol. hungar ℥ ii alum rup ℥β sacch
candid ℥ 3 digerantur denno per 24 hor
postea bulliendo per horae quadrantem
inquantur decoctum per linteum trans
colatur.

251 Kermes. et coccinella. coccum baphicum seu infectorium graine de Kermes graine d'escarlatte vermillion
folliculus est membranaceus pisi magnitudine, laevis splendens ex rubro fuscus prunorum ad instar, tenuissima lanugine vel pulvisculo cinereo tectus, innumeris turgens ovulis rubentibus vel etiam animalculis, quae digitis attrita liquorem fundant coccineum, saporis sub acris sub amaricantis, odoris non ingrati. foliis et teneris surculis cujusdam ilicis adhaeret in regionib. calidioribus
d. Reaumur detexit coccum infectorium insecti quoddam esse genus quae vulgo galle insecte.
apud infectores rarioris est usus ex quo coccinella nobis allata fuit
analysi chy. ex gran. ker. recen. lb i prodierunt non parum phlegmatis 1° odoris et saporis expertis dein empyreumatici salis volatilis. circiter ℥vi olei citrini aliquantum ac tandem olei spissioris et butyrosae consistentiae coloris rufescentis odoris empyreu. nec tamen adeo potentis quae nullas acidi salis notas praebuerunt

ex massa nigra vel salis fixi lixivio
fuit extractum ita ut ex animali pro
sapia coccum illud oriundum videatur.
in difficili partu ad collapsas vires susti
nendas ad vomitum sedandum et ventricul
roborandum ex vino, aqua cordial. vel ex
ovo sorbili sumptum. mulieribus prae
gnantibus laesis vel ad abortum pronis
feliciter exhibetur quin etiam sericum
cocco tinctum deglutiunt. pulvis ejus
a ℈ß ad ʒß. syr. a ʒß ad ʒi
plurimi mulieres qui nunquam ad
graviditatis terminum pervenerant sine
abortu et tandem per sequentium pilul
usu per 9 menses absque ulla noxa et
vivacem prolem exdere sunt.
℞ granor. Kermes recen. pul. confect
de hyacint a ʒi ovor. germin exsicca
et pulverat ℈i syr. Kermesin q. s. m. f.
pilulae novem pro tribus dosis.
mulieres gravidae casu laesae aut alia
de causa abortum metuentes statim tres
pilulas deglutiant superbibendo haustu
vin. gener. aqua t[illegible] vel aq. cardi. autr[illegible]
neravia eadem dosis post 6. hor. itereth-

2. eadem ā tractio post alias sex horas deinde singulis mensibus tribus ultimis deficientis lunae diebus mane jejuno ventriculo tres similes pilulas devorabunt et sic usq̄ ad puerperium cum debili cautidunt

2 gran. Kam pulver ʒI santal rubr. et sang. dracon a ʒß coral rubr. pp ʒiß germin. ovor exsicc. et pulv ƏI confect de hyacinth ʒII syr. granator q. S. m f. opiat dosis ʒI quotidie mane per 9^{m} dies ad abortum prave cavendum

℞ syr. chermesin ʒIII sacch. candi ʒI pulv. letificant galeni ʒII olei nuc mosch still gutt III aq. cinnam. ʒIIII aq. rosar ʒII vini hispan alonensis vulgo alicant ℔ß propinentur ʒII mane et vesperi contra abortum et difficilem partum aut ad vires longo morbo fractas vel senio labantes restituendas.

usurpat in celeberrima confectio alchermes

Coccinella, grana coccinea indica figurae sunt prorsus irregularis hinc convexa inde compressa rugis transversis notata coloris extus punicei exterius modo atro rufi modo leucophaeo cinerei rubro

non nihil permixti. quae hunc colorem attinent praestantiora censentur asportata a mexicano regno.
insecti quoddam est genus opuntiae arbori americanae inhaerentis
coccinella iisdem virtutibus gaudet ac grana Kermes, cardiacum insigne habetur alexipharmacum antifebrile indutum febres omnes quantumvis malignas sanare ideo in peste et febribus petechialibus exhibetur. itam ex aceto tritam astringere ad motum q in forma emplastri vulneri opitulari asserit hernandez cor caput atq ventriculum roborare ac dentes egregie extergere. at rari est usus in medicina. ingredit confectionem alkermes melius inservit pictoribus et tinctoribus ad colorem non tantum purpureum sed et viridissime sanguineum extrahendum.

De Plantis indigenis

Abrotanum mas angustifolium majus. e **Aurone** folia et comae in usum
constat ex multo oleo essentiali amaro aromatico et sale amoniacali
varius intrinsecus utiliquid et mulero mirandum videtur propter odorem vehement et saporem aromaticum acrem.
calefacit incidit aperit putredini resistit vermes enecat, flatus discutit urinas et menses movet; iisdem viribus donatur ac absinthium, paulo tn inferioribus
nocet inflammationib et temperamento calidiori.
hujus comae pulveratae ʒi cum tantillo vini in urinae suppressione
ejus oleo membra paralytica illiniuntur
commendatur adhuc ad pilorum generationem

e Abrotanum foemina, santolina foliis teretibus I.R.H. petit cypres garde robe
constat ex sale ammoniacali et oleo crasso
rarioris adhuc usus, semen cum saccharo vel herbae decoctum in lacte aut aq. ad lumbricos infant b. fol sicc et pulv ʒß ad sistenda alba feminar profluvia ad ʒi in pleuritide
folia inter lanas et vestes ad tineas arcendas

258 Absinthium latifolium

fol. et summit. in usu. quasi polychrestum ~~[struck]~~ praedicatur calefacit exsiccat. ferment sanguinis auget fibras sollicitat attenuat incidit crassiores et tenaciores humores hinc stomachic hepatic splenic uterin anticachect febrifug vulnerar detergens ventriculum roborando diarrhoeas sistit superpurgationes compescit et colicos flatul sedat, obstructiones resolvit quae pendent ab humorum spissitud et fibrar laxitate ictero hydropisi chlorosi cachexiis et febribus vermes enecat

nocet in affectibus qui a fibrarum rigidit erethismo convulsiva et inflammatoria terminant sicut amara pleraq nervis est infensum ut in animalibus tum quadrup tum volatil tum insectis quae ab amaris spasmis afficiunt et moriunt. praeterea dicunt caput gravare oculis noxium esse et appetitum venereum extinguere

comae fervidae et folia exsiccata et pulv a ℈ ad ℥I ex his condita parant.

flores condit obstructiones valentius reserant folia vero astringunt.

succus ex foliis express et parva coctione purgat ab ℥I ad ℥II propinat.

infus. cum aq. vino aut cervisia ad ℥vi
vinum absinthites tpore vindemiarum
℞ absinth exsicc. et minutim conc. fascicul i
musti ℔ c
ejus oleum a gutt. ii ad x gossipio et umbilico
admotum ad vermes
extractum ejus magis astringit a ℈i ad ℨi
sal fixus a ℈ ad ℨß
℞ sum. absinth. siccat pug i inf. in aq. fervid
℥vi macerentur paululum cum trochillo saccharo
calens hauritur ad appetit. et menstrua moven.
℞ absinth exsicc et pulver ℨß corni mar
ℨiii gumm ammon ℨi croci ℈i syr de
absin vel menth q.s. f. op dos ℨß bis in die
ad menses suppr. cachexi. ict. hydr. in
sanguinis lentore et crassit et fibris nimis laxis
externe ventriculum et intestina roborat
vermes necat tumores resolvit
℞ fol absinth virent ℥ii axungiae ℥i
contundantur simul f. Cat calide in angina
℞ fol absinth et parietariae ā. f. c
in contusion
℞ fol absinth et senecio a m. ii. flor cha
mae et melilot a m i. rad ireos bryon concis a ℥ii
coq ad putrilag contund. per cribr. trajic
aspergend vin alb ℔ ii pulv absint cumin a ℥i
f. fari resol ℥iiii ol chamae ℥iiii coq lento igne
f. c. resolv
matthiolus refert hydropicos curasse, post medicorum desperat.
ope conserva cum absinth fol [struck through] virent. ℔ i sacch ℔ iii
simul pist et in pultum redact

2 ol. essent. abs gutt VIII aloes pulv
℥II fellis bovin q. suff. m. f. empl
qd umbilic applicetr ad vermes
Absinthium tenuifolium eiusdem
usus minus tn amarum et magis aromaticum
Acanthus sive branca ursina
emolliens dolorem lenit
℞ fol acant. malv, pariet, mercur. beta
viol atripl et senecio a m I coq. in aq
in colat ℔I dissol mell nenuph ℥III
cristal mi ℥I f. enema
℞ rad alth. nenuph. bulbor lilio alb a ℥I
fol aca. mal. pariet a m I fl chamae. meli
a p III coq. in aq. col. pro fotu
Acetosa pratensis folio longo
sapore stiptico et amaro radicum apparet
vis aperiendi. acido explicato foliorum
vis refrigerandi et motum ferment. compescendi.
oleosis cum sale ammoniaco partibus seminum
vis humores acres demulcendi.
Acetosa rotundi folii paulo plus
phlegmatis
utriusq. folia gratissim. embamma acido
sitim sedant refrigerant appetitum excitant

in biliosis febrib. in apyrexiâ tempor.
Succus fol express a ℥vi ad viii in
febrib intermit. in-eunte paroxismo
praesertim verno tempori iteratur donec
sanetur aeger - cavendum tn̄ pulmoni
ne acido laedat
in scorbuto folia specifica cum alimtis
semen inter cardiaca astringit in alvi
profluviis dysenteria
℞ rad cich. buglos, fol cich bugl borra
lact porta et acetos rotund a mß hord
integ p.s. f. decoct cum pullo galinaceo
aut frustalo colli carnis vitul f. juscul
℞ seri lact depur ℔ii leviter coq in eo
fol acet. m ß. f. col add syr viol ℥ii
dividat in duas doses mane jejuno sum
℞ fol et rad cich. sil. tarax, fragar borrag
bugl a mi rad acetos gram a ℥ii fol
agrim m i coq in aq ℔ix f. bouillon rouge
℞ amygd. dulc. excort ℥ß sem acetos melon
et cardui bened a ℥ii contund ssim affund
aq. scab. ulmar et scorson a ℥iiii f. emul
pro 2 dos. cuiq add syr flaved citri et caryoph
℥ß in febr. malig et variolis ubi temperand
folia externe resolvunt et maturant.

Adiantum species septem

1° verum seu capillus veneris nascitur in puteorum marginibus et rupibus galliae narbonensis

2 adiantum americanum seu canadense

3 nigrum pinnulis obtusioribus. lineolis pulverulentis aversa foliorum parte dehiscentibus distinctis quae capsulas habent rotundas pulvere aureo turgidas. in opacis ad radices arborum et fruticum in aggeribus umbrosis, antiquis et muris De caeteris suo loco

4 album filicis folio

5 album foliis rutae ruta muraria

6 rubrum trichomanes sive polytricum

humores acres demulcenti blando sulphure sale ammon incidunt, sale stiptico roborant stomachi cruditates leniunt tussi continuae asthmati difficili respirationi pleuritidi ictero hepatis obstruct. reserando

singularium capill manipulus 1 in aq. lib. levi ebullitione coq. infantib febre lenta consomptis ab obstruct. sub mesenterii

fit etiam infusum in thee modum cum saccharo palato gratum in tussi,

ruta muraria viribus cum adianto vero conven in tussi asthmate pleuritide ictero lienis obstruc renum et vesicae doloribus arenulis

Mathiolus dicit praestare in enteroceli, puerorum 40 diebus continuatis pulveris forma in scorbuto et cachexia
omnes usurpantur in juscul et apoz aperientib
℞ capill ven. adiant nigr, polyhi ruta mur ceterac a m t fl tussil. p t rad alth ℥i coq in aq ℔ iii f. apoz expectoran
℞ herb 5 capill a m t cum frust. carn vitul f juscul aper
extrinsecus incidunt resolvunt abstergunt
7 Adiantum aureum muscus capillaceus major pediculo et capitulo crassioribus
perce-mousse rarioris est usus

Ageratum, ptarmica lutea suave olens umb. saporis est aromatici amari cum astrictione humores attenuat resolvit abstergit putredini resistit roborat vermes enecat ad quos simon pauli sic
℞ cc. ph. pp rad filic a ℥ii corall sem santol. ageratum tanacet a ℥i myrrh lign aloes fl sulph a ℥ß sal nitr ℥iii m f. pul dos ℥i

Agnus castus vitex foliis angust cannabis modo dispos folia flores seu sumuntur in usum sicut fruct seu grana rotund pipere minora colore cinereo nigricante

 de antivenerea ejus virtute magna est controversia. In usurpatur ad histericos affectus et uterinos furores compescendos et hypocondriacos. sem pulv a ʒß ad ʒi inflamationibus nocet.

℞ sem vitic ʒiiii cont. in aq nenuph ℥vi f. emul

fol et summit decoct vel infus in alio mensa provocant ulcera interna detergit et sanat potissimum virgæ unde in gonhorrea utile

Agrimonia

fol in usum astrictione sua viscerum tonum laxiorem restituit incidit digerit resolvit in cachexiis hydrope ictero mensium suppress in febr chronicis a viscerum obstruct. vulneraria etiam leviter exsiccat et astringit ac dolores demulcet in ulceribus renum mictu cruento, in urinæ incontinentia. fol. sicc. pulv ad ʒi

℞ rad gram, rusc aspar a ℥i fol agrim cich sil a m ii summit lupul m i bull in aq com ℔ iiii f. decoct aper

℞ rad eryngii cich syl a ℥ii fol agrim scolo adiant buglos cherefol a m i sum abrinth fl calend a p ii f dec in s. q. aq. pro 6 dos in qualib diss syr. 5 rad ag ʒi salis machi riverii gr x ad obstruct. resol

℞ fol agr. m II fl hyper p II coq in aq co ℥XX in colat diss syr hed terres ℥Iß pro 3 dos in mictu cruento
in gargarism. ad angin et oris ulcera
℞ fol agr hyssop a m I hord integr p I ficuum ping N II f. decoct. in col diss mell rosac ℥II f. garg. deterg et resolv in angina
ejus decoct cum rad helen ad perniones exulcerat quo pedes mane et vesp abluantur

Alcea *mauve sauvage* vulgaris major. rad. in usum malvae defectu. debilior, et succus minus lentus et mucosus

Alchimilla pied de lion
fol in usu. vulneraria astring. vulneraria autem dividuntur in tres classes astring abstergentes et resolventes humorum acrimoniam demulcendo et laxatas fibras coarctando.
Alchi. astringit et glutinat inspissando interne succus ad ℥IIII decoct ℥VI ad ulcera interna et menses nimis fluentes albos fluores, dysenteriam, in haemoptoe ulcere pulmon mictu cruento diabet. herniisque quoq pulv ad ℥I

℞ alchim pervinc bellid maj et min millefol pyrol bugul sanic a ℥1 vini gen ℔1 diger. per 6 hor. aff aq. farr ℔ııı macer. per aliq. hor agitando identid. dos ℥1 add syr de hed terr ℥1 in casu ab alto aber intervalis
℞ succ plantag et alch a ℥ıııı corall. rubr ppp anti hec poter a ℈1 syr de symph ℥1 f.p. in haemoptoe
ejus decoct reparat virginitatis florem et mammas laxas turgidulas efficit

Alkekengi

coqueret fruct in usum urinas movent demulcendo. sumi possunt cruidi tres vel 6 aut sacchari condit aut vino infus vel sero lact.
eorum decoct cum liquir in dysuria
succus coctio defaecat ad ℥1
℞ sem 4 frig min. a ℥1 cont. aff aq pariet ℥vı sub fin add et contu fruc halica ✓ f. expres dissol syr de 5 rad ap ℥1 f emul in urin, supp
℞ rad petrosel aspar a ℥ıı virg aureae incıı nitr puri ℥ıı bul in aq. con ℥xxıv ad xvııı f. col. contund. fr. alkek xx millepedr vivor et cc affund vin alb gen ℥xxııı hauriat cyath tertia quaq hora ad urinam movendam et arenulas

Alliaria hesperis allium redolens
tota in usu. intense amara
recens urinam movet. sicca veneno advers
in vino cocta. decoct asthmaticis confert
in enematis ad colicos flatulentos et nephr
sem. tritum naribus attrac sternut excitat
valide admotum uteri strangulatu liberat
mulieres oppressas
externe putredini resistit

Allium sativum bulbosa rad. x
in usum. vesicas excitat et cutim corrodit
fugiendum est cholericis et sanguineis.
[illegible] a nonnullis
[illegible] commendat in peste, in hydromel
coctum ad ℥ii ad sudores et urinas proliciend.
colicos dolores flatul. sedat lumbricos enecat
in lacte vel juscul. decoct aut umbilico
admotum asthmaticis convenit sic parat
℞ allii bulb. q.l. denudatis pellicul
cui irrog in vase clauso bulbi siccentur
linteo et in olla vitrea recludant. tum
decocti supra et cum sacch alb. q.s. f. syr
qui bulbis super affund. vase obturat.
dos bulbi 1 vel 3 cum syr cochlear 1 aut 2
ad asthma humorale. diuturnus usus noxius

 in pestilentibus inutile et vero noxium
allii et ceparum usum valde noxium lue
venerea labor. et hæmorrhoid.
ex culinis eliminandum
externe, in mortar contus cum ol oliv in
ung tumores frigid resolvit potenter
succus cum melle et butyro porriginem et
psoram sanat. (lateigne)
ad arthriticos dol allii et sodi maj a. contund
in palt et parti dolent.
frustulo oblonga in aurem dolorem dentium
compescit, aut succus cum theriaca in aure
℞ allii contus ʒi fuliy splend ʒi piperi long
℈ croci camphor a ʒß m. f. epicarpium
ante paroxismum tertian.
Alnus cortex et folia sedrare inw
virtutib ad quercum accedit
cortex cum ferro rubiginoso aq. macerato
color efficit niger. gallae supplere pt
cortex juli et fruct. ashing.
alpinum incolae paralyticos curant foliis
sudorem proliciendo praesertim a causa externa
in locis humidis habit. et dormi, folia in
furnum calentem immitt et aegrotis super
imponunt donec sudor effluat. reiterate
donec aeger sanatus sit sic dolores rheumatici
et ischiadici. in aquis incorruptum durat lignum

eAlsine morgeline enouron
resolvit discutit et refrigerat
decoct oc ar inflam. sedat. eandem ac
portulacae virtutem ei tribuunt
dicunt restaurare quorum vires diuturno
morbo fractae. cont. haemorr dolores sedat
succus depecatus ad ℥i fol sicc in umbra ad ℥i

eAlthaea emollit laxat discutit
dolores lenit, maturat, folia magis
resolvunt quam radices ob sal ammon
in 4or utilis 1o ad urinae acrim
2o ad affectus pulm demulcendos inspiss
acrem virtus.
3o ad intest crosiones dysent epot, vel clyst.
cum astring sociat torment dictor
4o ad tumores durss emoll dolor. sedan
nec majori copia nec diutius coquent. sub
fin coct ad ii vel ℥ß rad. fol ad m i fl
ac sem ad ℥i pro aq. lbi
℞ rad alth et nymph a ℥ii coq in aq lbiiii
f. col. dilue nitr ℥ii per cyathos in dolor
nephritico ardore et suppress urinae
℞ q. ʒ cir. ras cont ℥ii alth ℥i fol mal m ii
passul enucin ℥vi coq. f. apoz pectorale
℞ rad alth ℥iiii fol alth malv flor camem
melil a m i f. cumin pingu ℥iiii f cataplasm

℞ camph ʒß dissol in spir vi ℥i solutioni add ol lumbri ʒß ungu alth ℥iß croci pul ℈i f. linim quo dolens latus inungatur in pleuritide

Amygdalus dulcis sativa fructu majore

amygd. succus cum i3 exh. lactis vices quodam modo adimplet
ol. rec. acria demulcet fibr emollit laxat in inflam urinae adder: tussi molestaedos. a ℥i ad ℥viii reiterat 3a 1a quaq h. pro necess pulmoni utiliss. cum syr bechico. alth cupil papa rhe hyssop heder ter. ad infantum tormina cochleat exhibet
puerperis ad dolores post partum
in pleuritide incipient inflam post ven sect affatim bibit in colicis vinorum siccitate incessantium convuls miscet enem
ex con emollit
℞ amygd. d excor ℥ii sem melon et card bened a ℥i aq scab. scorson a ℥vi add siaph min gr xxx syr caryoph hort ℥ii f. em. s ar in variolis et morbillis
℞ manu calab ℥ii sol in decoct com vital ℥vii add ol amygd d ℥i in colico dolore ad alvum subducend
℞ syr de cich. c. rhe ol amygd. d. ℥i in cochleat infantulis exhib ad tormina ventris
ol amygd. et sperm ceti ad cutis asperitatem

Amygdalus amara incidita, ext
vermes necat
extus dolores mitigat et potentius resolvit
quam dulcium oleum, aurium sordes duras
emollit. faciei maculas a sole oriundas
tollit; cum oleo ovorum variol foveas praecavet
aves, vulpes catellos et quadr quamplurimi
enecant amarore

Anacampseros faba crassa
orpin reprise grande joubarbe des vignes
sylvis umbrosis nascitur. rad. et fol in usu
sunt mucoso et subacido succo saniei ulcerum
acrimoniam retundit rad. refrigerant magis
et abstergunt. internus usus rariss.
recentib vulner consolidans sistit deterget cicat.
tumores maturat dolores mitigat
radices contus cum butyro insalso haemorr
Rhodia radix anacamps. radice rosam spir
radix cephalica astringens in capitis dolor

Anagallis phoeniceo flore sive mas
mouron, caeruleo flore dr foemina.
cephalica, sudorifer. et vulnerar; in mania
phrenitide febres ardentes constantes
convulsio epilepticis hypochond et adversus
infantium tormina, succus vel de coct

 in mania succ vel decoct ad ℥iiii ter indie
menses movet. ad phthisin pulmonum
tabem sputum foetidum et purulentum
cum lacte et saccharo

Anethum s. m. fol. et summit in usu
carminativum in colicis a causa frigid
flatul. singultui et vomitui medetr ab
humorum lentore, coctionem juvat menses
movet lac auget nutricib, somnum conciliat
et dolores pacat sicut crocus nux moschata
et alia aromata oleosa sem. ad ℨi
extus in catapl resolven
flor. inter 4 carmin chamae melilot malvi
sem contus, sporibus infantum apposita
somnum conciliant. ol ess. ad gutt iii in coli.
℞ decoct fol et sem aneth ℥vi theriac vter
℈ii ol essent. anet gutt iiii syr menth
crisp ℥i f. julap in colic dolor
℞ rad alth ℥ii summit chamem melilot
a p ii sem carvi aneth a ℥i coq in aq
lb i cum mell anth ℥ii f. enema in colic.
℞ ol ess. aneth gutt iii ol amyg d. ℥ß
m. f. haust in singultu continuo

Anisum apium anisum dictum
in gallia apud turones sem in usu

inter sem. calida major foenic cumi carvi
numera sunt ammeos anom dauci et apii
carminativa stomachica ventriculo frigido
in difficili coctione, mamenar lactis coagul
praecavet. cum lacte ebull lac auget
et somnum conciliat. anetho longe praestat
in infantum torminib. in raucid. asthm
tussi difficil respirat. ab humor. crass
menses movet cum purgantib miscetr ad
tormina praecavend.
pulvis a ℈i ad ʒi cum saccharo vel vino infus
ol. expres a gutt ii ad x pulvis seu decoct
in oliis praefer. oleo. exter. contus. resolvit
℞ sem anis foenicul dul a ʒi nuc mosch
ʒß cinamo ℈i caryoph et piper long a
℈ß sacch alb ʒiiii m f. pul cujus ʒi in
haustu vini post pastum ad coctionem
ba somum sulphuris anisatum in asthmat.
Anonis spinosa flore purpureo
tota planta praesertim radicis cortex
aperit urinas movet inter aperi minis.
cuspid[is] ad anonid cognosii quamin et rubiae. maj
apii a par. foenicul petrosel et rusci
ictero nephritidi, crenulas amandat
radix vel cortex pulv ad ʒi decoct ʒß

℞ cort rad anon pulv ℥i quotid. e mane ad arenulas
℞ rad anon crysny cappar a ℥i coq cum cum vitel pro duob dos dosol tart marti s.dul ℥i mane et sero pro hepat. obstru.
radicis decoct cum pauxillo aceti gargar detergens in gingivas laxitate exulcerat putredine in dentium dolore a scorbuto

Aparine

gratecron incidit aperit urinas et sudorem movet
cum axungia trita strumas discutere dr

Apium

acre rad. herba sem inus rad inter 3ᵃ aper. sem. intra calidioris attenuat crassos humores obstru resolvit urinas ciet sudores febres arces vulnera sonat. succus folior in febr. inter ineunte paroxismo ad ℥vi ægro contecto sudor profundit
℞ extract folior apii palus ℥i cort peru pulv ℥ii syr absynt q.s. f bol sumat æger paulo ante paroxism in quartam
℞ rad apii fœnicul brusc aspar a ℥i corti frax et tamaris a ℥ß fol ap agrim a m i sem ap et cuscut a ℥iii flor genist borag ung a p i coq in aq f apoz pro 3 dos. add syr de 5 capill vel de pom compos

lac nutricum minuit et concretum resolvit

℞ fol paludapii et menthae ana in 11 coq in aq com cum axung tantill ad putrilag pulpa per setaceum trajice immixto sem apii pulve q.s. f. catapl mammis appli

samidat condiunt in asthm orthopn flatulent: doloris urin et mensium sup dicunt epilepticis suspectum esse et oculis

succus scorbutica oris ulcera detergit putredini resistit et foetorem reprimit

Celeri est apium culturae initium

Aquifolium houx. radiis et corticis decoct emollit resolvit eo foventur articuli qui prius luxati duritiem contraxerunt.

baccae ad colicos dolores crassos per alvum humores educunt numero 12

viscum aucuparium ex ejus cortice sic delibratis junio aut julio arbor cort in aq per 7 aut 8 hir decoqtr donec tenerrim in acervum humi cum silice d.s.s. reponunt aqua prius separata per 2 vel 3 septimanas fermentantur donec in mucilag abeant exempt in mortario tundunt donec fingi possint instar massae farinaceae

 massam in aquam fluentem eluit, nusco residuo despicato. in fictili adhuc vase per 4 aut 5 dies despumando relinquunt aucupariae ei junguntur fruct visci et sebest extern. resolvit emollit maturat

Aquilegia sylvestr ancolie gant de notre dame tota aperit menses et urinas ciet et sudor. rad pul ad ℥i cum vini haustu colicam sedat. in scorb utr ad oris ulcera detergenda et gingivas roborandas. veteris ℞ sem aquil gr xxv rasur ebor pul ʒiß lumbrii terrei pul croci ʒß ℈ß m f. pul in ictero ℞ pul fol aquil salv menth crisp. rad morch rutae myrrh a ʒß alum ust ʒi mell pur ℥vi f. linimt quo gingivae putrid inungan

Argentina potentilla. penta phillorides argenteum alatum i r h vulneraria astringens, refrigerat exsiccat repellit roborat; haemorrhagias coercet sputum cruentum fluxum uterinum et haemorroi succus ad ℥v decoct vel infus in vino vel aq vulnera et ulcera sanat; ictero et calculo conducit calorem febrilem compescit et sanat. decoctum in gar cum alum laxam columel restituit

in aceto coctu commistus dentes firmat
et laxat cohibet gingivas
aq still ad lentigines et maculas faciei

Armeniaca fructu majori
i melco amaro abricotier
alimentum dant exiguum sicut alii
fructus fugaces calidis siccis conveniunt
frigidis nocent febres accendunt mucosum
chymum astringendo. nucleus vermes necat

Artemisia major caule et flor
purpurascentib tota in usu
uterina et antihyste antispasmodica
menses foetum secundinas pellit. in decoct
pase pot. et balneis et lotionib
℞ fol arth et matri a m1 infund per noct
in vin alb ℔ß col add tinct marti
℥ii aq cinnam ℥i in mens et lochior
supp
℞ fol art matr a m1 coq in aq ℥vi
dilue syr arthem ℥i add sp vol cc succi
gutt xx f. jul cochleat in hyst pass
℞ summit arth pul ℥ß suc ppp ℈ß castor
gr iiii extrac aloes gr xv c. s. q. consar
flor calend f. b. in pass hist et urina supp
pulvis herb. siccae ℥iii in vino opt in ischiat

 ben: recent aut succ iis qui nimium opii
remedium optim
balneum aut pediluvium ex ejus decocto
lassitudinem membror aufert tonumbus suu
ptibus quib attenuat discutit resolvit
et lassitud post morbos chronicos
balneum parat ex solum solo regrim
chamaem. folia ejus carnem anserum
teneriorem reddit infarciendo
carbones radicum id est ejus veteres
radices pul ad ʒ1 in epilepsia

eArum vulgare maculatum et
non maculatum radix summa pollet
acrimonia recens sicca quam sicca
incidit potenter et resolvit egregium
stomachicum in asthmate humorali
tussi a pulmon infarctu ictero chlorosi
obstruct reserat in affect melancholi
hypocond. histericis scorbuticis a lento
humore. nocet in humorum acredine
rad: a ʒß ad ʒ1
℞ rad ar ℥IIII contund in mort marmo-
per setaceum pulpa trajiciatur add mell ℥III
et fol subint pulv ʒiß f op. gumat a
ʒß ad ʒ1 in cachexia
℞ rad ari pulv ʒß cinnam ℈1 sach alb ʒ1
m f pulv in asthmat tussi minui supp...

℞ rad ari irid flor anthe pot flor sulph a cum melle vel syr de erysimo f. elect d. ʒii bis die in asthmate pituitosi affect

℞ rad ari pul ʒiß croc mart ap ʒß myrh gum am a ʒi fl sal am mart ʒß conser fl calend vel genist ʒß syr de absinth m f elec anticachectic d. ʒi bis in die

Fol arthritidi dolorem sublevant contusa cum stercore vaccino mista parti dolenti calide ex planta florida massam conterendo et macerando per 21 d. quotidie idemum renovando Eandem massam exsiccant saponis loco utunt

Asarum cabaret vomitorium purgans diuretic sudor menses stimulat rad pulv a ʒß ad ʒi infus a ʒi ad ʒiiii decoct in vino vomit. in aq alteram diaphoretic. in morbis chronicis febril intermitt. folia violentius purgant a 5 ad 9 vino aut hydromelit. iterato ... pulvis folior errhinum praestans gr. 4 aut 5 ante decubitum reddit somn tranquil in aures insufflatus ad gr i surditati medetur contra capitis affectus contumaces ex visci de gravativos dolor paralysim morbos soporosos ... in aq coct in scirrho viscerum resolvit affinitur

 rad fol et fr. capiti admota in febrib incunte paroxism

Asclepias flore albo dompte venin rad amarae sub acres aromat. alexiph et sudorif menses et urinas movet. pulv ad ʒi infus ad ℥i in variolis morbillis febrib malign. ejus decoct scorsonerae anteponit ad diaphor in hydrope. aut fol cont. tumores mamar resolvunt.

Asparagus sativus. turiones aliment parum urinam movent et foetor ei communicant. turion infer vital diuret inter 5 rad ap in pt. ab ʒß ad ℥i pro decoctione,

Asparagus sylvestris valentius agit

Asperula aparine latifolia humilior montana petit muguet. totaines gratum spirat odorem incidit attenuat firmat et roborat in levior obstr. utero epilepsia paralysi. vulneraria blanc. sulph

Atriplex pallide viren. aroche belle dame bone dame folet. tres in usu Atriplex hortensis rubra. utraq parum aliment exhibent stomacho nocent nisi condiantur sale et aceto. refrigerant humectant alvum emolliunt.

egregie hypocondriaci quor viscera aestuant

enematib emolli et anodin ad inu
in cutup ad dolore mitig tumorib
duriis et podagricis dolor cum foliis vitis
anethi et chamoem ingreii pediluvia
ad somnum concil in febr ardentib
albae semina recentia alvum et vom[itum] cient
Atriplex foetida. chenopod affectib
uterin. antihisterica censeh, odore
paroxismos fugat.
potus infusi folior passioni hister prodest
ex fol contus conditum parat pro hister.

Avena alba et nigra facile
coquit et optimum alimentum corpori
subministrat.
grualdum gruau bechicum et confert
tussientibus humorum acrimoniam
demulcet aestum temperat et aestuantes
sales per urinarum viam expellit, sudore
etiam provocat unde in catharris rau
cedine tussi asperitati faucium aptiss
ab acri lympha pleuritid eresipelat
in febrib acutis jusculis carnium ante
ponend quia ad efferverent minus ducunt.
avena cum pugillis aliquot salis in sar
tagine torrefact cum gran junip et cumini
sacculo telae inclus
farina eius exter exsiccat et mediocriter digerit

Aurantia acri medulla

Bigarrade, dulci medulla orange douce
aqua naphae cephalica stomachica hyster
alexipharmaca ventriculum roborat
menses movet ad cochlear i aut ii ad febr
pestil et mali moris sudorifica ad ℥vi
cortex acidorum stomachic humores crass
dividit attenuat flatus discutit colicos dol
sedat menses movet vermes enecat in sichur
pulv a ʒi ad ℥i
pulpa dulcium sola vel cum sacharo
sitim extinguit refrigerat appetitum revocat
sed alimentum pravum itaq cavendo
a billius ingurgitat diarrheas excitat dysent
acidor pulpa deterior pulmones irritat
succus acidor aqua dilutus cum sachar
gratissimum dieb aestivis aequinam
temperat febricit biliosis et scorbuticis
utilis ad ℥ii
malum aur dul integr cum cortice comest
ante febris intermitt accessi pro. saepe
averti

Bardana

lappa major glouteron [hath a great name]
sem. amar et acria diuretic praestans
ad ʒi ab aquileo contra ischiad... dolorem
radix diuretica sudorifica pectoralis utri ...

vulnera et febri fug. in morbis malign.
Scorsonerzarleponil in morbis venereis
saltem pro emaciatis. pleuritidi quae in
empiema et phtisim degenerat, adhibitur summi
pulv ad ℈I in decoct ℥I pro aq. ℔I
folia et flores iisdem virtutib sumi ad ℥III
cauls antequam flores perficiant demto
cortice radi coctis cum sale et aceto non
inmaeng. fol et caulium decoct pleuritidi
aestativ propinat et adversus quartanam
℞ rad Bard taleol dirct ℥II rasur cc ℥I
coll in aq ℔IIII ad ¼ dim add malum
citreum tacial ad gratiam fiat in febrib
mall et variolis
extus fol mundificant vibris lavanti
et ambusti conferunt, coct cum lacte
dolori adhib sedat. in contusionib sanguin
grum. dissol

Beccabunga

veronica aquatica major folio subrot. et veronica aquatic minor fol subrot. est temperatur naturae ad scorbut sicut nasturt. calidis et siccis naturis magis convenit succus ad ℥IIII vel solus vel cum sero lactis. in apozem alterum aperientib et antiscor. a m i ad IIII
extus haemorrh tosta vel coct fol. praeskm phlegmonib mcipil. fauci maculas delet

 ℞ fol. becab nasturt aquat erysiph. et

metro rot a m ii carnis vital tt i f jus

Bella dona solanum lethale est

somnifera et maligna, acetum aut succus

limonum piss hujus veneni antidotis habenh

fol contus extus demulient et potenter resol

ad erysipelas sacrus ignei et calidos affect

hemorrois iufl mamar duritiem emoll

etiam cana. cavend stupefact remid. etiam exte

succo vel aq istl faciem fucuunt dulce quo

faciem ut ex rubicunda pallidam efficiant

unde belladona

Bellis major buphtalmum majus et

leucanthem vulgare i.v.h. grande marguer

oei de beuf gr paquett.

Bellis silvestris minor paquerette.

vulneraria et emolliunt attenuant et deterg

succus ad ℥iii vel fol et flo coq. diuret et vuln

herb integr in zythogalo decoct sudvam

asth phtis.

enter unguent ex flori bell m et axung adver

porrigin. folia bell m. vuln cicatrisat

ad cervicis dolor, tumores strumat discutit

podagr lenit. infervent in intestin eruci

ubtiliter [illegible]. in pleuri lido [illegible] grum

resolvit, succus alvam exutat pudlisp

bell m. mstur et numinul succi cochl 2 vel 3

cum mell ros vel jusul in phtisicis desperatis

Berberis dumetorum spinavinelli.
fruct. refrigerat astringit humores
ab acri bile compescunt biliosos alvi fluxus
ventricul. roborant.
imaturi comedunt sol. vel saccharo, siccati
magis astringunt; succus ad ℥i ad sitim
exting. in febrib. ardent.
Regimin. fruct. ber ℔i in aq ℔xii cum
sem foenicul aliquantul sic macerant per diem
colant et cum saccharo propinant in febr.
ad sitim exting. vires reficiend. praecipue
in alvi flux. ejus syrupo etiam uti pot.
sal ejus essential. instar cremoris tartari
sic conficit. ℞ succi berb. et limon ℥ii diger.
per biduum in balneo mariae balneo mariae
evapora ad dimid. in cella repon. cristalli
concrescunt succus superstes per inclinat.
iterum evapor. in quaq. animati opt.
℞ confect. alther. l. ad ℈i syr berberis ℥i, aq.
cinnam ℥ß aq meliss. oxirrhod. a ℥iii m. f.
pot. cochleat in febrib. malign.
℞ aq. plant ℥vi succ berber ℥i mell. rosat
℥ß salis prunell ℈i m. f. gargar in faucium
inflammat.
acini potenter siccant et astringunt in alvi
fluxu albo fluore mulier. pul. ad ℈i

 ex corticis lixivio tinctorii flavum color
℞ ros rubr sive balaust a ʒii aq plantag
℔ii macerent in B m per aliq hor. colaturae
dilue syr be be ℥ii sumat cyer ℥iii 3a quaq hor
in haemoptoe et diarrhea.

Berula sium sive apium palustr
foliis oblongis berle ache dean
inter antiscorbut et aperient succus ad ℥iii

Beta alba . beta rubra vulgaris.
beta rubra radice rapae bete ou poiree
inter emollientes
Sicla parum nutrit ventrem constipat
et urget
succus betae tum fol tum rad nari bus
exceptus sternut proir fel humores pitui
tosos magna copia elicit adeo cephalalg
hemicrana cathar coryzam compescit
et ïncterat oculos distillat. tu alii qd
errhinum valde noxium
℞ fol betae lactuc portul chaerefol
oxylapat a m i coq cum pullo galli
aut frustul colli vitulini f jusc
℞ fol betae atrip malv alth a m i sem lin
q s coq in s q aq. flor in colati dilue
mell viol ℥ii ol liliis ℥i f enem emoll
℞ suc rad bet ʒi aq major ʒii mell
anthosati ʒß f errhinum in coryza

Betonica purpurea. diuret.
attenuat aperit et abstergit, cephalica
hepatica splenica thoracica uterina diuretica
antiasthmatica et vulneraria, vi anodina et
leve inebrian. syr ad ℥ succi fol ad ℥iiii
arthriticis curati usu floret fol jejunii
acetarii potu et balneo rad. rarr in usu
fol sic pul sternut praestans in morbi capitis
sternutatoriis abstinend ubi inflam. imminet
in defluxionib cum febre obnoxiis vertigini
et gravidis
℞ fol bet cont liqui ℈ß aq ∴ coq in capitis affect
℞ fol beton salv major rad. iris flo a ℥ß
fol nicot ℨi f. pulvis sternut
℞ fol beton maj salv a m ß contund cum alij
vin alb et aq beton a ℥iiii f errh. tepid excip

Betula bouleau cort bitumin
ex illis contortis nocturnas faces parant alpini
sub fin hyem succo turgens lacrymare incipit
ex truncis et ramis succ dulc et potulentum
hunc siti pressi pastores in sylvis potant
fol capar cend abstergen
℞ ... junip m iii vitae virent absinth rad
hele cort betul ex candice inferiori communibus
non castrati sabinae pulv bisi a m ii
fol quercus myrh a ℥i f. pulvis pro domibus
contagio infectis
ejus lign substituit. ligno nephritico

288 humor efficax in calculo diuretic
in podagra et scabie sanguinem purificat ad ℔ii

Bistorta radice minus intorta et
altera magis intorta balsamica vulneraria
astringens inter alexiphar et sudorif
rad in decoc ad ℥i in aq ℔iii pulvis ad ʒi
ad fluxus sanguinis nimios post partum cum
uterinis et leniter expellentib, haemorr fluor albo
℞ rad bist min concis ℥i glycirh ʒi rasur
cc ʒß rad gram m i in aq ℔iiii propoto
℞ alvi fluxu variolis adveniente
℞ rad bist ℥ii coq in aq ℥xvi add fol
major plantag a m i vini alb ℥xiii d. ye
in vase obt add syr de coctemis ℥ii aq
cinnam ℥ß dosis ℥iii bis terve in die
in haemorragia uterina ex secundinae portione

Boletus esculentus incor. illos
gustu suavissimo sanguinis motum auget roborat
parciori nutrit usu nimio ab illi bilioni noxius

Bonus henricus chenopod
foliis triangulo germina novella cum
butyro et sale comeduntur emolliunt laxant
cataplas dolores podagr sedant
℞ fol boni henr m iiii flor samb et camomel
sicc a m ii cont coq in aq sambuci ad pult
add ungu caraminum ℥ß camph ℥ß fiat cataplas in
podagr praeviis praemittend
succus in scabie succus cum aceto mixtus utilis delet

Brunella Borrago

florib cordial. inter cardiaca, ei vis robor
Laetitiam excitandi sanguinem defaecandi
humores lentos tenaces dissolvit d. i. d. r. atten
obstruct. tollit, secent et excret restituit urinas
sudores et expectorationem juvat qua propter
in calida intemperie a succis crassis acriant
inflam minitantib. in placuit peripneumon
morbis inflam. incipientib melancholicis hypo
hystericis cordis palpitatione cachexia mensium
supp. a crassitie aut irritatione.
rad. fol et fl in decoct et insul, succ. ex
fol ou ℥ii ad ℥iiii miscetur aliq. cum succ
bugl cheref et cichor cum syr. puct vel laa
vere vel aestate dum herbae vigent succi
asservare in hyem. ne corrump 1° affund ol
olive 2° post despumation ad 4a ptis consumpt
coquantur et add pro ℔. spirit ℥ii vel iii
3° per residentiam sponte depurati succi im
mittuntur vasis halitu sulphureo conditis
verum ab alcido sulphureo non nihil immutantur
fl. inter cord recentes in acetariis comeduntur
vino inject animum exhilarare dicuntur
℞ rad borrag et cichor ana ℥i fol borrag buglos
lact et agrim a m. i. sal prunel vel polychrest ℥i

290 aq cum pull. gallin aut fructul coll carni vitut. f. jusul dio mane et sero sum
ad Iguinis ortum conjescan viscerum obst
in cachexia chlorosi hydrope incipiente
℞ succ depec borrag bugl ℔i d. luc.
syr viol tabsil aut caryoph hort ℥ii
distrib in 4 dos quarta quaque ho interjectis jusculis in plurib pereign febrib
inflammator. add. pti succ cherfol et cichor
ad diuresin et obstruct potantis ceserar

Botrys chenopodium ambrosioides

folio sinuato i.r. h primant.

ad pectoris affectus pituitosos commendate
praesertim in tussi et asthmate humid. solitop
infus in vin tardiori aut in aq bull. instar
thé mane et vespere ad ℥vi propinat
et pulv ad ʒi. mucum incidit expectorat
promovet, pulmon ulcera detergit et vomicas
sanat. extra cum chamemel et matric puerper
a partu cruciatibus auxiliatr et praesentaneum
auxilium ubi in oleo lilior parum por coquant
et dein ovis gallinaceis excipiuntr miscantr
coquuntr ad placentae formam et ventri superapp
℞ botryos exsicc et pulv q. s. add mel depp
q. s. f elect. dos ʒi ter quater vel iie
adversus vomicas pulmonum

℞ herb. botry recent m. vi capill. ven. m. iii passul. corynth. ℔ß glycirh. ras. ℥iii incis. et cont. infund. in aq. botry q. s. coquantr. fiat colat. add. succ. botryi ℥iiii succ. heder. terrest. ℥ii sacch. alb. q. s. f. c. aq. f. syr. dos. ℥i mane et vespe cum cyatho infus. botryos in phtisi incipient. ulcere pulmon. et prævalenta expuitione

Brassica capitata alba olitorum chou pommé blanc. capitata rubra brassica rubra ramorum ejus externa vere in acetaria expetuntur. brassica alba vel viridis. alba crispa. cauliflora brassicæ ex aqua decoctum summe fœtet. et putrefacta tetrum spirat odorem propter sulphur crassum et salia volatilia narrant romanos per sexcentos annos sola brassica ad omnes morbos usos fuisse verum tn difficilis coctionis parum nutrit et succum crassum melancholic. gignit ventrem inflat, halitibus caput replet mentis operationes hebetiores reddit somnumq. turbulentum efficit, quare non valet nisi iis qui valent stomacho et duro labore exercentur:

extus fol. lateri impont. in pleuritid.

Jus cauli's solvit, cujus suostia stringit schola salernit. ei dupl. cognovit facul. contra preterea vis detergens et vulner; A p. auli vidit verrucas illitas ejus succo spatio 14 evanuisse. potum adhuc facit vulnerarium ex. brassic. rubr. sanicul. verben a m. I. nuci moich ʒinʒib a ʒß in ℔ vi cerevisia macerat; pro potu ordinario
velsius, in scorbuto affirmat esse præstans potu quotidiano ex vin ℔ iiß qui b. brassic rubr concod m. iii. cum ʒinʒib ʒß cinnam ʒii macerat
rubra acrimoniam pulmonis demulcat in juscul pectoral
℞ pulmonem vitulinum ℔ i minutim secca et brassic rubr ℔ i napor ℳ xii oryzæ mund cochl I coq in aq ℔ vi ad ℔ iii pro 4 juscul. in tussi vehementi et spirand difficul
℞ succ defæc caul. rub ℔ I croci min conci ʒiii mellis despum et sacchar alb a ℔ß coq ad syr consistent
in dolore lateris fol butyro illita et pulvere cumin aspers
Brunella consolida minor herba vicha... major folio non dissecto
inter vulner. astring. usus in vulneribus imprimis pulmon in sputo et mictu cruento

uterinis hemorragiis dysenteria.
decoct. ad ℥vi succus ad ℥ii vel ℥iii
in faucium et tonsillarum inflam. in sphti et ulcerib oris et palati decoctum diu in ore detentum.
℞ brunell m.i. coq in aq ℔i ad medietas sub fin add mell rosat ℥i sal prunel ℥i f. col. add phlegm vitriol ℥i . f. gargar
℞ fol recent brun et veron a m i vin rubr ℔i macerent in vase clauso balneo mariæ per 6 hor. f. col. cum expression cujus ℥iiii ter in die in mictu cruento
℞ succ depurat. brun bugul sanicul ℥iii syr heder terrest ℥iß f. p. in sputo cruento et hemorragiis
rustici plantam recentem contusam vulneribus imponunt. in putridis ulceribus sedis et pudendi

Bryonia aspera sive alba baccis rubris couleuvree vigne blanche. rad. in usu alba baccis nigris minus utilis
bryoniæ radix recens serum lentum crassum et glutinosum potenter dissolvit quaecunque in pto sit condensatum. illud q evacuat per secessum nonnunquam per vomitum. siccata debilior solum per inferiora purgat

 in hydrope passione hyster asthm. epilep.
vertigin paralysi arthrit. et morbi chronic,
imprimis in asthmate humorali in hydrope
pectoris et uteri et hysterica passione ab obstr
at vero cum sit acre cathartic temperari solet
cremore tartari sale veget, aceto cum aliquo
pulvere aromatico et stomach,
rad sicc a ℈i ad ʒi succ a ʒi ad ℥β
sydenh asserit maniae sanation post praemissi
praemiss si aeger rad pul ʒi cum lacte vel
infus ʒβ in vino - 3ª vel 4ª quaque die sumat
primo vere rad excavat et cavitas postero
die succo repleta exhibet ad cochl 1.2 vel 3
purgat aquas hydropi
℞ rad bry pulv ʒβ cremor tart ℈ f. bol
cum s.q. conser rosar
℞ rad bryon recent ʒβ vin alb ℥iiii macer
per noct in calid dissol syr viol ℥i f.p. in mania
externe potenter resolvit, in ischiatico dolor.
cum oleo lini tusa
℞ rad bryo. alb. succosae ℔β in taleolas frige
in sartagine quousque contabescat cola add
tereb. abiet ℔β cerae ℥x f. ung. supra strumas
apertas vel non mane et vesperi sanat omnes,
Bryonia nigra, tamnus racemosa flore
luteo pallescente minor, sceau de notre dame ou
racine vierge externe usurp. rad ad resolvend

Buglossum angustifol majus flore cæruleo easdem habet virtut ac borrag

Bugula bugle ou petite consolida media consoude

vulneraria et astringens fol ad m i

fl ad p i aut ii succ fol express et defæc ad ℥iiii in ictero hernia asthmat et pulmon ...

℞ fol bug sanic alchimil vincæ pervin pyrola veronicæ a p i seu ʒß affund vin rubr gen ℔i infund per 6 hor in vase clauso dein superaff aq. com ferventis ℔iii macerent adhuc et colent dos ℔ß mane et sero in cruenta expuitione casu ab altu

℞ rad aristol rotund, gentian a ʒii rad rubi tinct ʒiß min incid et bull per ½ hor in aq ℔iiii tum add fol bug sanic brunel alchim a ʒß flor cent min et hyperici a p i bull leviter et colat servetur dos ℥v cum syr hed terr ʒß

et potio vulneraria insignis ad vulnera ulcera

fit ung ad ulcera et vulnera cum fol bug scab et sanic in axung bull. ad siccit

Bursa pastoris major folio sinuato tabouret malette a berger

intus vulner astring refrig, cruent

 itaq in hæmorrag. diarrh. dysenteriis gonhorrea aq vel vin rub. coct vel infus ad m I. vel succ depur ad ℥IIII vel fol sic puly ℥I

℞ fol vir burs past, plantag contund, sum hyper a q.s. affund concisis in lacte vacc q.s f. distill. ℞ hu, ius aq ℥VI syr alth vel nymph ℥I m capiat æger terindie in mictu cruento in gonorrh. succus vel decoct ℥II cum gr III camphor narium hæmorragias sistit et mensium fluxum cum aceto contus et semper ivo tumores calidos inflam- excipil

decoctum in gulæ affect purulentis

℞ fol burs past et plantag a m. II. aceto irrorata contundant et in sartagine coquant ad cataplasm consist regioni pubis appl. in uterinis affect. expectatum

Buxus arborescens, quidam asserere sudorif sicut guajacum et lignum buxi pro guajaco sumunt. alii lign scobem astringere et exsiccare unde decoct in aq. alvi profluvia sanare et cum vino rubro prodesse in dolorib dentium a frigid fluxion

oleum nigr empyreum. narcoti antispas sicut ol guajaci, in epilepsi hyster ad dol dentium et cariem guttat in cavum inst. fol succ express. in pleuresi tanquam arcanum a schrodero decoctio fol. in ictero aiunt fructus

hoc oleum rectific anodyn, diapho
a gut x ad xx illitum impetigines sanat
cum oleo hyper. ad ibrumatis dol.

Calamintha calament

calamintha pulegii odore sive nepeta
cal. magno flore. mentha arvensis ver
ticillata hirsuta. vulgo pouliot thim
viscidos humores potenter incidunt, appetit
excitant flatus discut menses movent urinas
expector promovent asthmaticis conveniunt
et pulmonib exulcerat in modo thc infus
exter discutiunt attenuant resol in balneo
assument in paralysi

Calcitrapa carduus stellatus

diuret valn et febrif. succ e fol expres
ineunte paroxism ad febr intus a ℥iii ad ℥vi
pulvis stellte ad ʒi
℞ cort rad calcit ʒi infund per noct
in vin alb ℥v infus cap mane ieiun ventr
postridie ℞ fol prunel m i ligni sassaf
sem anis a ʒi cinnam ʒß bull levit
in aq com ℥viii infund per noct
dissol sach ℥ii f.p. calidissim propin.

Calendula caltha vulgaris flore

pallido souci caltha arvensis
flores odorem ??quiris bene valentis
exhalant

 utriq eadem virtut tu scheuch majori
aper: resol. obstruct. lienis hepatis uteri
ictero medent menses cient sputum pro
movent humores crassos attenuant, inter
alexipharmac. succ. a ℥i ad ℥iiii infus
fol et fl in vino alb a ℥iii ad ℔i extrac ʒi
conditum a ʒii ad ℥i. in scrophulis flor
et fol cruda vel cocta comesta et decoctum
pro pota solito. decoct flor in zytho galo
ad variolas expellenda
℞ succ fl calend ℥ii pulv lumbric terrestr
ʒi sal amonon gr XII. f. haustus in ictero
℞ extrac calendul ʒi aloes gr XII borac
pul ℈i ol cinnam gutt i syr de absinth
f bol in remora mensium
fol contus tumores resolv verruc et clavos
pedum
Camphorata vuln. et astring
urinas ciet sudores aut blandam diaphor
excitat menses provocat, asthmati humid.
prodest adversus hydropem in qua nulla
sitis nullus ardor in decoct ʒi in aq ℔ii
vel in vino macerand
Cannabis sativa chanvre

aqua in qua iutabuit tantopere viru
nocet ut epota praestantissimo sit exitio
cui antidotis occurri vix possit. vi inebriant.
et stupefaciente fol donant
sem. caput vaporibus replet ut coriandr
sem lacte decoct tussi opitulat. ad icterum
et emulsio sem. q̃do ictar est citra febrim
eadem gonorrhoeæ et ardori urinæ.
ejus ol cum cera ad ambust. quor dolorem
sedat: fol et sem. contus tumores resol. potent.
ferunt elisabeth angliæ regin variolas. mauel
doluisse emulsione ex semine canab detract
corti cum aq voror posset et cum gossipio sæpius
indie admota
Sem, canab. gallinas ovorum feraciores
reddit itaut etiam hyeme sæviente ova
ponant. verum postea steriles ob alimti
copiam et quasi pinguedinis mole obrut.
avicul is oibus, cibus est optimus

Capparis spinosa fructu minore folio rotundo capriere

gemmæ fl. adult quas vulgo capres
dicimus aceto condit in acetariis. palat
grat inter gulæ irritament.
cavendum ne cappares ab ærugine viorem
contraxerint, sæpius mercatores eas in vase
aheno cum aceto macerant ad eleganter virorem.

cortex intus incidit aperit cum quadam astrictione in primis

300 condyte
externa acetum quo gemmae conditae fuerunt utile lateri ad tumores lienis
cortex radicum diuretic pul ad ℈i infus ʒi
℞ cort cappar ʒiii capp muria condi ʒi coq in aq mul, ael vin aut oximel ℔iii f. apoz ad induratum lien.
℞ cort capp, medii fraxin tamarisci a ʒi cuscut epithim summit lupul et fol scolop a m. cappar condit ʒß f decoct ex aq ad ℔ iiii quo dil syr capill ver ʒii dos ʒiiii sexta quaq hora in morbis ex viscerum obstruct et affect hypochondr.

Caprifolium germanicum.

ei vis diuretica tribuitur. ex fol succus expr. vulnerarius et abstergens ad capitis vulnera. ad impetigines, et alia cutis vitia
et fusus sanguis aq flor distil cordial in ulcerib et condit palati ...

Cardiaca appellatur, nomine quam vis celebrior. non nulli cordis affectib.

Carduus benedictus cnicus silvestris hirsutior.

diaph et sudores potenter movet, alexiterius antipleuriticus et febrifug. in oib febrib malign in ipsa peste. succ ad ʒiiii decoct ad ℥vi pulv ad ʒi extract ad ʒß quod cum tantillo laudani opiati sudores adeo provocari ut quasi difflaant.

conducit ad sequinem grumosum. diss.
in casu ab alto, in morbis chronicis sumit
infusum cum aliis amaris ubdiles propinatis
sem. in emuls cum aq stil papav rhead
adversus pleuritis et rheumatis sudor prolici
aad. emuls in variolis et morbillis aliisq
malis moris morbis exanthematum erupti. facilitat
vulnus quoque vulneraria in contumacib ulcerib
et cancro ipso sed initio junii colligi debet
℞ fol card bened m ß contund in vin alb
gen ℥v colat haur ad sudorem proliciens
in pleuritide
℞ sem card bened ʒiii contund in aq. card
bene ℥vi in colat dilue syr melis vel carpoph
℥i f emul ad sudorem in pleur variol et morbil

Carduus Mariæ albis maculis
notatus vulgaris, folia tenera demptis
spinis a nonnullis inter olera.
eædem ipsi tribuuntur virtut quib carduus
bened. sem. dr specific adversus hydrophobiam
℞ sem card mariæ et card bened ā ʒii
sem nasturt ʒi contund simul affund aq
still card bened ℥viii f. col dil syr melis
℥i f emul sudorif in pleuritid et rheumatis
externe hujus decoctum vel aqua stillat
in phagedænis et ulceribus erodentib et
in cancro narium, radix in hydrop. ʒii in vin alb

 Caryophyllata vulgari
benoite herbe de st benoit galict-vende
adversus catharros et capitis dolorem ~~obstruct~~
ob salem volatilem quo donata. sicca vero et
sale volatili orbata magis astringit ad fibras
ventriculi et intest firmand in diarrhea
et alvi profluviis cruentis hemorrhoid
decoct rad recent ℥1 vel herbae integ m 1
in aq com ℔1ß ad medias vel corumd
cortas infus in vin ℔ß per noct et percolat
ineunte paroxismo sudorem provocat
et febres abigit. in variolis morbillis
decoct cum rasura CC ubi alvi fluorem
metuend. pul ℥1 in vino calido ad resolv
sqi coagul obstruct. hepat lieni mezenter recent

Carvi stomachic diuret. inter
4 sem calid hum tenac discutit et flatus
colicos dolo. sedat urinas et menses movet
sed ustionis ptil actum accendit et ad
inflam dispon. sem pul a ℈1 ad ℥1
vel infus in vin. ol ess. ad gutt III cum such
radix dum tenera non minus efficax quam
sem
℞ sem carv pulv ℈1 sacchar alb ℥11
cum vin generos ℥III sumat in colica flatu

Rossoli des six graines

℞ sem anis fenic aneth coriand carvi et dauci a ℥ i cont macerent ad solem in vase vitreo clauso per 2 hebdom cum ℔ iii add syr ℔ i ... aq melisse crispae et chamemel dos cochlear i aut ii ad cibor coct. dolores colicos urinas provo et menses ciendos

Caryophillus alt. lei major

oedlet copioso suo sulphure acres equid sales involvit ad demulcet in omnib capitis et cordis affect. praestat in morbid malignis et pestil. solus flos hac virtute donatus vdth infus vel decoct; ejus syr a ℥ i ad ℥ ii condit a ℥ß ad ℥iß

fl in aceto maceratis illud colore rubro odore suavi sapore grato et virtute cardiaca insignitum tempore pestilentis ad contagium arcendum linteum hoc aceto madefact et mane cochlear I hoc aceto

Castanea sativa. silvestris

sub cineribus coquendi modus aliis praefatis nam in sartagine partim comburuntur aut aliquid fuliginosi empyreumatis contrahunt sed cultello ... debent ne deflagrant tostae et decorticatae cum succ aurant aut limon et tantill succh - mensis secundis off

301 flatulentae difficile coquunt multum praebent alimenti sed crassi
nocent calculosis colicosi et viscer. infarctis
crudae astringunt tum q membrana quae cunam ambit. farina cocta cum melle et sulphure
sub acta tussientibus et cruenta exspuentib
interior membrana rubens in alvi profluvio
ʒii. externae cataspl cum castanea medul
farina hordei et aceto mamas dur. item
resolvit et lac coagulatum dissolvit

Centaurium majus folio in plures lacinias diviso

virtutes contrariae huic tribuunt ob acri moniam crassos humores incidit viscerum
obstructiones resolvit menses movet dysenteri
ratione astrictionis profluvia sistit. in hernia
hepatis obstruct. reserat et roborat hydrop
et ictericis prodest. ad ʒi in decoct vel infus
vulnerariis astringent et aperient. t. pul ʒi

Centaurium minus

summit. floridae incidunt. in affectib
chronicis febrib intermitt. haemorroidales
venas aperiunt et menses provocant
sum ad p. i. velii in vin vel aq. cardui
bened decoq pulv ad ʒi. vermes enecat
contra canis rabidi aliorq venenat morsus.
ictero, mensib suppressis, scorbut. podagr. veranut, hydrop
ucit ad ʒi cum anisi semine duob dieb interposit

Pulvis palmarii contra rabiem
℞ fol rutæ, verbenæ salviæ min plantag
polipod absinth vulg menthæ artemisiæ,
melissophyl betonicæ hyperici et centaur min
p. æq. legantur singula quo tempore virib
pollent maximis circa junii plenilunium
cælo sereno, purpuracei cumulum siccentur
seorsim in loco ad quem neq sol neq pluvia
pertingat. quotannis renoventur
pulvis a ʒß ad ʒi dermosi quotidie exhibeatur
cum duplo sacchari jejuno ventr. ʒ^bis^ aut exhibent
non nulli per 9 dies et ad 15 cum pul visi ℥ß
in vin alb generos interim vulnus sicci
linteis exsiccatum vino aut hydromelite in
quo superaddit pulv ʒi solut bis terve quotidie
foveatur. extus vulneraria contra furfuraceam
et crustosam capitis scabiem præstans decoct
Cepa vulgaris flor. b et tunicis candid
vel purpur. oignon coquunt incidunt
attenuant detergunt urinas et menses
movent sed nihil aut parum nutrimenti
suppeditant. succi sunt pravi. flatus gignunt
majori esu capitis dolores invehunt
sitim pariunt, oculis nocere dicuntur

 venerem irritant, inguinem inflammant
et visionem nocent.
cum melle coctae asthmati et pulm affect
a pituita crassa conveniunt
succ bulbi et folior ad ℥vi cum saccharo
epot commendatur velut diuret praestans
in urin supp et hydrope. cepa et allium
rustic est theriaca in peste et mbis contagiosis
quidam cepam excavatam theriaca replent
sub cineribus coquunt in peste
eadem tusa cataplasmatis ritu pestilentes
bubones attrahit emollit et aperit.
cum sale contusa ambustas sanare dicunt modo
cut epidermide prorsus non sit spoliata
ad alopeciam commendatur
contritis cepis loca denudata capillis
saepe fricans poteris capitis reparare decorem
mane et vesperi capitis confricatur dum
prorsus rubescat mox melle oblinitur
ad cephalaeam per medium incis et in sp
vin macer supra ptem dolentem prodest
succus cum ℥ mixtus ad gutt in auris instill
in auditus difficul
cepa alba sub cin. assat et cum butyro insulso
inform cataplasm hemorrhoid dolorem sedat
suppositoria ex cepa haemorroid aperiunt

Cepa Ascalonica echalote
eadem praestant quae caeterae cepar[um] genera
Cerasus sativa fructu rotundo
rubro et acido. cerisier liquor expressus et rite
fermentatus vinosum praebet liquorem non
ingratum licet non admodum spirituosum
ob magnam phlegmatis copiam
Cerasus sativa fructu majore griottier
acida corpori succum alibilem tenuem sed
laudabilem suppeditant sitim sedant humor[es]
bilios[os] fervid[os] contemperant et jecoris infarctus
tollunt. febricitantib[us] utilia. matura
ventrem subducunt, viridia diarrheam excitant
siccata sistunt.
succus aq[ua] dilutus et saccharo edulcoratus
potum praebet dieb[us] aestivis refrigerans
febricitantib[us] util. cocta cum tantillo sacchari
perjucunda sanis et aegrotantib[us]. majori
saccharo condita inter praestant. dulciaria
ventricul[um] roborant
si cum carne nuclei contusi fermentaverint
vis lithontriptica his vinis tribuitur
nucleis vis diuretica cal[culi]s emulsiones praeparant
ad renes ab arenulis liberando
fol[ia] cerasi in lacte cocta, contemperant et sedant in inter[...]

gummi ex arboribus distill ad eadem valet ac gummi arabic insuper usi lithontript urinae ardores demulcet

Cerasus major fructu magno cordato bigarrotier. ut plur. vermibus scatent et facile putrescunt ventriculo difficile coquuntur viscidos humores et putrefactioni obnoxios generant

Cerasus fructu aquoso quique priori non adeo ventriculum gravant quam mox dicta

Cerasus major silvestris fructu modici nigro colore inficiente.

in morbi capiti epilepsia apoplex paralysi recentes comedendi vel aq distill vel aq ferment ex iid. in balbutie et loquelae vitiis ad motus convulsivos infantium

℞ cerasor nigror. aq fl. tiliae a ℥iii pulv de gutteta ʒß m. f. pot exhibeatur cochleari i singulis bihoriis in convuls infant. epilepsia paralysi

Ceterac sive asplenium scolopendr humores acres demulcet mucagine sua astrictione partes roborat unde pectorale apice in liene tumido.

aurei illius pulveris in inversa folior ℥i
cum alb sacini farin ʒß ex suc portul
aut plantag. gonorrhea laborantes curare

Cherophyllum sativum

cerfeuil. est suaveolens ori et ventric gratum
incidit attenuat aperit urinam movet
menses evocat calculos pellit obstruct
recludit cutaneos affect medat, chymicè
spatulati. grumos sanguini ex ictu collec
resolv tam intra quam exter.
succus levi ebull defæc ad ℥iii 3a quaque
hora iterando. decoct ad ℥vi. infuso
in vino. succ cum nitro et syr de 5e rad
quarta quaq hora assidue sumptum in
hydropisi qualibet maxime proficuum
expertum, diureticum est blandum. hoc
indicato si hydropis non cuiusv via alio
attri sale suo nitroso iisdem vitiis obnoxium
ac nitrum sed quidem ex diuturniori usu tussim
creabat. itaq non tussientib
contra vertig. commend, et febres intermit
succ ad ℥vi post paroxism ad sudorem
etiam in pleuritide. decoct cum aq. vit. instill
inflam et vitia cutis erisipel demulcet

310. ℞ cherephol recenter coll m. vi. carn vitul taleolat. sect ℔ i strat super strat dispon in olla add sal prunel ℥ i olla obturata bulliat in cacabo aqua repleto per hor 4 aut 5ᵗ. tunc succ exprim et ad ℥ vi propin 1ᵃ quaque hora in hydrope
℞ succ cherefol defæc ℥ xii pondere nitr purif ℨ ß syr de 5ᵉ rad ap ℥ ii divid in 4ᵒʳ doses 1ᵃ quaque hora in hydrop

Chamædrys minor repens
humores crassos et tenaces incidit atten. laxiorum solider. tonum firmat. urina et sud. movet. in viscer obstr. iteru mensium suppress. febrib continuat hydrope incipient scorbuto et arthritide infus instar the a p. ℥ ii aut ii in morbi chronicis et viscer obstr. pulv ℨ i extract ℨ i
℞ chamædr centaur min pulv a ℨ ß infund per noct in sin gener cyatho vino hauriat æger ante paroxismum in febr. inter

Chamæmelum vulgare
chamæ fœtidum. marouste

utriusq sum. et fol digerant laxant mollient, flatus discutiunt dolores mitigant nervosis ptib utilissim. romanum sive vedelem potentius calefacit. fl. pul a ℥ß ad ℥i succ depec ad ℥iii infus vel decoct aq aut vin ad ℥vi - et multarum prae aliis antipas mod. commendat. in nephretide, doloribus gravidarum. tormin. post partum.
in pleuritide ejus aq distil. ad dolorem dimit et decoct calid in vesica supra latus in cardialgia praedictis. et adversus calculum febrifug. et ad scrophul.
℞ decoct chamae ℥vi syr menth ℥i sp. car min syl ℥ß ii. f. julep in colica flatul
℞ flor chamae pulv ℈i diaph min, sal absinth a ℈ß m. f. pul 6a quaq hora iterandum per 3dum aut 4dum in intermitt febr.
exter. in catapl. emoll resolv. et demulcent in clyster ad intest. in dolor.
ad duritiem mamm ex lactis coag. decoct pars lavetur 6: die et super pon catapl ex sum chamaem, fol emollie mamm et sem lini coctis et axungiae permixt
ol. duplex 1o vulgatis qd per infus 2o qd per distil coloris caerulei eleganti

, in emollit dolores sedat. 2° calidū
℞ rad. alth calam arom a ℥ii fol mal
colocinth pulegy summit aneth flor chame
et melil a m I f decoct in aq q. s. ad ℔ii
add vin alb ℔i colatura foveat abdom
cum linteis vel pannis laneis vel spongiis
mutati quoties refrixerint aut vesicis semi
plenis in colic dolor praesertim flatul
℞ ol chamae ℥ii ung alth ℥i f lin. in pleuritid

chamaepitys lutea vulgaris sive
folio trifido ivette. moschata folii semi.
ivette musquee paulo plus oleo essentiali
continet quam prior. apra vulner cephal
bryskia et nervin in catharrialib dolor
rhum ischiad, artium tremore et paralysi
pulv ad ℥i. pil mathiol ad paralysin si
℞ chamaedr betin stoech flor rosis mar
a ℥i turpeth ℥iß agar ℥ii colocint ℥ß
℥ih Zib sal gem a gr X rhabarb ℥iß
spic indi gr xii pul hierae sim ℥ß
diacrid ℥i omnia chamaepitis succo
excipiantur et dn mass. e quib ℈i ante
cubitum
℞ chamaed. et chamaep a m I sum centaur m.
mß coq in aq ℔iii dos ad ℥iiii qrata dic
in arthritic

Chelidonium majus eclaire felongue. intus aperit urinas et sudores movet cachexiae hydropisi ictero praecipue febrifug.. rad sicc pul a ℥ß ad ℥i recent: ℥i infus in vin ℔ii. succi crocei guttae iii aut iiii in vino aut alio vehicul
inmaculat cit sudor in febr malign
rad. nimia dosi horrenda inducit sympt
℞ fol chelid: maj ℔i cremor tart ℥i macer-
in sero lactis ℥vi colat dilue syr de cich
c. rheo ℥i f.p. mane jejuno in ictero et mensium supp.
℞ chelid ma. urtic urent aristol rotund
a ℥iii rad gent ℥iß sum absinth rom
et scord a miß sem aquil et cardui b. contus
a ℥iß fl hyper et centaur mi. a p i croci
martis ap nodul chelid ℥ß sal tartar ℥i
coq per sem hor in ℔iii aq. com ad medium
colat divid in 4or dos mane et sero exh
in ictero.
exte vulnera vetustiora et ulcera abstergit
fol contus seu pulvere inspers aut succo
in cataplasm adh herpetem miliarem
in affectib oculor succus luteus ex emplo
caule sed admodum acris ita diluendus
radix corticis et in vino infus cum grosulis et sinal. croco martis
in ictero. radix in ore dolorem dentium mitigat. succus
... impetiginib scabie

 in nubeculis et suffusione at non ultra magnitud capitis aciculae singulis vicib impon propter acredinem
planta contus imponit plantis pedum oedematosis et ictero ex febrib inter aut chroni
Chelidonium minus ranunculus vernus rotundi folius minoris. petite scrophulaire
inter pro anticorbut. fol recent in acetariis comedunt vel infus vino vel condit sacchar
ex rad recent cum butyro fit unguent ad hemorrhoid. succ rad per nares attract caput expurgat
Cicer sativum flore candido.
cicer florib et semin ex purpura rubescent pois chiches ou becus flatulo copiosi nutrim sed crass, menses movet et lochias
℞ cicer rubr ℥I carn vitul ℔ß coq in s.q. aq. com. f. juscul in urinae suppressione vel ad muccum et arenulas e vesica expell
externe cicer rubr resolv atten. emollit
Cichorium silvestr. in acetariis cum oleo sale et aceto aut cum sacharo et succo aurant aut citrior.
in febr. intermitt. succus ad ℥IV ante paroxism, morbum eliminat parvo tempore

resolvit abstergit temperat attenuat
solida roborat secretiones omnes movet
elegantiorem faciei colorem reddit, calidam
viscerum temperat intemperiem. in chei
pient. obstru. ictero cachexia sive fol
crudi tortid sive succ ad ℥iiii aq still
aut decoct ad ℥vi sive fol sicc. pul
ad ʒi. coctionem juvat; amarore lixivia
fibras firmat. febrifug. in febre hectica
in febrib inflam. succus defaecatus
inter juscul tertia quaq hora ad ℥iiii
solus vel cum succ. borrag. cheref. fol syr
violar vel alio. fol pulv ʒi bis in die
podagram biliosam levat, et ad verru
hypocondr
℞ succ depur cichor sil ℥iiii tinct
mart ℥ß syr de 5e r ad aper ℥ß
f. pot bis terve die iter in cachexia et obstru
℞ extract cichor sil ʒii extrac gentian
centaur min fumar marrub cochl.
prevuvi et arabar, croci marti ap
et cremor tartari a ʒi sal martii rivarii
ʒi syr abrint q.s. m f. elect dos ʒi
bis terve in cachexia melane mensium suppres

 Cicuta major. ingratum spirat
odorem. intus venenum est, sed cicutam
cicutae antidota, acetum absinthium
daucus gentiana urtica
exter. ejus succ vel contus aut decoct
mammarum incrementum coercet, duras
et parvas reddit sed prudenter appli
fol in lacte coct ad dolorem podagri
et haemorrhoid. cum cochleis et fur
resol adversus hydrocel et ischiadicam.
scirrhos strumas grum emollit,
℞ fol cicut m II contund cum limacib
terrest № IV ins pur in resol ℥II fiat
in tumorib testium vel mammar
emplastr de cicuta ad strumas et sim
tumores duros et lien et hepat scirrh
cum oleo meliss

Cinara hortensis folio non
aculeatis artichaut Cinara spinosa
cujus pediculi editantur. Cardons
dum tenera cum sale et pipere edunt
grata stomacho. ubi grandiores coquunt
rejecta duriori parte et lanugine, et
cum butyro liquato aromatis aceto et vinum

vel ex pingui carnium jure elixa vel per frustul in sartagine frixa addito sale et petroselino vel ex oleo et aceto supra cineres cocta. quocunq modo parata parum nutrit succi est crassi flatulenti
folior costae et caules teneri et candidi difficilis coctioni si butyro saturentur
rad. urinas provocant potenter.

Citreum et Limon citron

citreor cortex exterior propter duritiem in ventriculo difficile concoquitur quem admodum et interior.
commendantur integra contra febres malignas et pestilentiales, insigni donant antiscorbutica virtute. equidem solo succo citrei vel malor citreor aqu scorbutici etiam gravissimi sanantur. cor gengivae exulceratae saepius collutae citrisione abstergunt
in febrib ardentib ad sitim extinguendam succus cum saccharo aqua dilutus
praeterea diureticus est arenulas pellit
in peste ad contagium arcendum solum vel cum caryophyllis manu assidue gestatur
cortex exterior flavescens odoratus vesiculis oleo essentiali plenis amarus venti [illegible]

vermes necat. v.i cardiaca et alexi-
siacata; cum purgantib mixta ad
vehementiam temperandam
africat cortex frustulo sacchari donec
flavescat et servat ad us in vas clauso
syr tum ex succo acido tum ex cortice
ex succo refrigerat ex cortice cordial
Sem alexipharmac, vermes necant
menses movent flatus discutiunt
adversitas tu in pleuritid peripneum
haemopht intestin inflam dysenteria
plurimum nocere tussim provocant
acida et intesti tormina pariunt
℞ fol or ʒiiß mann calab ℥ii sal
veget ʒiß liquir ras et contus ʒi
coriand ʒß fol pimpin m ii malum
citreum i taleolatim sect. affund aq
bull ℔ ii macer per noct colat
Laxans dividat in 4 or dose 4a quaque hora
℞ rad raph rustic recent ℥ii fol cochle
p.s nasturt aquat M vi liquir ras et contus
ʒß dimid citri cum cortic sin alb et aq com
℔ i macer frigid 24 horas agit. pro
potu ordinario in scorbuto

℞ syr cochle syr vin a ℥i succ cit ℥ii aq nasturt ℥iii f. garg. in scorbut.
℞ conser cochlear ℥ii conser Cupulae ℥i pulv ari comp ʒvi syr e succ acido citri q.s. f. elect. de quo terdie magnit nuci moschatae in scorbuto
observand in julep cardiac et diaphor stibii jone par diaph cum acido citri non esse miscend ne emetica fiant parit. ac in emulsionib non miscend quia Coagulant
Limon a citro disting fructu min cortice carnoso seu inter. tenuiore copiosori pulpa uberiore succo, citreis acidiora valent ad eosdem usus
Citrullus angurie . gl. citrouille
caro nutrimenti parum sanguinem reddit aquosum inflammationes mitigat, biti ardori et fervorem demulcet. ex ejus pulpae ad mixta farina panis conficitur qui flavescit refrigerat sapit suaviter
sem refriger urinae ardorem demulc cum purgantib admiscenti ad vehementiam retundendam.

 ui ex sem. express cutim emollit et vitia delet

℞ 4 sem frigid maj ℥ß sem card ben ℥1 decoct scors vel aq ulmar scab aut bugl ℥xii f. emul dilue syr caryoph hort vel syr flavedini citri ℥1 pro 2do vini cuiq add. fit diaph min aut ar xv aut confe alker ℥ß in febrib malig et pestilent

℞ 4 frig maj ℥1 coctus insuant in ventre pulli gallin et coq in aq it illa dr aqua pullati dr qua aegrotis propinab ita, simul in febr ~~internit~~

Cochlearia foliis subrotundo herba aux cultus incidit attenuat imprimis scorbuto. coctione ejus ptes volatiles evanescunt itaq succ aut infus cerevisiae vino vel aq. siccata nil vel parum habet virtutis. Licet scorbuto proficiat non omnib ut hu iam illi qui phlogosi vasae rubor faciei palpit. cordis hypercatharsi, cephalalgiis, aes in non conveniunt nisi cum acetosa Becabunga vel lacte vel sero lactis aut vino propinatur ut frenetur acrimonia volatilis

junctione pro variis scorbut varias classes. temperantia phleg. acriora sic cochlear nasturt. raphan armoracia sinap cepas allium. melancholicis amara sal beccabung fumar tarax fol fibrin chelid min cichor chaerophil. Sanguineo cho lericis acida acetosa oxytriphyll succus citri limon. ribium berber sed plurimi scriptores acida sociare amant cochleariae conditae citreor. etiam pulpam jungunt cochlear et acetos

℞ rad raph rustic scrophul min helenii acetosae a ℥ß fol fum beccabung nastur aquat a m i summit pini et abietis fl centaur min et genist a p i sem erucae et aquileg baccar junip contus a ℥i coq in aq com lb vi ad v add sub fin fol sempervivi min p ii cochlear m i apozem colat. dos ℥vi cum syr lim ℥ß quater die in scorbut

in oris affectib inflam gingiv exulcer dentium vacillation cochlear succus tamen centaurum quod applicetur gingivis. succo fit adjung alum ustum in exesis gingivis

succus cum herba contusa imposita faciei maculas intra breve spatium tollit, postea decocto furfur. ad abluend.

Colchicum est venenatum

iis qui bulbum comederunt auxilium ferendum, per vomitum per clyster ex decoct. fol. et rad. altheae sem. lin dein lac magna copia propin.

externe ad verrucas aur. amuletum praestans in intbis pestilent. et contagios.

Consolida symphitum majus grande consoude ou cillé d'âne.

crassiore mucagine pollet quam althea vulner. antidysent. antihaemopt. astringit consolidat incrassat egreg. temperat serum salsum et acre pulvis radicis ad ʒi infus. vel decoct. ad ℥i decoct. medio... ne mucilaginosum fiat

℞ rad. symphit. ma. tabul. sec. ℥i cons. rosae ℥ß liquir. ras. et contus. ʒi coq. in aq. font. ℔iii f. pt. in haemopt.

℞ pulmon. vitul. ½ cons. cochlear. II rad. symph. maj. ℥II fol. urti. urent. plant. a m̃ coq. f. jusc. dur. in sputo cruento

℞ pul rad symph maj terrae jap a
ʒi succ ??? mastic pulv a ʒß syr coral
q s. f. op. dos ʒi ter in dic
℞ rad consol maj ʒi rad tormant bistor
a ʒß fol pyrol alchymil et sanic a
m I coq in aq chalybeat q. s. colat
add ol hyper ʒi f. enem antidisenter
cortex vulnera consolidat fractum oss
herniis luxationi ad dolores podagrae
℞ sem nastur hort ʒß quin carvum
invicq ex rad symph a ʒi f cataps
ad hernias
℞ rad symph maj ʒiiii fol plantag
in xii contus exprimatur succ cui add
sacch ponderis aequale f. syr. s.a. pro
haemoptoicis

Coriandrum majus, ejus
odor dum recens gravis succedit postea
suavis, stomachic et carminat sed recens
nocet, habet aliquid astrictionis in herniis
flatulent, contra vermes
℞ sem cor ʒß anis foenic a ʒ nuc mosch ʒß
cinnam ʒi piper long ʒ sacch alb ʒ in f
pulv post pastum ʒi ad coctionem et colicos

324 Cornus hortensis mas corna refrigerant exsiccant astringunt in alvi profluvia mensium et haemorrhoi. immoderationem. sed praestat succum e fructib. cum saccharo in cydoniatis con sistentiam coquere, tum acidulo sapore palato blanditur. fiunt sic et jul. ad ʒi. vinum quoq astringens paratur cum fructus contusi ℔ x vini rubri ℔ centum aq ferratae ℔ xii simul fermentatis corna frigido ventriculo nocent et eius cruditates augent.
corna sicca trita cum oleo mirtino vel omphacino mixta in emplast. formam ad vomitus ventriculo impos. contra fluxum alvi et menses immoderatos precium admodum

Corylus sativa fructu albo minore sive vulgaris. sativa fructu rotundo maximo avelinas, alimentum copiosius praebent quam juglandes sed crassum recentes et magna humiditate donatae in ventriculo non coquuntur asservatae salubriores sunt.
ex his lac exprimitur tussientibus et dysen teriis profici. proscum est astringens
post cibum stomacho infest. nec incongruenter nullam ℔ in mort. cont. et in vin. alb. infus. in hydrops.
ejus ligum in epilepsi praeservatum anguis quere dos ad ʒi
testae in pulvere in dysent

Cotonea malus. cydonia fructu oblongo laeviori coigniers 2 fructu breviore et rotundiore. 3 angustifolia vulgaris cocta comeduntur. astringunt valide vomitus arcent alvi profluvia sistunt fluore mensium et hemorrhoid immoder utilia venenorum vires frangere dicuntur aliqui in veru assant et testarum carnium succo irrorant,
ex his fructib tusis express et cum melle fermentatis fit vinum melites et cydonites vel frustul secta in dolium vino repletum conjiciunt, ex iis pulpa cum saccharo cocta fit marmelata
sem aq. macer mucaginem praebent quae lenit et humor acrim. demulcet in sq[?] sput cum aq rosa ad linguae ariditatem in febr ardent clarit pulmon
℞ mucilag sem cydon et sem psillii extrac cum aq rosar a ℥ii album ovi dilutissim agitat et aq plantag a ℥i camphorae gr iii collyrium in ophthalmia mammarum [?] ambustis

Cruciata hirsuta. inter vulner siccat astringit

Cucumis sativus vulgaris maturo
fructu sublutco concombre exiguum et
aquosum corpori praebent nutrimentum
crudi difficile coquunt in ventriculo
viscido succo fibras laxant.
virides et parum ventricosi vulgo cornichon
nullo modo coquunt et saepe laedunt
cucumeres facile in ventriculo corrumpuntur
inde febres contumaces
cocti melius quam ullo alio modo conduunt
cum aromatis
exter. caro cucum capiti appli. in phrenesi
Sem inter sem 4 frigid minus hi refrigerant
quam fructus aperit demulcet in amuls inplenitis ...
Cucumis silvestris asininus dictus
tota planta catharsim movet, radix sed
cathar. major quam fol. minor quam fructum
succus elaterion dic. a gr vi ad xxx
veteres dabant nunc a gr ß ad gr ii in
anasarca modo non adsit febris, in ascite
rad. dos. a gr xv ad ℈ß in pulv
℞ rad cucum asini pul ℈ß vini hispani
℥xii macera per biduum per tres dies
vinum hoc propinetur in hydrope
valerius ex pesso in utero fructu foetum
mortuum expellit sed vivum enecat

extr. succi in tumorib durit. emoll. et scirrhis discutiend uti et strumas et scroph resolvendis. idem fol. inform cataplas

Cucurbita longa foliis molli flore albo courge calebasse. frigid humid exiguum praebet alimentu stomach relaxat et bibendi desiderium restinguit ideo calidis utilis et frigidis noxia. cucumis melo cucurbita et citrullus affines sb non virib differunt. fol. mammae lac dimi;

Cuminum. foeniculum orientale sem coction. juvat flatus discutit unde utiliter pane incoquitur et caseis inditur utile in colica flatulenta tympanite et vertigine a pravu digestione

℞ sem. cumin cont. q. L. sacculi inscl. irror cum vin calido aut aq vit. et ventriculo flatib distento et abdomini cont. tormina

Cupressus meta in fastigium convoluta quae femina plinii. ramos extra se spargens quae mas

cupressi fructus seu galbuli astringentes in dysent. alvi flux. febrifug. pulv ad ʒi haemorr. gonorrhaeae juvat in vin macer in febr. intermitt 4ᵃ quaque hora iterando

utiles rami inter vestiment ad vermes arcend

Cuscuta major goute de lin minor. epithim. cuscuta proprie est quae lino adhaeret. sunt aliae ut epitavendul epi marrub ob iis vires mutuant in obstruct lienis & hepatis ictero scabie a gr i ad ii vel gr iii desiccat subastring. et aperit ℞ epithy gr iii ℥. capill m i inf. per noctem supra cinere calid in colat ℥vi dissol orhubt rhabar & syr de pom c ℥i

℞ epithim gr iii corhi cappar et fraxin a ℥ß fol marrub melis a m i coq. in aq com q. s. colat dissol tart chalyb solut ℥vi f. apoze pro 3 dosib in chloros et obstrum aq [illegible] rubiin

Cyanus segetum flore coeruleo bluet aubifoin blaveole perole bleuean casselunette. hujus virtus incerta.

℞ flor cyani cum propriis calycib contus q. s. cum nivis vel aq nivis q. s. macerat 24 hor dein distill et aq servetur ad oculos pluries abluendos

pulvis ex flor una cum cap. ℔ ad ℥i in vino adversus morbum regium

Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascente pain de pourceau radix recens valde acris siccata nullo modo

inter purg. vehementiora plebei ejus
rad. pul ad ℥i in decoct ℥ß aromaticis
stomachicis corrigitr et azaro. diacridio
et cremore tartari stimulat.
ente incidit resolvit, contus rad scirrhos
tumor strumis lienibus duris. succus abdom
aq hydropicor per alvum subducit menses
movet fœtum expellit vermes enecat.
ex illo succo confecto unguent de arthanita
celeberrim ad scirrhos lienis emolliendos

Cynoglossum majus vulgaris
langue de chien. vi narcotica et anodina
pollet qua ratione ad catharros præterea
quædam astrictio sistendis alvi proflu
fluori albo gonorrheæ et hæmorragiis
rad. ad ℥i fol ad m i in catharris tussi
diarrheis dysenteria hæmorrag
℞ fol cynogl m iiii hyssop capill
ven tussil a m i rad glycirrh ℥ii oriz
℥i coq in aq com ℔ vi ad ℔ iiii sub fin
add mel narb ℥ii f apo pa cyath in transferium
externe tumores emollit ad sulu et ulcer
conducit
pilul de cynogl proest ad catharros tenues sistens
tusses ferin sedand epilept pueror, somnum concil
et ad omnes dolores dos a gr iiii ad x

Daucus creticus. myrrhis annua semine striato villoso incana daucu, de candie vulgaris. chyronis carotte sauvage carminativa diuretic humores crassos attenuant incidunt flatus discutiunt obstructiones aper menses et urinas movent. sem in usu. ℥ii vino alb infus in singultu radix primo vere comeditur aperit
fol vulnerario sudorifica.

Dens leonis sive taraxacum latiore folio pissenlit. hepatis et viscerum obstruct aperit urinas movet vulnerar. ad febrit infus vel decoct ad ℥iiii succus ad ℥iii in pleuritide inflammation cum febr acutis, in cutaneis affect ad ℥iiii ter die morbo regio auxiliat.
exter succus in affect ocular oculis instill pro delendis maculis nebulis albuginib
fol teneriora in acetariis comeduntur ventri roborant appetitum excitant alvum nimis fluentem sistunt urinas provocant.

Digitalis purpurea. gants de notre dame violenter admodum purgat et vomitiones immanes excitat.
externe cum butyr majali in unguent in scrophulis humidis et ulceribus praestan

Dipsacus sativus chardon a bonnetier
scrophulas sanare dr. omni putredini
resistit. rad et fol in usu coctus in vino purgat per urin
ut asparag. phtisicis quodammodo desperatis
mire proficua radix cttusa et melle excepta
aq. quae in fol concavo reperitur caliginem
et rubenti oculi maculas faciei emendat

Dracunculus polyphillus
serpentaire rad. et fol in usu. rad et fol
ari vires obtinent paulo validiores rad. pul
3i. fol venenator animalium morsibus impos
venenum extrahunt et sanant

Dracunculus pratensis. ptarmica
vulgaris folio longo serrato flore albo i.v.h
herbe a eternuer rad et fol in us
pulvis plantae sicc sternutamenta movet
rad commansa caput purgat et dentium
dolores mulcet pituitam eliciendo
aliqui lactucis addunt ejus folia in acetariis
veluti eruca et draco

Dracunculus esculentus. abrotanum
lini folio acriori et odorato Estragon
insigni acrimonia praedita est, valenter
incidit aperit digerit flatu dissip urinam
et menses ciet mansam pituitam ducit instar
pyrethi dentium dolores mulcet et cerebrum purgat.

 frequentiori usui in acetariis ad coctis
alias herbas. frigidit et cruditatem
aq stillat ad pestis contagia

Dulcamara solanum scandens
morelle fructus magis refrigerant
et repercutiunt fol magis resolvunt et
abstergunt.
intus ad hepatis obstru resolvend
urinam ciet. parkinsonius dicit violente
purgare
ext ut anodino resolvente plurimum
valet. contus et cataplasm forma mam
mārum dolores mitigat emollit atq
dissolvit gemmescens Cas. succo fucis maculas

Ebulus sambucus humilis yeble
per alvum purgat valide, praecipue in
radicis cortex, alii sumunt medianum
stipitis corticem. baccae et semina minus
purgant. turiones et folia mitiora censent
radicis substa lignea interior astringens
astringit, ideo in fluore albo et nimium
mensium fluxu. cortex hic purgat
cum tormin et molestia
succus e radice vel e mediano stipitis cortice
valide purgat ad ℥i

sem in pul ad ℥i infus ʒß in vino alb hydropici, vel sem ʒvi contus in aq flor parict emulsio hydrugoy
flores ebuli sicut sambuci interne sudores moveant.
folia coct in cataspl ad podagr dolores contusa ambustæ parti eam persanant cortex radii potenter discutit emollit unde in inflamm et erisipelate ad tumores pedum oedematosos, dolores podag rheumat fotus fol ebul tanacet salviæ in aq vel vino coct
℞ cort rad ebul ℥ii bacch junip ℥i flor sambu p i macer in siq l. colaturæ dch ad aquas per alvum et urin educ
℞ fol ebul recent ℔ii contund et indu cum butyr majalis ℔i coq ad herbæ siccit f. colat et unguentum erit efficaciss ad tumores resolvendos arthritic

Elatine et veronica femina off
linaria segetum nummulariæ folio villoso vilosto ou veronique femelle
summe vulneraria temperans et detergens aperit et resolvit infus decoct vel aq still ad ℥iiii succus ad ℥iii bis terve die

 Laudatur in cancro podagra impetig
lepra hydrope scrophulis. exhibet ad ℥i
externe et succus effusus ulcera cancrosa
sordida abstergit cohibet et sanat.
℞ elatines floridae q. v. contund et mace
per 24 hor in vin alb q. s ut herba
tegatr tum fiat colatura cum forti
expressione coq ad 3^as a fund adip porcin
q s f unguent. ad ulcera haemorrhois
scrophul cunctaq cutis vitia
Endivia sive intybus. cichorium
lat folium chicoree blanche
cichorium angustifol. petite endive
cichorium crispum. cichoree frisee
septem aut octobr colligatis fol et terra
obruta nivis instar fit candida
folia dealbata teneriora sunt et palato
magis sapida virentibus.
endiviae oes refrigerant abstergunt
aperiunt sale suo nitroso ammoniacali
phlegmate diluto sanguinis fervorem
sedant biliosorum humorum orgasmum
compescunt ictersum sanant. febrib
biliosis ardentib inflam haemorragiis
medentr succus depur ad ℥iiii saepius die
sem inter 4 frigid. min

℞ rad gram: fragar et aspar a ℥i
fol cichor silv cum toto fol endiviæ volg
scariol pimpin agrim a m i coq in
aq ℔iii ad ii dilue sal amar cathar ʒß
syr de pom simpl ℥i f apozem ad bilem
crass incid in ictero et obstru per cyathos

℞ rad cichor et nenuph a ℥i folior
endivi scariol Bugl borrag lact et portul
a m i sem melon citrull endiv et alth
a ʒi passul jujub a ℥i ordei mundat
p i coq in aq ℔iiii ad iii f apoz ad
pituitam tenuem et salsam in catarrhis demulc

℞ pull gallinac exenter excorticatum
pedibus et capite resectis coq in aq ℔vi
ad ℔iiii sub fin add fol intyb utriusq
cich sylves cherefol Borrag Bugl lactu
pimpin et agrim a m i per cyathos
calens propinat 3a qque hora ad refrig
in febrib bilios et humor ustum compescend

℞ fol intyb utriusq lact cichor silv
borrag buglos acetos rotund scolop
fumar agrim a m i contud affund
sensim seri lactis ℔ii f colatura cum
expressione forti colatur defæcatu dissol
syr cichor sim ℥ii f serum medicatum
refrigerans et aperiens

336 Enula campana. aster omnium maximus helenium dictus, radix acris et amaricans aromatica non nihil glutinosa. siccata gratum spirat odorem. bechica est stomachica diuretica uterina aperiens alexipharmac. et sudorifera. prodest in respirandi diffic. asthmate humidum incidendo et attenuando crassos humores. phthisicor. ulcera pulmon. abstergit in jusculis, ad ℨI pulvere ad ℨIß extract ad ℨ,

Enula campana reddit praecordia sana

valet ad venena hominum et bruta data ovibus cum vino aut aceto eas servat et sanat a peste quadam cui et obnoxiae quam vulgo clavelatum vinum parat enulatum dictum sud. movet et urinas nephritid. utile ejusdem vini haustu jejuno visum acuit his qui usi sunt mercurio nimio decoct helenii et feniculi.

vino decoct vel infus vel succus lumbricos enecat

exter resolvit et abstergit in radic

℞ helen. cardan. fænicul a ℥i ß ex aq
com decoct ad ℔ii contra tremores ortum
ex mercurialib halitib
℞ resin helen ℥ii thereb venet ℥iii ol
hyper ℥iiß myrrh sang drac a ℥i. m
f bals quo inung pudendor rupturæ post
partum
℞ rad enul camp et lapath silv a m i
incid et coq in aq com ℔iii ad ℔i.
colat. lavent partes scabie affectæ vel alio
℞ earundem radic pulpæ per setaceum
traject ℥v axungiæ porc ℔ß flor sulph
℥ii. f ung. in scab

Equisetum sive hippuris
palustre longioribus setis. arvense
longioribus setis hæc viribus præstantior
astringit valide pulv ʒi. aut decoct ℥iiii
in vino mane et vespere vel succ ad ℥ii
sistit hæmorragias quascunq. in febrib
malign. gonhorreæ conducit
extus foliis tritis vulnera glutinantur etiam
ubi nervi caedunt.

Eruca latifolia alba sativa roquette
silvestris tenuifolia perennis flore luteo
sativa debilior. diversæ prorsus est a lactucæ
naturæ id circo in cibis sociare solebant veteres

338 Martialis
et venerem revocans eruca morantem
columella
excitat ad venerem tardos eruca maritos
ovidius
nec minus erucas jubeo vitare salaces
coctionem juvat saburram dissolvit. urin
provocant. at biliosis non convenit.
in scorbuto et chronicis conducit. levi
coctione indiget
℞ pulv stomach querc[?] ʒii sem. cochl
nastur erucae a ʒi aloes socoto myrrh
elect a ℈ii m. f. pulvis dos ʒi bis
die cum conserva lujulae vel syr citri
in scorbut vel conser flor anthos in
apoplex et paralysi.
sem, ad praecavend a apoplex. ad gr XX
quotidie mane
fol decoct cum sacch tussim infant sanat
℞ sem eruc, sinap baccae junip a p. aeq
contus aff ♀ camphor. ad supereminent
1 digiti liquorem decanta quo foveat
pars paralytica et massa super imponat
Eryngium chardon roland. urent let
paniant. humores crassos et tenaces
incidit ictero medet. diuret menses pro
vocat. vis potior in radice vel in ejus
cortice radicis qui non facile in pulverem

reddi pt nisi exsiccatus sed tunc omni
virtute fere orbatur. hinc in decocto
recens ad ℥i pro aq ℔i aperit diuret utero
veneris blandum et incentivum sed semini
praeferunt. rad melle aut sacch condita
in gonnorh maxime conferunt.
cataplasmat modo rad. senti ad abortum
praecavendum. in nimio menstruor fluxu
℞ rad eryngii et lapath acut a ℥ii fol
agrim et veron a m i coq in aq. com
℔ iiii ad medias col. dilue syr 5c rad
ap ℥ii arcan dupl ʒii f apoz a agrec
in 4or dos
℞ rad eryngii vulg et gram a ℥i coq
in aq com ℔iii ad ii f apt. ap
℞ rad eryng onomid a ℥iß coq in aq ℔iii
colat contund sem eryngii et melon a ℥ß
f emulsio diuretica dissol syr de ibisco ℥i
Eryngium maritimum, inferior priori
Erysimum vulgari velar ou
tortelle. tenuibus volatilib et acribus
suis particulis crassum bronchiorum mucum
incidit resolvit et abstergit per expector
evacuando. in asthmate tussi chronica
raucedine aphonia a materia crassa

 fit ex ejus succo cum melle. syr dos ℥i
qui viribus pollet eximiis syrop de chanti
in colicis. in vino infus efficacius adhuc
non longa coctione indiget
ut antiscorbutica instructur.

Esula tithymalus cyparissias
petite esule

Esula lactescit sine lacte linaria crescit
tithymalus foliis pini fol. dioscoridis pithyusa
violenter per inferiora purgant imprimis
lacteus succus. cortex radicis corrigi solet
aceto vel succo cydon tunc pulvis ad ℈i
℞ rad esul cortic pp ℈i cremor tartar
℈ß oleo sacch citri vel absinth ℈ß pulv
cass recentis vel conser flo aurant q. s. f.
bol hydragog. cavend. pro delicatis. ...
aliqui fol ℥ii coquunt in lacte et colatum
propinant ad serum educendum.
sem esulae N° x aut xii vehementem
catharsim movent: rusticis tantum utilis

Eupatorium cannabinum
hepaticum aperiens et vulnerarium
in cachexia asthmatis et tussi medetur, urinam
et suppressa menstra provocat cutis vitia
emendat. fol et summit ad m i in seri
lactis vel aq. com ℔i levi ebullitione

febrib intermitt cum ægri ad inatost.
fiunt et ad hydropem proclives, nec non
etiam in hydrope ascite post paracentesim
eodem tpore œdematosi pedes herbæ decocto
ex vino fovendi sunt addito santalum
camphoræ. succ foliorum ad ℥iii extract ʒi
ad scabiem cum fumaria sociatur
℞ fol et summit cupat Cannab m ii fumar
m i coq leviter in seri lactis ℔ii per
cyathos crebris intervallis in hydrope
incipiente et cutaneis affectib.
exter. tumores œdematos. resolvit

Euphrasia humores lentos
serosos in cerebro concrescentes discutit
et subastringit cephalica et ophtalmica
in pulv a ʒi ad ʒiii add. idem pondus
sem fœnicul cinamomi maceris et sacchar
mane jejuno per plures menses in cata
ractis et suffusionib. scotutomia et
memoriæ defectu
℞ euphras exsicc pulv cran hum a ℥ß
cinnab antim ocul cancr mar. sem fœnic
dul. pul a ℥ii syr de stœchado q s m f
elect dos ʒi bis terve die paralysi et comatosis
affectibus a pituita viscida

312 faba flore candido literis nigris conspicuo feve de marais.
difficilis sunt coctiones et flatus pariunt caput gravare visum hebetare vires ingenii enervare, quapropter delicatulis vitandae et illis qui calculo colicae passioni capitis dolori et alvi constipationi sunt obnoxii emendanti cepis porris apio petroselino satureia pipere.
farina inter 4 resolventa
℞ farin fabar ℥III sem cumin pulv ℥I lithargi ℥I aceti acerrim ℥II aq com q s ad catapl ad tumores duros et scirrhoso et mammar tumor.
farina inter cosmetica et aq. still florum.
Fagopyrum vulgare erectum bled noir ou sarasin
tritico secali et hordeo minus nutrit plus tn quam militum et panicum
farina resolvit digerit et maturat.
alimentum non spernendum ex ea pultes offas placentas cum lacte butyro vel oleo et sale vel carnium jure
Filipendula. attenuat humores crassos diuret. radices magis astring. quam fol

in albo mulier profluvio in nimio lochior fluxu. rad pul ʒi in dunci decoct aliqui ad poeniam virtute accedere hinc in epileptici vestigia. semmat. adversus scrophul

℞ rad scrophul filipend, rusci a ℥ß fol agrim pimpin a m i flor rori mar p ii. digerantr vase clauso in vin alb ℥xxi colatur edulcorat cum saccharo pro 3 dos

Filix non ramosa dentata fougere male. ramosa major pinnulis obtusis non dentatis fougere femelle utraq iisdem virtutib. in morbis chronicis ex melancho hypocondriacis in tumorib et scirrhis lienis ℞ herbae filicis cum sua radice sabinae absinth a q. L. coq in aq com vel ferae fabror ad 3 tiae ptis dim vel macer in vino add passul min contus pro grato sapore sub ingressu lecti haustus bibatr in affec melanchol et lienis tumorib

gravidis infensa censetr ut quae abortum faciat

rad pul ad ʒi lumbricos enecat

℞ rad filic foemin sicc pulv summit tanaceti a ʒi cort mor arbor et corall a ʒii aethiop min ʒiiii m f pulvis dos a ʒß ad ʒiii

 commendati ad ambusta

℞ rad filic fenini q S ex contus succum cyprim affund aq rosac vel eam per expres succus mucilaginosu

filix florida osmunda vulgaris et palustris fougere fleurie.

filic magis temperata censet.
rad ad hernias et ulcera. et in rachitid.
℞ summit fructifer osmund m I coq cum lact vacci ℔ I colatura hauriat contra rachitiden
℞ radicis nodul subcandicantis ℥ III capill vener m I coq ex aq ℔ III f decoct contra rachitid

Fœniculum vulgare minus acrior et nigriore semine. dulce majori et albo seriore.

spissiorem sanguin crusim blande dissolvit limpham acidam incidit. diuret aperi sudorif stomach pector et febrifug.
contra variolas et morbillos in febrib. putridis et malignis
rad. inter 5° aper. succ rad ad ℥ IIII cum saccharo jejuno duen dieb febres intermitt fugat. ventricul robor et mucum dissolvit
semen fœniculi reserat spiracula culi

sem cum sach in vino ad ℥i ante
vel post pastum. lac augent asthmaticis
juvat veteri tussi et contumaci
in oculor affectionib in vino coct sem
herba tota juvculis et sorbitionib cocta
ad corpus obesum extenuandum utilis
sem adhibetr ad corrigenda purgantia
℞ rad foenicul ℥ii lentium excortic ℥ß
caric ping No iii coq in aq com ℔iiii
ad ii sub fin add fol scord mß sem
foenicul ℥i f colat pro potu in
morbill et variolis ad eruption movend
℞ rad foenic ℥iii sem foenic ℥ß flor
sambuc m i coq in aq com ℔iii ad iii
decoctum pro potu solido in lactis imminut
℞ sem foenic dulc pulv ʒß pulv lumb
terrest ℈i f. pulv jejuno ventri sum
in lactis imminutione
℞ rad helen ℥i sem foenic contus ℥ß
passul ℥iß cum aq sq. decoct in tussi asthm
℞ mucag gum tragac cum aq hysop extrac
ad syr consist ℥iii syr de erysim ℥iß ol
amygd dul ℥i ol cis foenic gut x. f looch
in astmate
comae foenic virid in acetariis dum tenell
pisces foliis foenicul involvit ut sapidiores
germina tenera cum oleo et pipere

346 **Fœnum græcum** sativum
farina seminis tumores emollit digerit
maturat discutit dolores compescit.
in clisterib emoll carminat et anodynis
in alvi fluxib colicis et dysenter: sem muculag
coctione cum aq extract: conducit præsertim
in ocul sugill. in eresypelate. interiur raro
℞ sem fœnugr et lini a ℥ß rad alth
bulb lilior a ℥ii fol malv sambuc verbasci a m ii flor melil hyperic et
centaur min a m i coq in s.q. aq
ad ℔ iii f. colatur singulis decocti libris
add ℥ ii pro eresipelatos calide foventis
℞ fol et flor verbasc m i furfuris
tritici m ß sem fœnug et lini a ℥ii
coq in aq vel lact q.s. f enema
in tenesmo et dysenteria
℞ farin fœnugræc ℥iii ferment veter
℥i sterc columbr ℥ii ol chamæmel ℥iß
mell ℥i contund m f. catapl in maturan
abcessib
℞ sem fœnugr in melicrato cocti ad
dissolut usq q.v. dein contund et
iterum cum melle ad catapl ad dolores
arthriticos et tumores mammarum

ℨ pulp poe pomor dulc in aq fecerint
et verbenæ coct ℔ß mucilag fœnug
aq rosar extract ℥i lapid hæmatit triti
℥i camphor et tuthiæ ppp a ℈i bol
armen q. S. f. epithem pro oculo
in sugillationib
Fragaria. si cor succus fer
mentescit vinosus fit, sed brevi acescit
et putrescit
fraga refrigerant sitim sedant, alvum
emolliunt, urinam provocant parum.
nutriunt. minus tutum ea comedere
cum lacte. et vini admistione difficilius
coquuntr. aqua citius dissolvuntr.
pituitosis et sitienbus conveniunt
aperientia et splenitica
aq ex fragis cosmetica faciei maculas et
lentigines abstergit.
radi et folia diuret et super in interno
aliquantisper astringunt unde adversus
hæmorragias alvi fluxus alvi fluxus
catharros et distillationes cohibere dicunt
observandum ejus decoct alvinis excrement
rubentem colorem inducere
vis traumatica pollet insigni
ad perniones fraga contusa cataplasmati modo

318 ℞ herbae fragar. cum toto fol. rad. et flagell
Concut. a m x uvar. passul. corinth. conod.
vel cortus ℥ii tartari alb. pul. ℥ß coq.
in s. q. decoct. hord. ad dissol. syr. berber.
℥i pueruli ictero laborantes qui cheli
donii decoctum respuunt.

fraxinus excelsior, fol. vulner.
corten. splenica diuret. et febrifug. sem.
diuret. et aphrodisi. lign. exsiccat sudor.
et stipt.
aq. quae exudat ex ligno uronti in surditat.
commendat.
sem. pulv. ℈i ad calculum ictorum hydrop.
in vino rhenano ad obesitatem ad maciem
reducit. viribus fere ligni nephritici pollet colore
caeruleo puritatem inquinat aquam in decoct.

fumaria flore purpureo
fiel de terre ou fume terre. purgat bilem
et humores adustos serum magna dosi
succ. ad ℥v ad alterandum. integra
m. c. in seri lact. ℔i leviter decoquitur
et cum syr. viol. ℥i propinant. diutur.
coctionem non fert.
sanguinem fluidiorem efficit humores
tenaces potenter incidit et expurgat
viscera roborat urinas et menses movet

in cachexia morbis chronicis hypo-
condr ictero, scorbuticis. in cutaneis
affectib scabie prurita impetigine
specificum - simplicis infuso ex sero lactis
vel cerevisia
pulvis hujus plantæ ad ℥i In melancholia
℞ extrac fum gentian absint centaur mi
nasturtii aquat a ℥i extrac elixir
proprie paracel, rhabarb et cortic peruv
a ℥ß ocul mat op cort malor aurant
acrium pulver a ℥ß syr menth crisp
q s f op dos ℥ß bis die in cachexia
et viscerum obstruct
ex succis fumariæ lapathi silves et
enul campi super ignem inspiss cum
axung porcina f unguent adversus scab
et cutaneos affect
Fungus pileolo lato et rotundo
champignon verus et esculentus
pileolo rotundiori mouceron
qualiscunq sit ſ per malignus est et
cantdalsum qualitatum apparatu instructus
symptomata sunt vomitus præcordior
oppressio anxietas strangulationis sensus
ventris tormina cardialgia diarrhea

 dysenter. vomi deliquium frigidus
sudor singultus tremor partium
a particulis salino-sulphureis subtilib.
acribus et causticis.
exsiccati et bene aq. calida eloti non
ita nocent, quia partes illae extractae st.
iterum quorumq modo ad fimetum unde
oriuntur relegandi st.
cor symptom. auxilium fert emetico
cum copioso lacte aut oleo
Fungus pulverulentus crepitus
lupi. lycoperdon vulgare i.r.h. vesse
de-loup. lycoperdon alpinum maximum
cortice lacero
exter. astringit incrassat humida
absorbet sanguinem sistit, exsiccata
vulneri inspergitur ulcera exsiccat.
hemorroid fluxum cohibet,
pulvis iste oculis infensissimus
Galega flor coerulei
dr alexiphar. et sudorif
Galeopsis procerior foetida
spicata grande ortie puante
vulneraria tumores resolvit dolor.
demulcet infus fol et fl a rusticis
exhibetur in pleurit. nephrit. adver. scorbut

.. inquis fol et fl macer, ad ambust
Galeopsis palustris betonicae folio
flore variegato putide ortie puante
eaedem ei virtutes ac priori vulnera
Galeopsis sive urtica iners flore
luteo ortie morte a fleurs jaunes
adversus alvi fluxum et fluorem album
mulierum urinam movet.
Gallium luteum petit muguet
caille lait. summit florid lac coagulat
ex quo fiant casei laudatissimi
adversus epilepsiam ejus pulvis ad ℈ I
succ ad ℥ IIII vel decoct me in aq tti
quotidie mane propinatur jejuno
pulvis aut herba haemorragiam sistit
et sanguinis profluvia. aliqui adversus
podagram infus instar the
cata contra sacris ignis et ambustis medet
naribus indita sanguinis profluvia sistit
℞ pulv galli lutei conserv flor paeon
mas a ℈ I rad valerian silvestr ℥ vi pul
deguttata ℥ß angelicae et pul lumbricor
terrestr a ℥ II cum syr de stoecade f. op
dos. ℥ II.. mane et sero

352 Genista cytiso genista scoparia vulgaris flore luteo.
aperit abstergit attenuat, hepatica nephritica. fol ramuli et summit utilia vin contr hydropicis.
sem purgat non minus fort quam spartium vel helleb. 3i3 flores indecocts per infer educunt si in subit. vomitum cient attamen multi in acetariis admittunt magna copia absq noxa forti corrigit acetum
ex ejus cinerib. parantur lixivium vino tenui albo potentur serosos humores per vesicam pellit sed acrimonia sua quod laedit et erodit
Genista hispanica virib. cum genista vulgari convenit.
Geranium columbinum folio malvae rotundo bec de grue pie de pigeon in pratis et hortis. syr ex succo adversus dysenter. folia in pot decoct emplastr olei adversus contusiones et vuln. astringit
Geranium robertianum virid. in veteribus muris ruris arboris locis nadente. insigne vulnerarium et astringens tpentum

potenter resolvit sanguini fluxum sistit
et coagulatum resolvit. ulcera mundificat
vinum inquo fol contus per noctem macerata
fuerunt hemorragias sistit pulvis ad ʒi
externe fol contus vel vino cocta tumores
oedematosis, cum sale et aceto subacta

Geranium sanguineum maximo flore
in sylvis et dumetis - fol stiptica
tres geranii species indiscriminatim sumunt
saepius tn robertiana

Gnaphalium pes cati elychrysum
montanum flore majore purpurascente
pied de chat inter moderate refrigerantia
seu incrassantia astringentia et agglutinantia
in pulm affect ob imbecillitatem et laxitatem
continendi sanguinis impotenti. tussim sedat
humor acrim demulcet expectorationem movet
pectoris infarctus resolvit, sanguinem sistit
pulmon exulcerationem praecavet ulcera
abstergit et consolidat. maxime iis quibus
a capite fit fluxio in thoracem et qui ōn
intuitoso tumore infarciunt in sputo
nimio, cruento dysenteria

 Gnaphalium. filago seu impia herbe a cotton. rarius in usum. vulner astringens. et pedi cati substituti in pleuritid m.t. in aq. ... hemorragii dysenteriæ mensium nimio fluxui angine aq. dist. ad cancrum mam. linteis imbutis ne exulcerat

Gramen loliaceum radice repente chiendent. gramen dactylon radice repente utriusq. rad. usurpant

refrigerant moderate aperiunt et subas tringunt. urinas blande movet ad obstr. hepatis si adsint febris ubi est viscerum dyscrasia calida, sine calefactione agit cum levi astrictione. in cruenta exspuitione succus radic et folior. rad. aq dist ad vermes infant vel pulvis ad ʒi. etiam in rachitide

℞ rubie mar. polypodii rad gram canin exsicc et pul. a.p. æqu. f. elect cum syr. de 5 rad aq. dos ʒi bis die in rachitide

℞ rad gram mund contus M.i. glycyr. rasæ ... ʒi coq in ... ad ... aq. ... add ... ʒi f. ... ad sequinis æstum temperandum et urin movend

Gratiola digitalis minima
herbe a pauvre homme
purgans hydragog. hydropicis commendat
adversus inveteratas febres. obstructiones
levat lumbricos pellit, sed non nisi robustis
saepe excitat tormina et superpurgationes
recens ad m ß sicca ad ʒ i aq vel vino
macerata - sed mitior cum lactis lb ß
in enema fol ad m i in sero lactis vel
ipso lacte.
℞ fol gratiol virid ʒ ii vel sicc ʒ i injice
in lactis fervent ℥ vi infund per noct
℞ fol gratiol ʒ i macerent per noct in aq
font ℥ vi f. col. in qua contund amygd
dul N° vi dilue syr viol vel de althea ʒ i
℞ gratiol virid m i centaur min absint
a m ß sem tanacet et santonic a ʒ ß
coq in sero lactis - f. clyster ad enecandos
vermes
Grossularia simplici acino
vel spinosa silvestris groseiller blanc
spinosa sativa. refrigerat et astringit
maturus fructus minus astringit in ventriculo
facile corrumpitur.

 vinum apud anglos ex maturis acinis conficitur cum aq fervente in doliis clausis in loco operato per 3 vel 4 hebd. dein liquor in ampullas cum saccharo infund. b-
Grossularia ribes dicta. multiplici acino sive non spinosa hortensis rubra util ad aestum internum et sanguinis effer et biliosas commotiones. sanguinem leviter inspissant acidorum more et astring. modarit ventriculum roborant in vomitu. diarrhoei a biliosa colluvie haemorragias a sanguini dissolutione corrigunt in febrib malignis alcalina salia nimis evoluta retundunt.
nocet nimius usus quibus ventriculus debilior chylum spissior, pulmonib nocet tussim excitat. phtisis prorsus infensus
℞ syr de ribes ℥ii aq lact vel cichor ℔i sal prunel ʒß m. pro potu in febrib
℞ rob ribes ℥i aq meliss oxytriphyl a ℥iii m. f. jul in febr malig
folia vehementer astringunt.
Grossularia olens. non spinosa fructu nigro majore cassis des poitevins
fol. adversus viper et animal. rabidor. morsus

succu fol contusor in vino ad ℥viii
bis die propinat per octiduum demorsis
bis die. fol expressa vulneri impos
apud turones et pictones hoc vinum probat
℞ fol galeg rutae hort. roris marin salviae
angelicae silvest gramulae dentis, folior et
radic bellidis silvest min, spongiolae rosae
silvest fol lepidii latifol. allii bul a.ꝑ.aeq
contus pro singul ℔ add sal com ℥iiii
vin gene ℔iiii digerant in vase clauso per
aliquot dies identidem agitando, cyath i
bis die mane jejuno vespere 3ᵇ post prand
horis per octiduum celebrata venae sectione
vulnere dilatato linamentum hoc vino
imbutum apponat et post 12 hor renovet
vel herbae contusae
eodem modo animalia demorsa curant
vulnus candente ferro comburatur scalpello
tota crusta auferatur et herbae contusae admoveant
sobii vin ad ℔i bis die, necesse est etiam
ut animalia demorsa quotidie fluviorum
vel stagnorum aquis innatent.

Hedera terrestris. calamintha humilior
folio rotundiore terrete herbe de s^te^ jean
rondotte. aperit discutit abstergit vulneraria

358 succus defoec ad ℥ii aut iii pulv ad ʒi
in tussi phtisi viscerum exulcerationib
ad mictum cruentum in casu ab alto
ad demulcendam urinae acrimoniam
ad calculum minuendum et expellendum
cum saccharo et ... succus naribus
attractus cephalalgiam aufert
fol recentia in vino albo usque ad putri
laginem coquunt ad insaniam sanandam
succus exprimit cum olei oliv aequali portion
coquit ad mediae ptis dim. hoc oleo
capitis vertex sinciput et tempora calide
inunguntur. dein magma calens applicat
renovat 4a quaq hora per 3 aut 4or dies
℞ rad rub tinctor tormentill et bistort aa ʒi
fol hedera terr veron millefol virg aureae
a m i sum fl hyper et bell dimin a m i
coq in aq com q s. ad lbiii colaturae dilu
rhodomeli ℥ii f. apoz valde ad ℥vi
3a vel 4a quaq hora propin ad ulcera
interna et haemorragias sistendas
℞ succ hedera terrest depurat ℥iiii thuris
subtil ... ʒi mell rosati ʒi f. linctus
in haemoptoe empyemate et vomica pulmon

℞ extract hederae terrestr conserv rosar rub et conser rad symph mac a ℥i
antihect poter succini subtilis trit a ʒiii
corall rubr ocul cancr a ʒii m f.
elect antiphthisic c ℥iv. syr hedera terre
dos ʒiß ter quater in die

helianthemum flore luteo herbe d'or hysope des garigues
vulneraria et astringens symphitorum more usurpat
ad uvulam ulcera oris et genitalium decoquit in vino rubro addito momento aluminis. ptes colluunt

helianthemum tuberosum esculent off corona solis parvo flore tuberosa radice taupinambous poires de terre.
rad. mediocriter nutriunt sanguinis et humor acrimoniam demulcent unde pectori affect aqua decoquunt cum butyro sale et pipere sic comedunt. alii frustulatim secta et massa farinacea involuta cum butyro vel oleo in sartagine frigunt. a quibdam conduntur sale et pipere

heliotropium majus flore albo herbe aux verrues

 detergit. efficacissima censetur adversus carcinomata ulcera serpentia et gangraenosa et ad strumas

Hepatica fontana. lichen petreus latifolius. incidit abstergit astringit consolidat. pulmoni hepati lieni & obstructiones aperit humores crassos dividit solvit, roborat sanguinem sistit humor. acrimoniam demulcet. in hectica febre infantium, phthisi ictero scabie

℞ lichenis petrei exsicc pulv ʒß geranii robert pulv pulmon vulpin pp. boli armen a ʒii antihect poter ʒiiß sacch candid ℥i f. pul dos ʒß mane et vesperi. est praestans antiphthisicum

hepatica nobilis. ranunculus triden tatus vernus flore simplici caeruleo refrigerat siccat roborat et astringit vulneraria.

Herba paris raisin de renard alexipharmaca cephalica resolvens et anodyna. adversus mitid emotionem et

inveteratam fatuitatem. herbae pulv
cochlear dimidium viginti dieb jejuno
baccar sem pulver ℥ß
catap fol et bacc in bubon pestilent
calidis tumoribus inflammationibus malignis,
paronychiis et ulceribus inveteratis sive
demit sive sola contusa aut cum
fuligine impastata in forma cataplasm
in cancro tum ulcerato quam occulto
fol contus in mortario plumbeo

Herniaria glabra turquette
hirsuta. in curandis herniis proficua
succum express solum vel subinde affuso
vino alb a ℥ii ad ℥iiii per 9 dies propi
℞ emplastri contra rupturam emplastri de
gratia dei a ℥i sang drac, olibani, rad
osmundae regal pulv a ℥ii cum oleo mirtill
ebulliant in aqua et fiat emplastrum
alii herm pulv ad ℥i coct autem her
m i in aq vel vin ℔i et colatur ℥vi
propin et post reductionem cataplasma
ex herba contusa.
in visione debilitata lectione diu noctuq

 hordeum polystichum hybernum
polystichum vernum orge de printemps
priori breviores spicas profert et crassius
ejus farina cum aq cocta mucilaginem
dat adeo viscidam ut igne quidem destrui
vix possit. aestuosis donatur spiritus quae
ope aquae fermentationem concipiunt
ac compositum efficiunt vinosam lenitatem
non eandem cum tritico obtinet facultatem
si quidem triticum calefacit hordeum
vero quoquomodo paratum sit nunquam
calefacit sed refrigerat et abstergit et
pro modo praeparationis tum humectat
tum siccat. coctum in pt. humectat
tostum in polenta siccat
minus quam triticum alit. panes ex
hordeo dicunt convenire hydropicis et
mulieribus quibus menses immodice fluunt.
sumitur hordeum integrum cum mundi
ficandum abstergendum incidendum, excorti
catum lenienedum mitigandum emolliendum
sitis q magis extinguenda.
℞ hord integr ℥ii decoq in aq pura sed
primum fervefacta abiiciatur, nova addatur

coq igne lento ad ℔ i f. colat sine expres
add sach rosat vel syr ℥i pro potu
solito ad leniendam tussim et sytim
certam in calid affect
℞ hord integr optime loti m i rad gram
brusci et richor a ℥i coq in aq ℔ix ad iii
sub fin add fol tarax scolop a m i
liquir: rasae contus ℥iii f. apoz percipiatt
ad aperiend. ℥a quaq hora sumend
℞ hord mund ℥i bulliat leviter in aq
rejicienda. nova affundat ad ℔ iii
coq ad mollitiem. tum add passul ℥ß
cum pinq № ii glycirrhis rasae ℥ii
bull. per horae ¼ add sub fin capill ven
canad. flor papav rhead et tussilag a
m i. pro potu servet ad tussim sedandam
humorum acrimoniam compescendam expec
torationem promovendam.
℞ hord mundat! loti ℔ß fiat decoct
in aq. lento igne usq ad crepaturam
extrahe medullam per setaceum coq ad
pultis consistentiam serva in vase compacto
in loco frigido non humido quia liquesceret
hujus pulp 2 aut 3 cochlear dissolv in
jusculo et coq per semihor capiat bis vel ter

364 ℞ hord mundi ad crepatur coct ℥i ʒ
amygd dulc decortic № vi sem melon
ʒiii contund in decoct hordei ℥ xvi
expressioni add syr de alth. aut nenuph
℥ii aq flor aurant ʒii f. emul pro
2bus vel 3bus dosib

Cerevisia quae sine lupulo ala dr
ab anglis, si generosior sit maxime
nutrit et corpus obesum nimis et pigrum
reddit. lupulata vero pinguedinem
dissipat corpus q vegetius et ad motum
aptius,
cerevisia est potio alimentosa. diversae
qualitates pro earum differentia.
lupulata roborat et calefacit.
optima est quae ex fontana aliis q salu
bribus parata, et improbanda est aq turbulenta
cerevisia tenuis parum nutrit melius vero
humectat refrigerat diluit et totum ypus
pervadit unde diuretica et salubrior
crassa vero sanguinem crassum generant
difficulter digerit. dulcis fit a frumento
amara a lupulo
chirurgi observant eius spiritum vulneri
minus conducere ob acrimoniam

farina: inter decolventia

℞ fol malv alth a m.11. fl chamae melilot summit aneth a m.ß coq in aq q.s. ad pultilaginem contusis add farinae hordei ℥IIII ole chamaem ℥Iß f. catapl resol et emoll

℞ hord integ p.I fol agrim Mß flor hyper ros rubr summit absinth a p.I coq in aq s.q in colat ℔I dissol mell rosati ℥I f. inject detergens et vulnerar

Horminum. s. clarea orvale toute bonne. germani ex ejus floribus cum fl sambuci per infus vinum rhenan in moschatellinum mutare. tunc frigidit stomachi conducit phlegmata consumit. frigidd infoecundis et albis mensibus laborantibus conducit. attamen capiti noxium ob odorem gravissimum si intemper usus tum int. quam extus his trib convenit mulierum fluxu albo, suffocatione hysterica et colicis doloribus. fol et flor in infus vel decoct aq vel vin vel simul alterantibus inter antispasmodic recenset, colicos dolor demulcet aq distill vel decoct vel in clyster

 folia ovis conquassati, cum flore lacti
et pauca farina in sartagine frixa pro
placentis palato non ingratis et ad lum
borum imbecillitatem venerem q stimulandi
expeditive medeti. in pulverem redacta
et naribus indita sternutationem provocat
catharrum tollit et cerebrum purgat.
sem oculis inditum utile ad excutiendam
caliginem et educenda corpuscula quae in illis
inciderunt quippe emollita humore pali
hujus seminis mucilagine illapsum quas
obvolvit et ejicit. semini mucilag. ocul
acrim. demulcet.
℞ fol horemin, urticae mort. portulacae
cherefol. a m i frusti carnis vital ℔ ß
coq. et coli. col in aq q. s. pro 2 haust
mane et sero in fluore albo
℞ summit florid urtic mortuae et sclareae
fl chamem romani a p i infud in aq
vul ℥ viii the in modum. infus colen
syr de hederi terrest edulcatum mane
et sero sorbeantur in fluore albo
Hyoscyamus vulgaris vel niger
jusquiame hamebane

hyoscyamus albus major
radices subdulces et cinarie sapore
externe potenter emollit et resolvit
sive extus sive intus somnum inducit
dolores sedat humorum acrimoniam
mitigat sicut papaverina, mentem
vero mirum in modum perturbat, odiali
deliriis ad jurgia et altercationes disponit
in biliosis, in quo differt ab opio et
papaverinis quae soporem inducunt absque
mentis alienatione, has mentis turbas
excitat quocunque modo exhibeatur sive
intus sumantur radices fol sem. sive cortu
clysteribus, sive torrefactione fumus naribus
excipiatur. hinc liquet quam parum sit tutus
hyosciami usus tum intus tum ext. alterum
aliqui in haemopthisi a ℈ß ad ℈i
℞ sem. hyoscij et papav alb a ʒii consarv
rosae rubr veteris ℥ii mis. elect ad ʒi semel
aut bis in die. pot add corall rubr terra sigill
bol armen lapid haemat pp a ʒß. dos ʒii
℞ sem hyoscyam et papav alb a ʒß terr
japon olib myrrh a ℈i croci pulv ℈ß succi
liquir ʒi sacch alb ʒ,3 muc gumi tragac q.s.
f. rotulae quae nun ore detin et ssim deglutiat
ad cathanos serosos acres a capite ad pectus

℞ fol hyoscyam mandragor solani
a M ii sem hyosci, et papav alb
contus a ℥i coq in lact vaccin q.s.
pulpae per setaceum expressae add croci
pulv ʒß vitellor ovor. N° ii f. cataplasma
anodyn et resolven
ex foliis fotus ad arthriticos dolores.
folia supra cineres calidos emollita mammis
admota lacrymamentum discut.
sem cum vino contusa mammis ad lac arcendum
contra pruriginem et tumores manuum
a frigore semina carbonibus inspergunt
fumum q excipiunt
adversus dentium dolores ab aegyptii laudatur
semine prunis inspersito sed periculosum est
si per imprudentiam exhibitum noxias suas
qualitates exerceat tum vomitorium statim
indic. dein ad narcoticorum antidota quae
sunt omnia acida. tandem stomachicis
et cephalicis ad roborandum utendum

Hypericum
nulla pestis
ol ess: therebinthin simil continet.
vulnerarium, sanguinem coagulatum resolvit

menses et urinas promovet calculos et
arenulas expellit: lumbricos enecat
in hysterica passione melancholia hypocond
mania et mentis aberratione, fuga daemon. dr
sumit in aq vel vin coct vel infus ad m I
sol et sem ad ℥ i
herbae decoct per aliqd tempus jejuno calculum
pellere dr
℞ summit florid perforatae conquassat. c. 𝔏.
mace in ♃ per octiduum vase clauso
[illegible] purior a faecibus inclinatione separatur
sp. vin destillatione major pars abstrahatur
spiritus liquor remanens est balsam pretiosum
hujus balsam ʒ ii sacchar ʒ i ß aq destill sol
hyper vel betonic, solvantur. hujus mixtura
cochlear duo 3 vel 4. mane et vespere maniac,
melancholicis hypocond. absque causa manifesta
ad lumbricos expell. flor hyp. in 𝔏. infus
℞ summit florid hyper et virgae aureae
a m I. rad symph maj tubercul sicc ℥ ß
rasur corn cervi ʒ ii coq in aq fontan ℔ iii
ad ℔ ii col dissolv syr de hedera terrest vel
de symph ℥ ß f. apozem vulner. per cyath
in haemorragiis et renum. intestin. ulceratione.

2 summit hyper et herbae anagallid flor purpurea a m t infund in aq bull ℔ ii

vel propota ordinarid in melancholia maxim

ext insigne vulner. nervor contusionibu vulnerib et ulcerib resolvit detergit et consolidat herba flor. vu contusa applicata vel vino aut oleis macerata et decoqui

ol simplex fit per infus flor cum oleo olivar quod novis floribus super affundit quousq rubrum colorem assecutum fuerit.

apud monspeli. flores macerant in liquore resinoso ex albi resinali extracto, illud balsamum attenuat resolvit et discutit. dolores omnes a frigore contractos sedat. asthmaticos demulcet ambulatd medetur. intus a ℥ß ad ℥i ad cruentam expuitione et dysenter, nec non in enematib

Hyssopum ∂ caerulea seu spicata

vi incidendi attenuandi et discutiendi pollet pulmonum affectib traducid potissimum dicat ventriculum roborat et coctionem juvat acrimonia sua aromatica viscidum pulmon mucum. eos vesiculas infarcientem incidit et ad expectorationem promovet.

in asthmate humorali specificum
ventriculi inflationi et ciborum inappeten
incidit abstergit glutinosam pituitam
cerebri pituitosis affect. in catarrhis et
morbo comitiali. decoct. super aq. v. no. cervis
℞ rad chinæ ℥ii bull leviter in aq flu
℔ii add fol hyssop m ii macerent dum
decoct refrigeratum col dilue syr hyssop
vel erysim aut stœch ℥ii sumat pro cyath
3ª quaq hora in asthm humorali cathar
℞ rad irid flor ℥ii agaric minut conc
et in nodulo ligati ʒiß fol nicoti exsicc
℈i sumit flor hyssop et thym ā m i
coq in ℔iiß aq com ad ℔ii. colatu
diss oxim simpl ℥iiii f apozem expect
in asthm humorali. præpotens remedium
propinatur instar caffe ad ℥v 6. i vel ter
in die
℞ conserv flor hyssop et rad enul camp
ā ℥ii aristol rotund et ireos flor ā ʒiii
s.q. syr de althea f. op ad magnitud nuci
mosch in asthmate humorali
externe in oculor suggillationib et sanguine
sub cornea collecto sive a causa int sive ext

sanguinem grumosum et extravasatum
dissolvit si hysop. coma nodulo inclusa
bulliat in aq. et tepida nodulus oculo vexato
applicetur. loco aq. vinum adhiberi p.t.
cataplasm. ex fol. conci. et butyro non salito
recenti in contusionibus
aq. distill. ad ocul. inflam. aq. hysopi jung.

Jacea nigra pratensis latifolia
vulneraria, ulcera detergit resolvit
tabernae montan. ad hernias valere scribit
pulv. ad ʒj in jusculo

Jacobaea vulgaris laciniata
herbe de st jacques
vulneraria cum senecione vires obtinet
a quo tn differt quia senecio insipidus
cum modica caliditate digerit. jacobaea vero
amara cum majori caliditate dissolvit abstergit
in incipient. infl. ubi mitigandi dolores senecio
ubi vero siccare abstergere jacobea.
ad anginas tonsillar. q. inflam.
aliqui unguent. ex ejus succo praep. ad erisipel.
sed praestat decoct. siquidem adiposa et pinguia
in erisipelate noxia

Juglans nux sive regia vulgaris

umbram juglantis noxiam esse affirmant non solum humano capiti sed omnibus stirpibus juxta satis, re ipsa decubitum sub ipsa capitis dolorem inducit non umbra noxia sed a graveolentibus halitibus ex foliis emanantibus qui non nullis sunt noxii sed non omnibus.

cortex interior seu liber siccatus vim emeticam possidet insignem, juli seu nucamenta lendo ex a ʒß ad ʒi in robustis corporib ad febres fol adversus podagram discutiunt et roborant succum radicis violenter purgat.

sed succus qui mense februarii ex radice vulnerata stillat commendat in arthritid. nephritide cephalalgia. urinam potenter movet

nuces virides saccharo conditae ad ventricul imbecill ad flatuum dissipationem, colicam sedandam pestis contagium arcend. quin et ad venerem excitant

cortex viridis dr vomitor. corticis succus astringens. ex eo succo cum melle inspissato rob conficit

corticis aq distill ad ocul et faucium inflam

aq e tribus nucib distillata in febrib intermitt malignis hysteric affect. hydrope ad ʒv 4ª quaq hor

 nuces novellae vulgo des cerneaux palato placent. parum nutriunt aegre coquuntur matura et aridae parce nutriunt astringunt ratione cuticulae. asperum quid et raucum in faucibus pariunt, gravitatem capitis afferunt corriguntur si edunt cum caricis et pomulis ut diutius recentes sint in media maturitate colligi debent et in cella vinaria sabulo sepeliri si aridae per aliquot dies in aq macerentur albescunt et mbrana ut vidi exuunt

Post pisces nux sit, post carnes caseus esto
unica nux $\overset{\text{sihd: valere}}{\text{prodest}}$, nocet altera tertia mors est

Nucibus bene maturis vim alexipharmac tribuere veteres. eas veneni resistere mane jejuno aut ante cibum illo die nullum ve nenum nociturum, duas nuces ficus totidem rutae folia viginti simul trita cum salis grano admittebant.

maturae macerant in aq donec nuclei mbranis possint nudari. dein nuclei ita expoliti macerant in aq vitae per biduum eorum que duo vel tres postidie mane jejunae prius perpurgatae calidum comedendi per decem dies ante tpus menstruae fluxionis in re moratis mensibus

ex mebrana sub inorum lutea quae nucleum
arctissime investit indumentum parat ʒi
pondere contra colicos dolores
nucum testae et nuclea intermedia segmi
menta vi exsiccante sudorifica. unde in decoct
adversus catarrhos rheumaticos et venereos
dolores
℞ antim crud contus ℥xi rad sarsaeparil
℥vi rad chinae ℥i testas et segmimenta inter
media jugl Nº XL contus coq in aq. com
℔ [redacted] xii ad viii f. col. de qua sumat
aeger cyathos tres quater singulis dieb
per [redacted] vigint unum
ejus oleo eaedem virtut ac ol. amygd
imo flatus potentius dissipat in colici
per os sumit ad ʒi
auribus infus surditati prodest ol
ol ad ambusta a pulvere tormentario, prius
inungit mox folium applicandum. alii
illud cum aqua calcis permixtum et diu agit
ad calculos et arenulas sed quo vetustius eo melius
ad ʒii mane oleo amygd ob spiritud detur
ad lucernas durabilius est oleo olivarum
a pictoribus usitatum quod colores inunguntur
conservet. ligni dat splendorem
fungus trunci nascit qui intra cauteria conseh

Juniperus vulgaris fruticosa per corticis incisiones stillat resina quae sandaracha de qua mentionem fecimus.

baccae contusi diutius in aqua macer fermentes et humor vinosum odorem saporemque exhalit. baccae potenter resolvunt discutiunt alterant calefaciunt abstergunt roborant; ventriculo frigido prosunt, pituitam quae in illo coit digerunt, flatus inde ortos discutiunt, colicos dolores sedant, ciborum coctionem juvant urinam promovent viscidum mucum renibus aut vesicae inhaerentem abstergunt et expellunt calculos et arenulas. viscidam pituitam pulmonum glandulas infarcientem resolvunt expectorationem promovent tussi medent et asthmati humido, equini fluiditatem restituunt, motum augent, sudorem excitant venenis coagulantibus resistunt.

conveniunt in pituitosis et ubi fibrae atonia et imbecillitas deprehenditur alioquin equini aestum augent, frequentius solidis ardorem et phlogosin inferunt,

ad ℥i per diem identidem extandae

vel contusae in aq bullienti theae instar
macerantur et infusum ante cibum propinat
ad coctionem
vinum juniperinum paratur ex bacc
contusis cum affusa aq. vel cum fermentat.
deficiente vino in frigidi ventriculi
extractum ad imbecillem ventriculum
roborandum ad praeservationem a calculo
et ab hydrope. senibus qui vesicae vitio
urinae difficultatib et imbecillitatib vent
ventriculi. urinam blande provocat
menses movet et sudores vis alexipharmaca
ad ʒi in vino hispanico aceto, aq. card bened.
Ex bacc junip cochlear i contus in axung
decoct unguentum fit adversus porriginem
humores identidem evacuand aquila alb
t diagrid a gr xii
lignum incensum ad aërem purificand
sudorif. adversus luem veneream et catharros
sicut guaiac
Keiri leucoium luteum vulgare violier
ou giroflier
flores attenuant discutiunt abstergunt dolores
mitigant utero speciatim dicuntur menses
sicut secundinas et foetum pellunt

fol et flores macerant. ad m r per 24
hor in vin Hr pro duab dosio mane
et vere propinandis velinay decoq ad
viscerum obstruct. semi ad ℥i vel ii
ferunt hoc semen magna dosi fetum
vivum pellere enecare et ejicere,
ol perinfus ex flor. potenter resolvit
et rheumaticos dolores sedat, ad fructitundum
partum regio pubis inungitur
conserva fl. ad apoplexiam et paralysim

Lactuca sativa. lactuca capitata
lactuca sativa austriaca capitata variegata
laitue panachee laitue de silesie.
lactuca romana longa dulcis. laitue romaine
chicons. lactuca romana prioribus magis
sapida
inter olera lactucae primas tenent, refrigerant
humectant familiare praebent alimentum
medicamentosum juvenibus et biliosis prosunt
in ventriculo facile coquuntur si aqua pro
potu consueverit nam chylum efficiunt
blandum dilutiorem fluidiorem minime
acrem, sanguinem paucum gignunt sed
laudabilem, sitim egregie restinguunt
humorum aestum compescunt

Claudere quae venas lactuca solebat avorum
dic mihi cur nostras inchoat illa dapes.
galenus hoc olere et juvenis et senex usus est
juventute quoniam bile efferverscebat, senex
cum noctes insomnes ageret ob studia longiora,
qui pollet anodina. convalescentib. adhuc
agrypnia laborantib.
Tam quae salutari properat lactuca sopore
tristitia quae relevat longi fastidia morbi
alvum blande amolliunt
Prima tibi dabitur ventri lactuca movendo
utilis
siccioribus alvi constitutionib. sive crudae
sive coctae hyppocondriaci scorbutici,
lac augent nutricibus
comedunt crudae cum oleo sale et aceto
aliqui reds cherefol dracuncul nasturtium
lepas sed hae non indigant emendatione
imo hae difficilius quam lactuca digerant
si quis lactucae coctionem faciliorem desideret
aquam puram et limpidam superbibat et a
vino abstineat
℞ rad cichor acetos nenuph a ℥ i fol lactuc
portul oxalyd buglos et cichor alb a m I
flor viol et borag a p I. bull in lb ii sub fin
ad 2 q sem frig maj cont ℥ i col et ℥ i syr de nenuphar

 vel granat ℥ii f apoz pro 4 dos
4a quaq hora ad refrigerandum humect.
incrassandum et demulcendum
℞ pullum gallinaceum exenteratum et
decorticatum demptis pedibus et capite fruct
colli vitul a ℔ß coq in aq lingua ℔ xx
ad iiii sub fin add ℈ lactuc in 4 sectum
fol portul betae borrag a m I pro 4
dosal refrig et alter horis medicis sum
℞ rad torment bistor a ℥ß symphit
majoris ℥ fol lact portul plantag millef
fol a m I rosar rubr et balaust a p I
sem 4 frig maior ℥ß sem papav
lactuc a ℥i sem fruct carni vitul vel bovi
vulgo le trumeau f juxc duo ad sanguinem
incrassandum in haemorrag et alv profluv
℞ aq lact portul oxytriph a ℥ii rub ℈ß syr
granat ℥i f julap refriger vertum tpeciam
℞ 4 sem frig ma a ℥ß sem lact papa albi
a ℥i contus cum aq lact stil ℥vi
express dilue syr de nymph aut althea ℥i
f emuls pro una dos hora somni in dyssent
immediat et sapidus ardeat in urinae ardore
in phrenitide delirio febri ardente tpevis
sutura coronali lintum aq lactuc madid cum
nitri aliquantulum

lactuca silvestris costa spinosa
viribus ad sativam accedit sed potentius
aperit et abstergit alvum movet - somnum
conciliat

Lamium vulgare album sive
archangelica ortie morte
adversus fluorem album pulmonum
vitia lienis tumores et indurationes ad
hemorragias uterinas sistendas et ad vulnera
glutinanda. sumunt floribus in aq fervid
the instar macerant et unus aut alter cyathus
bis terve die. vel juscula cum portulaca
foliis
Lamium folio oblongo flore rubro. ad eadem ut hoc
lamium purpureum fetidum folio subrot
vulneraria resolvens et demulcens,
decoctum in dysenteria

Lampsana herbe aux mamelles
luc. fundit amaratum. refrigerat emollit
in decocto pro clyster raro interne.
extr ulcera et vulnera abstergit, contusa
succus impetigines sanat - efficax d.
in sanandis papillis exulceratis

Lapathum hortense folio oblongo
patience pareille raro in usum

 Lapathum hortense Lat. folium rhubarbe des moines
iisdem fere viribus insignitur ac lapathum rotund. folium, ambo leviter purgant item potenter astringunt, hepatis obstructiones reserant tum humores crassos solvendo tum fibrarum tonum quam par est laxiorem restituendo, unde in quibusd alvi profluviis, pulvis aut decoct
Lapathum pulchrum bononiense sinuatum lapaton violon
a gallo provinciae rusticis inter plantas olitorias esculentas et hiberno tempore comedit
Lapathum folio acuto rubente sang de dragon ou patience rouge. in hortis pro olere colitur fol et sem usitata
fol. cocta comeduntur alvum cient, in juscul emoll et refriger.
sem roborat astringit et dolores demulcet ad ʒß aut ʒi pulv. propinatur ad fluxus uterinos nimios sistendos alvi profluvia sistendu
Lapathum folio minus acuto
Lapathum folio acuto crispo patience sauvage frisée
Lapathum folio acuto plano patience sauvage ordinaire

Lapathum folio rotundo alpinum
rhabarba bastarda, eosdem ac rhabar
baro virtutes tribuunt sed longe debiliore
purgare aiunt si ad duplum rhabarbari
pulv. ad ʒii infus ad ʒvi nascitur in
arvernia mont. b. alvum emollit
℞ rad oxylapat taleolatim conc. ℥
liquirit. rasae et contus ʒi coq in aq com
℔ iß ad ℔i vel
℞ rad oxylap althee polypod ceran. a
℥i carnis vitul ℔ß coq in aq ℔v ad
sub fin add fol cichor sylvest taraxaci
scolopendr agrim, lapathi horten oxylapa
malvae betae lactucae oxalidis atriplici
a. mß pro ♃ juscul quo singulis diebus
salis tamarisci ʒi vel tartar. martial solub
ʒß mane et sero in viscerum obstruct
Adversus cutaneos affectus quorumvis
oxylapathi radices tum interne tum exte
℞ rad lapathi s. ?vestris mundat et taleol
concis ℥ii rad helen concis ℥i liquirit ras
et contus ʒii coq in aq com ℔iiii in vase
terreo in quo ʒi alum alb subtilis lintea
nodul suspens decoct ad ℔iii redat pro potu in scabie
et aliis cutaneis affect

374 ℞ cacr ♁ tal ℔ß cancri fluviat leviter contus. ℳ xii rad oxylap ℥ii enul camp ℥i bardan ℥ii coq in aq con q. s. ipro duab jusculi. sub fin add fol oxylap scab fumariae chaeref a m i sumat mane et sero in affect cutaneis. externe radices oxylapati in folib lini uneriatis ad scabiem porriginem impetig aut alios cutaneos affectus praemissis praemittend.

decoct rad oxilap ℥iiii et enul camp quo quaedam stercoris ℥ galli gallinacei ... dilutis ad scabiem fovendo

℞ rad oxylap et enul camp a ℥iiii coq ad putrilagi per setaceum trajic tum ℞ hujus pulp ℥ii sulphur vivi ℥i flor sulphur ℥i vel merc praecip alb ℥i f ung

℞ succ oxylap rhabar monach chelidon ma a ℥ii pinguedinis lact ℥iiii mistu coqu ad succi fere consumpt add diapompholigos ℥i cerusae ℥ii alum ℥i thuris ℥ß flor sulph ℥i diu agitent in mortar plumbeo si succi [illegible] addatur pinguedo lactis ut fiat linimen

haec remedia nunquam sunt adhibenda
nisi post debitam praeparationem v. S.
purg. plus minus ve reiterat. balnea et
rad. cerevisiae infus. ad scorbutum
Sem. hepar roborat et fluxus alvi sistit.
Lapathum aquaticum folio cubitali
grande des marais.
radix sicut caeterorum emollit et laxat
obstructiones tollit cutaneis affectibus medetur
In rheumaticis doloribus arthriticis et ischiadicis
chronicis aegritudinibus et contumacibus
recens ad ℥iß decoct vel inf. sicc ℥i aut ii
adversus scorbutum plurimum valet.
omnes plantae istae praecipue rad. externe
Condita abstergunt valide astringunt et glutinant
hinc omnia putrescentia et erysipelata
tum ulcerata quam integra herpetes phagedenas
gangraenas inhibent et sanant. hemorroides
et menses sistunt.
decoct vel succ. fol. aut rad. anginarum uvulae
relaxationem symptomata probe depellunt
Lapathum spinacia dictum
spinacia vulgari, capsula seminis aculeata

376 Spinacia vulgaris oleris.
Spinacia vulgaris capsula seminis non aculeata.
refrigerat humectat alvum emollit parum nutrit effervescentias temperat ardores mitigat serosos humores generat.
febricitantib et senis, hecticis tussi aridae inecula ex ea parantr cum oleo amygd. d. aut butyro recenti asthmate et raucedine laborantib
℞ carnis vitul ℥ß coq in aq comm ffic adu tam add fol spinacia betae lactucae atripl a m i coq per $\frac{1}{4}$ horae pro 2 juscul man. et sero
extus cataplasmati instar ventriculo et hepati inflam et dolores tollit
Lavandula Lat. folia lavand. mali spic aspic ou nard commun
lavandula angust. fol
cephalica nervosa et uterina, in catharr: apoplexia paralysi spasmo vertigine.
in urina cienda menstrus et fetu pellendis in torminib flatulentis. infus flor theae ad instar. tinctura fl cum ℈i ad ℥i

oleum est: ad gutt ii vel iii
moderatus tn debet esse lavend sicut
et caeteror aromat usus. nam cqui certum
et plurimi aromaticum odorem diff. cole ferunt
in balbutie et linguae paralysi & lavendulah
os saepius ablui. in difficili partu
℞ sem lavend ʒß sem plantag endiv. be-
℈ ℈ii piper-ing ℈i f. pulvis in aq
caprifol endivi a ʒiii in partu difficili
aut sem lavend ʒiß succ alb. p borac
a ℈ii ol cinam gutt ix f. l'a pulv.
in hoc dicto in vino rhenano propinando
sed haec nisi in debilitate virium et atonia
quae minus frequenter occurrit quam
summa rigiditas intumescentia et ardor
sunt. d.m. decoct. emoll. et temperant
vapor ex clyster plus levaminis accipere
flores et folia in ore salivam provocant
in affect soporosis catarrhi linguae
paralysi. in cucuphis ad caput roborand
℞ ol exs. lavendul ʒi ol hyper ʒii ol
lumbric terrest ʒiii balsam fioraventi ʒß
f. linim ad membra paralytica aut rhumatism

388 huius olei odorem fugiunt blattae pediculi et alia insecta. si introducta lecti charta bibula hoc oleo imbuta capiti aliisq pilosis interfecti omnes reperiuntur
oleum adulteratum detegitur sed cum ʋ adulteratum aq com affusa ʋ cum aq permiscetur et oleum supernatet minori quantitate si cum oleo therebi. deflagratione noscitur oleum enim spicae genuinum flammam tenuem fumum paucum nec odore ingratum

Laureola thymelaea laur. folio semper virens sive laureola mas.
thymelaea laur. folio deciduo. femina bot. gentil
omnes utriusq laureolae partes ventr. nimium admodum subvertunt vomitum cient biliosos serosos humores cum impetu sursum deorsum purgant partes internas laedunt rodunt inflammant febres accendunt cardialgia superpurgationes vires exsolvunt.
a nonnullis ad serosos humores evacuandos hydropicis proscribuntur dosis corticis et foliorum a gr VI ad ℈ß. seu 3° 4° ve deglutiuntur

eor malitia corrig. d. macerando per 24 hor in aceto ut ellebor et esula. succo mali punici cydonii portulacae vel mucagine seminis psilli. alii infund in vino postea exsiccant. verum raro in usu ob malignitatem et nisi tutiorum medicator. inopia et cum desperat.
externe radix loco setacei adhibetur in oculor affectionib. radicis particula longa in aceto aut lixivio macerata auriculae perforatae inseritur quae copiosum serum inde educit, sic oculi inflam et imminens suffusio avertitur.

Laurus latifolia laurier royal
laurus vulgaris laurier franc
folia aromatica amaricantia cum non nulla astrictione calefaciunt digerunt resolvunt ventriculum roborant ciborum coctionem juvant flatus discutiunt hinc cum cibariis praesertim piscibus coquuntur. ad ventriculum roborandum flatulentos dolores colicos discutiendos infus. theae ad instar aut pulv 3. decoct in enematib ad colicam

39° baccae magis quam sal calefaciunt
corticem crudiorum moventes succos lentos
et viscidos dividunt et resolvunt · appetit
excitant urinas sicut menses movent
veteres adversus phtisim orthopnaeam et
omnes circa thoracem defluxiones seu rheumat
in baccis oleum essentiale tenue et aethereum
oleo crasso anodyno involvitur unde interna
ad sedandos dolores utiliter adhibetur
externe potenter resolvunt et corroborant
dolores mitigant
oleum quintuplex ex baccis
1° oleum essent quod ex baccis contusis aq
maceratis et distill. ad flatus discutiendos
colicos dolores passion hyster.
nocet sero calidis et biliosis inflam affect
dos a gutt III ad V. sacchar fuit affus
et cum liquore convenienti mistis
carminativis. clisteribus miscetur in colica
externe nervorum affect a frigore ortis
in paralysi et ischiadicis doloribus
rubi q et pectini contra passion hyster
colicos dolores mensium suppr a cruentis ...
2° oleum e baccis aq ferventi bullitis

intearae vel tritae bacc per semi hor-
bulliunt colant et fortiter exprimunt
refrigeratum oleum pinguedinis subviridis
instar aquae supernatans colligit.
hoc debilior oleo ess.

3° oleum ex baccis tritis et torcularis fortiter
expressi priori adhuc minus penetrans
cum oleo ess. viribus conveniunt sed debili

4° oleum laurinum ex bacci et foliis lauri
tritis et oleo omphacino maceratis et coctis
prioribus longe debilius

haec olea adversus scabiem sed nihil
promunt nisi admixto sulphure cujus odorem
emendant

℞ bacc laur ℨI corti. auran ℨII
infund in vin gener ℥IIII infus cum sacharo
propinat in ventriculi imbecillitate colica
flatulenta mensium remora

℞ flor chamaemil m II bacc laur contus
ℨII bull leviter in aq q.s. colat add
ol. laur expressi ℥ s clyster in colic flat

Lens vulgaris semine subrufo petite
lentille. lens major

flatulenta concoctu difficilis succi pravi
crassi terreni melancholici, obstant gignit

 cortex astringit. pulpa ulceri habet
exiguum sed suci est crani atq terreni
cortex aliment. est pesorii
Lenticula palustris Lentille d'eau
externe incidit resolvit refrigerat dolores
demulcet. inflammationib prodest a causa
~~frig~~ calida et ignibus sacris convenit sub
forma cataplasmatis ad haemorrhoid dolor
lenticul pal m. ii myrrh pulver ʒß simul
permist in sacculo lineo includ liquor
ex eodem sacculo stillante haemorrhoid
dolentes foventur
rajus pro secreto ad iterum d'inferi
lenticul pal in vino albo per 9 dies mace
ad ℥vi. herniis in pueris admota agglu
tinare d[icitu]r
Lepidium latifolium passerage
viridos succos potenter incidit hepatis
et splenis obstructiones aperit et inter
primaria antiscorbutica numerat
stomachicum. folia jejuno masticata
appetitum excitant coctionem juvant
hypocondr medet ab humor lentis visci
in primis viis. fol sicc ad ʒß ex vino
sumpta quotidie jejuno urinas moventt in hydrop

ext. fol vel rad recentia cum butyro vel axungia trita ischiadicum dolorem levant inter rubefacientia censeti cutim irritando vellicando sanguinem sordidum et humores e profundo ~~cutis~~ ad cutis superficiem attrahit

Lepidium hortense gramineo folio sive iberis cresson sauvage

iisdem dotibus priori convenit

Levisticum. angelica montana perennis paludapii folio, livêche ache de montagne

alexipharmacum carminativum diureti uterinum vulnerarium. nonnulli jubent radicem in aceto macerari et macerari contra aerem infectum. ventriculum roborat cibor coctionem juvat flatus discutit viscidos humores attenuat asthmati sub venit, obstruct hepatis lieni reserat in ictero qdo a bile viridiore cunctantibus a partu lochiis medetur foetum mortuum et placentam ejicit rad pulv a ʒß ad ʒi. sem a ℈i ad ʒß succ in secundinis retentis ad ℥iii solum vel cum aq arthemisiae

℞ rad levistici ʒß rad mei ℥ edoariæ
Zingib ā ʒii cinnam ʒiß fol absinth
melis a m i cort aurant citrior a ʒß
affund vin gen q. s. ad emin trium
transver digit. digeo per 9 dias fiat
col bis in die ad ʒiiii in ictero a bile
viscidiori
Lichen arboreus muscus pulmonarius
pulmonain de chene
hepaticæ fontanæ similis sed major
nascitr annosis arboribus qui quercubus
adhæret vulgo colligitr.
siccat astringit sanguinem fluentem com
pescit alvum et menses sistit
pulvis ad ʒi decoct vel infus ad ʒii
confecto syr aut aq still ad phthisim
℞ pulmon arbor fol tussilag a m i
liquir ras et contus ʒi aq et bulliant
in aq com lb iß ad lb i col add syr
hederæ terres ʒi div t in q dos quarta
quaq hora in hæmoptoe et pulmonum
exulcerationem
exter sicc et pulv sanguinem sistit
Ligusticum quod seseli offi
liveche seseli sermontaine

humores crassos et viscidos dividit
coctionem juvat flatus dissipat urinam
et menses movet pul ad ʒß vel infus in
vino

Ligustrum Twene

fol magis astringunt flor magis abstergunt
interne raro in usu
exter in oris exulceratione inflammation
excoriatione faucium et vulvae provindentia
in scorbutica gingivarum laxitate decoct
folior et flor cum aq ferrarium cum
taxillo aluminis in ore detentum juvat
℞ aq stillat ligust soluti a ℥i sacch
candid ℈ß sach satur ℈i camphorae g vii
mine alluatur ulcus
℞ decoct fol et fl ligust ℥viii mell
rosat ℥i sp vitriol gutt xx f garga
in faucium exulcer et aphtis

Lilium album vulgare

flor vis anodyna externe tantum usus
dolores demulcent digerunt et maturant
et clyster emollientib
ol ex florib per insolationem parato
cavendum ne diutius flores in oleo reliquantur

396 fuerit putrescunt et oleum fit fœtidum
sufficit triduum quo exacto alii flores
imponuntur sufficit tertium repetiisse
tensa remittit dura emollit dolores sedat
ad uteri duritiem præsertim
digerit etiam et maturat post affectum
hoc oleo prius inungito quam cataplasma
adhibeatur
aq stillat ad faciei nitorem et maculas
delendas cum tantillo sali tartari
bulbus emolliens maturans et suppurans
℞ bulbos lilior alb N IIII rad altheæ
concis ℥ III fol malv altheæ seneciones
violariæ pariet et branc ursinæ m I
coq in aq. ad putrilag contund in mort
per cribrum trajicie pulpam cum farin
lini fœnugr et ol lilior a ℥ III coq
igne lento assidue agitando ad debitam
spissit pro catapl emolli et maturanti
℞ bulb li alb sub ciner coct et contus
N II fol oxalid m II cum axungia
porci q s. coctis ad debit spissit misce
pro cataplasmate suppurante
ad anthrac catapl ex bulbis lilior sub cinere
coctis contusis et cum oleo nucum mixtis

Lilium convallium album

muguet ou lis des vallees

flores inter cephalica et nervina

in apoplexia epilepsia vertigine con
vulsionibus paralysi catharrhis et aliis
frigidis capitis morbis ab illis tum inter
quam extra pulveris ad ℥i

flores exsicc et pulv blandum sternutatorium

℞ flor cyani ℥iii fl convolvul reguli
specierum colore diversarum flor paeoniae
balaustior et rosar ℥iii fl calend
anth. rosar a ℥ii fl lilium conv rad
calam aromat flor caryophr hort a ℥i
omnia sint in umbra exsiccata et commi
misceant et fiat pulvis sternutatorius
colorum varietate elegantissimus

et add foll beton majoran rad irid fl
virorum hellebor et zingib in apoplexi
et soporosis affectib

℞ pulv de guttete ℥i syr de stoechad
et sp lil convall a ℥i aq fl. lilior conval
et flor tili arbor a ℥iii tinctur castor
gutt [illegible] sp corn cer succin ℥i m f potio
cochleatim in convul paroxysmo et hyster aff

℞ conser flor lilior conval flor salviae

 et roris marin a ℥ß pul millepod
et viper a ℥ii rad valer silv. sem eru
pul a ℥iii syr de hyssop q.s. m. f
elect dos ℥i bis in die in paralysi
incipiente

Linaria vulgaris lutea flore maior
Linaire ou lin sauvage
resolvit emollit et demulcet intus vero
alvi turbatrix et urinam tam potenter
pellit ut urinaria dr, solis hydropicis
ejus aq distill cum ℥i corticis ebuli pul
extra anodyn quo vix praestantius ad
haemorrhoid caecar dolores mitigand,
vel sola vel cum camomil et verbasco in
lacte coct, vel fit liniment ex lin
florid cum axungia aut butyro recenti
in mortar pluntes cum pauca camphor
succus maculas et vitia faciei emendat
aliqui hanc intra calceos plantis pedum
supponunt ad febrem quartanam

Lingua cervina scolopendria
langue de cerf siccat astringit, viscera
tonum roborat in obstru et lieni tumido

obstructiones reserat demulcet
alvi profluvia sistit thoracis affectionib
extern vuln et ulcera mundificat et medecat
℞ rad polipod et cichor silvest a ℥i cort
cappar et tamarind a ℥ß coq in aq con
℔iiii ad ℔iii tunc add fol scolop aspl
seu cetarum agrim hepaticae taraxac a
m I flor calendul et Keiri a p ii
coq per ¼ colat dissol tart vitriol
℥ii syr de 5 rad aper ℥iii f apoz
in 6 dosi exhib in viscer obstructio
pulvis ad ℥i in palpitatione cordis
suffocatione uterina medet consultius
in ueresissa [illegible] aut [illegible]

Linum sativum. sem tusum melli
adiectum et frixum auxiliat in frequenti [illegible]
sed pravum alimentum flatulentum stomacho adversatur
Sem ob mucilag temperatam anodynam
acrimoniam humorum demulcet [illegible]
et eo[illegible] praesertim in urinae ardore salesacre
muci suo involvit vesicae mucum deficientem
restituit cuius membranas ab urinae acrim
defendit. sed cavendum ne nimis sint nimis
glutinosi ventriculum gravarent.

400 quapropter infunditur Ltum et parva quantitate
℞ rad nemeph ℥i gram m i liquir. ras et contus ℥i bull in aq com ℔iiii per ¼ hor decocto ab igne remoto add rad althaeae taleol sect ℥ß sem lin p i propositum solido
farina lini residet emollit maturat ol. temperat alvum ciet tussim sedat relaxat expectorationem promovet et singulare contra pleuritidem ad ℥ii vel iii 4a quaque hora in colico dolore in haemorrhoidib. sed recens esse debet si rancor se manifestat diu agitanda in ampulla vitrea cum aq tepida donec sapor et odor gratus superest mutando identidem aquam
℞ farin sem lin ℥viii flor camom cynnab a ℥iiii mell ℥ii ol lin q.s. f. cataplasma lateri dolenti calens applicand in pleuritide et lateris dolore punctorio
℞ vitellos ovi ad duritiem coct № iiii ol succin ℈ii theriac andromach ℥ß ol lin q s. f cataplasma haemorrhoidale

Linum catharticum. pratense floribus exiguis lin sauvage purgatif fol recentia contusa ad ʒi aut ii sub forma boli exgerunt vel herbae exsiccatae pulv ʒi cum tantillo cremoris tartari et seminis anisi intus sumitur et purgat sine molestia in hydropisi et febr interm

Lithospermum majus erectum grand herbe aux perles. vulnum solis sapore donant farinaceo glutinoso astring diuretic. sem. et anodyn pulv ad ʒi ℞ sem milii solis ʒß contund inusq still alkekeng ℥xii col diss syr di 5 rad op ℥iß f emuls de duas doses intra unius horae intervall in urinae difficul ad mucum in urinariis viis resolvendum ℞ sem milii solis ʒiß pul linguae cervin ana ʒiß succ alb ppt ∋ii m f pulv dos ʒi singulis dieb mane jejuno cum succo plantaginis aut lacte ad gonorrhoea cohibendo

Lithospermum minus repens latifol iisdem virtutib pollets

Lithospermum arundinaceum lacryma job larme de job iisdem pollet viribus ad calculum renum

 Lotus major odorata violacea
lotier odorant trefle musqué faux baume du perou abstergit digerit dolores demulcet sanguinem effusum et coctum resolvit vulnera consolidat, vulnerarium sumit floris ad ℥i in vino aut aqua multũ decoct. pleuritidi sudorem pellendo menses et urinam pellit
ol. fit ex summit. in oleo com. maceratis ad vulnera et ab inflam. defend, hernias puerorum sanandas tumoresq mollivendos interponitur inter vestimenta ac a tineis erodant.
Lujula alleluya oxys flore albo alleluya pain a coucou.
virib. cum acetosa convenit sitim sedat ventriculi ardores extinguit æstum febri mitigat sanguinem [illegible] resolvit nimis dissolutum emendat, inter cardiaca aperiens et antiscorbutica
sal ad gr. i eius vis operum augetur tantillo nitri ubi vehementior humor cestus cerebri inflam. delirium linguæ ariditas, succ. ad ℥i
℞ fol. lujul. m i nattur. aquat. cochl. a m ii poma citri cum cort. N ii contusa cum sacch. f. electuar. antiscorbut.
[illegible] pat. [illegible] vel mentor

℞ succ. becabun. cujul. urtic. rotund. fumar.
veronic. nasturt. aquatic. cochl. abrint.
trifol. fibr. ℔ i syr. anthiopyr. ℥ i f. j.
julap. acutum in cachecticis et scorbut.
vel ℞ extr. eius plant. ℥ß vitriol. mart.
℈ gentian subtil. pul. ℨ i f. pil. dos. ℈ i vel ℨ ii
℞ rad. gram. fragar. ℥ i currat ℥ß
coq. in aq. com. ℔ iii ad ii sub fin. add.
fol. agrim. trifol. acetos. a. m. ii f.
decoct. pro cyath. 3o vel 4a quaq. hora
infantibus febre lenta laborantib.
cum tumore cachectico abdom. idoneis
adjice tinct. rhabar. ℥ß syr. ros. solut.
℥ i pro decoct. ℥ vi
ext. succ. vel aq. distil. alumini mom. ta
erisipelatis et inflam. incipientib. et
ori collutr. ad aphtas

Lupinus sativus flore albo
intus suspectus est usus extus resolvit

Lupulus houblon
turiones asparagorum modo adusti
alvum blande laxant, sanguinem fluidi-
um efficiunt. scabiei et aliis cutis vitiis
medentur. fructus ad condiendam cerevisiam
ne cito acescat et corrumpatur

 insignem amarorem ei communicat qui in aetate evanescit. cerevisia lupulata salubrior existimatur. obstructiones aperit urinas pellit et menses. usu in incebrint folia et turiones aperiunt abstergunt et roborant

℞ cum vini vital ℔ß rad lupuli zylis burdan mag. toleol sect a ℥i coq in ℔ iii ad iii tum add turion vel cono et summit lupul flumin a m ii bull per hor quadr pro duo poculi mane et vesp. laudatum adversus serpigines herpetes et alia cutis vitia

externe ad sedandos dolores tumoribus oedematosis contusionib et podagricis radix aperiens et sudorif

Majorana vulgaris

partibus tenuibus salinis oleosis aromaticis et activis pollet cibis additur ad cor flatulentiam emendandam ut pisis fabis phaseolis et piscibus. humores crassos viscidos digerit attenuat auxiliatur cerebri frigidis morbis ad pectoris vitia urina et menses provocat

in corpora et in olfactus laesionibus
specialiter pro olfactu abolito
pulv ad ℈ß cum marmelata fl. aurant.
quotidie mane jejuno. in epilepsia
quam expertissimum.
externus pulv acleantis erhinum
℞ rad hellab alb ℈ß fol majoran pu
dero q in aq ℥iii ad ⅓ ex decocto pann
calido in vola manus posito in dolore
atroci capitis levem enim exasperat.
ol. in affectib paralyticis et nervinis
tam intus quam extus gutt i aut ii cum
saccharo. olfactum restaurat.
familiare est infantibus ut nares obstructa
difficulter respirent et lacte sugendo
impediantur cui incommodo ol mai. nares
illin vel sal vel oleo irino infus nicotianae

Malva vulgaris flore majore
folio sinuato mauve. flor. minore
folio rotundo. olim inter alimenta
Exoneraturas ventrem mihi villica malvas
attulit et varias quas habet hortus opes
olim in aceturis cum lactuca crudam
nunc vere novo genas et cauliculos malvae
asparagorum more ex oleo et aceto.
humectat emollit lenit dolores urinae

 acrimoniam mitigat alvum blande
laxat. malvae succ ad ℥vi invinc
insplin melanchol maniaci; mulierib
aegre parturientib.
fol decoct vel aq distill assidue pota in
internis febrium ardoribus peripneum
pleuritide plurimum conferunt. dysent
mitigant dysuria
flor infus in aq theae ad instar quotidi
ad ℔i in dysuria
fol radic cum foenicul et anetho decoct
lactis copiam affert
rad vel sem decoct ex aq aut lacte per
aliquot dies tussim calidam tollit
pulmoni exulcerationi medetur et phthisi
℞ rad altheae ℥ii fol mal bismal viol
acanth a m ii sem lin foenugr a ℥i
flor chamaemel melilot a m i coq in aq
pulpa per setaceum trajiciatur unicuiq
librae add axung vel ung de althea ℥ii
vel ol lilior aut chamae ℥i ad cataplasm
in tinea et ulcerib capitis sicca crusta
decoct mal cum urina sana
Malva rosea folio subrot vires dantur mer
inter blanda salutaria

Malus mitia paradisina praecoxia
pommes de paradis. 2° rambura de
rambourg 3 capendua seu curtipendua
courpendu capendu ou de bardin.
4. venetta alia e viridi pallescunt alia albicant
flavescunt. alia e viridi ferrugineo colore
venettes grises plurimum commendantur
5 rosea mala 6 passipoma seu calvilea
calviles 7 castinia. de chataigner
8 franccruta de francata. 9 feniculata
fenouillettes ou d'anis,
acido dulcia saluberrima reficiunt et
nutriunt. reficienda omnia poma ante
quam in arboribus maturaverint decerpta
flatulenta sunt difficile coquuntur colicos
dolores pariunt.
dum hyeme servantur si congelata fuerint
non igni admovenda sed in aquam fri
gidissimam conjicienda ut pristinam
naturam recuperent. idem evenit in ovis
congelatis, et omnibus corporis partibus
quae gelu rigent quare talibus personis
afflictis idem praestitisse auxilio fuerit
coctione omnium malitia emendatur et
flatulentia tollitur

408 Persica poma pyra et lac caseus et caro
salsa
et caro cervina et leporina bovina caprina
atra haec bilem nocent sunt et infirmis
inimica
quidquid dicant cocta mala tussim leniunt
expectorationem provent hectici phthisici
stomachi [illegible] tangunt ardorem [illegible]
acrimoniam demulcet obstructiones aperit
et alvum claudit apertam mollet laxat
℞ seri lactis [illegible] pom. renetten. N. ii
coq. per semi quadrantem f. col. [illegible] syr
de pom. simplex hauriat aeger 4ta quaq
hora ad ℥vi
℞ hord. perlat. [illegible] a ℥ß sed gran
[illegible] coq in aq comm. [illegible] add
liquir. rasae ℥i passul enucleat ℥ß ficuum
et dactylos N iii coq per ¼ hor sub
fin add pom renetorum ad ignem tostorum
pro decocto pectorali
in vitiis pulmon. placuit pom. excav
et dragant [illegible] repletis fictis cum sacch.
comedendum dat
℞ sal mart ℥ii solv in infus gentianae ℥i
add syr de pom sim ℥i [illegible] in dosi ℥i bis
ad [illegible] cachexiam

catapl pomor in opthalm et poma putrida inflam. et tumorib quib cumq pomaceum le cidre humectat nutri a morbo sa rawlldgentell phthisici et melancholici paratile

Malus agrestis. fructus est austerus astringens. priores in eor succo firmiores et sapidiores fiunt

Mala granata sive punica grenade

punicorum acini sunt boni succi sed parvi alimenti ubi astringere densare corroborare, pulmonibus male affectis nocent

℞ confect alkerm ℥i succi granat defecat aquar borrag et oxyphytal a ℥ii syr granat ℥i m.f. potio cochleat sumenda in febrib malign

cortex malicorium valide astringit utilis vice corticis quercu et gallar. pulv ʒi decoct ℥ss

fl. balaustia astringunt inspissant exsiccant intus ad ʒi pul ad ℥ß in decoct

℞ balaust pulver ℥ß bol arm terr sigill coral rubr et terr japon a ℥ii syr cydon vel e ros sicc q.s. m.f. op absorbens astringens in alvi profluviis dos ʒi bis terve praemiss praemit

℞ flor balaust ℥ii malicor sangui.
dracon lapid hæmatit ppt alum ceriol
a ℥i conserv rosar rubr vetor ℥ß
syr de symph q.s. m f opi d. ℥i
in alvi proflu et hæmorrhgi.
℞ fol plantag ms balaust et ro.
rubr a m ß coq in aq ferrar lt ii
ad lt i in col d. mol alum usp ℥ß syr
granat aut berberi ℥i f decoct ast.
pro gargarismate vel inject astringent

Malus persica molli carne
viridis et albu.

Stipantur calathi pomis quæ barbara
miserat ut fama est patriis armata veneni
et nunc exposito parvo discrimine lethi
ambrosios præbent succos oblita nocendi
Junius columella

Petre, quid est pesca? cum vino nobilis
esca
Petre quid est vinum? cum pesca dulce
venenum

eligatur odorata bene colorata sapida
succo prædita et bene nec nimis matura
si eorum immoderatius sit usus crudos succos
gignunt colicam diarrhœam et dysenteri-
am provocant aut febres putridas

phlegmaticis nocent, igne et saccharo emendantur sic q[uo]q[ue] gratam et salubrem ciborum praecavent, pecto[ra] cum compote refrigerando corroborant. cum spiritu vini et saccharo condita minus valent in ventriculo cocta difficil;
post alios cibos... occlusionem coercent ventriculum gravant. conveniunt cholericis calidis naturis alvi duritie mane jejuno superbibendo aquam limpidam
nuclei sub amari diuretici anthelmintici
pulvis ℨi in vino albo spatio 9 dierum
in cephalalgia agrypniis ad somnum conciliandum
ex his nucleis ol in surditate
lignosa nucleorum ossicula diuretica educunt lapilli dactylos
flor alvum laxant mane comedunt jejuno aut in acetariis. non tamen absq[ue] molestia purgant alii infundo in vino aut sero lactis lumbricos enecant infantibus cor suum ad ℨi eadem praestant conserva fl ℨi cui adjicit mercurii dulcis tantill. syr alvum blande purgat vermes enecat obstructiones reserat serosos humores uberrime evacuat

412 fol alvum subducunt ad m i corta
quam ex arbore humor acidmonodum
demulcet ad alvi fluxum tumorem
faucium asperitatem arteriae sputum
sguinad dtarctiam habet

Mandragora fructu
rotundo. flore subcaeruleo purpu
rascente.
inter narcotica
folia potentia deducunt attenuant
resolvunt dolores mitigant et inflam
cum lacte coct ^etras^ sub cataplasmatid forma
aerisipelatib tumorib inflammatoriis
duris ac scirrhosis ad somnum conciliand.
fronti et tyroibus

Marrubium marinum. album
aperit et viscidos humores dissolvit
in asthmate humorali et morbis chron.
a mucu viscido succus cum melle ad ℥ii
astmaticis tussientib tabidis
sumit in vino alb infus et hidro epot
ad menstrua provocanda stomach robor
cachexiam et faedos virgin colores arcendos
valere c. potius cum chamaedr et centaur.

pulv fol. in partes dist. Cortic. retunds
vermes enecant ad ʒi. succus vel infus
in vino aut aq in ictero hydrops
℞ syr de prunis ℥ii ol tartar per deliq
ʒi m. sum. cochleat.
℞ cor vitel ℔ß coq in aq com ℔iii adu
add fol agrim arg a m i centaur min
chamaepit summit flor prass alb apii
petr leven ebull f col per duos pund
add mineram tartar mart solub ʒß vel
flor sal am^m mart gr XX sum mane
et vesp in mensium supp ictero et
viscer obstr
succus cum saccharo vel syr etiamis
affectos longo usu sanat
Marrubium nigrum fetid
Ballote. tumores resolvit dolores sedat
ulcera detergit rarius intus ob fetorem
℞ fol marrub nigr marrub alb et
Beton m i inf in aq fervent ℔ii
macerent donec aq refrigerata sit
f. cyathos tres quo die ad arthritid
fol cinere fervent macerata cum
melle trita sordida ulcera
cor. devorat ad omnes scabies porrigines

111 Marum chamaedrys maritima incanum frutescens folio lanceolato ejus odor felibus gratissimus varus usu incidit attenuat aperit digerit resoluit frigidis et humidis. diuretic diaphor carminativ antiscorbut in frigido emmenagog cephali pectorale aphro disiacum fol ad ℨß
extern idem pulvis errhinum insign cerebrum expurgat roborat
Marum masticho offic thymbra hispanica majoranae folio
eaedem vires ac maro corticis in desperatis mensium fluxu cortic pul ad ℨi cum vino austero
Matricaria expurgoutte hirtacin pulv a ℈ß ad ℈ii vel suc ad ℥i ad menses lochia pellend ...
uterinam suffocationem sedat
quaecunque amara possunt et carminantia matricaria praestat roborat fluxu domu febrifug
℞ comae matricar exsicc pulv ℈i nitri gr x syr arthem q.s. f bol in mensiu remora

℞ fol malv fol et flor matric arthem
tanacet a m i f decoct pro enemat
dissol cristal min ʒi mellis mercurial
asinini ℥iii in hyster passio et loch sup
cavendum ne emenagoga incaute
adhibeantur in statu plethori et qdo
primae viae non sat expurg nec
sanguis satis dilutus et attenuatus aut
potius contractus et ad phlogosim tendentes
apes non possunt matricariae ferre odorem
quare qui apes timent debent secum
matricariam ferre

Mays ble de turquie
cum hordeo plurimum convenit panis
ex eo siccus durus concoctu difficilis fla
tulentus. farina cum lacte sub[?] im
magis nutrit

Melilotus melilot ou mirlirot
leniter resolvit digerit emollit dolores
sedat raro interne
℞ flor melilot chamaemel fol malv
a m ii coq in decocti omnis q s pro
enemat emolli anodin et carmin
in inflammati cum agrim et chamom in vino coct

℞ herbae melilot flor. d. gravidat.
m. ii betoni. m. i. b. malv. m. iß
flo chamaemel. m. ß. m. fiat decoc.
aq. pectori saepe superponat ad planct.
planctitd. mitigandam.
℞ pulp. liliorum althaeae radic. ℥
fol. cicut. et hyosciam. parat. per
setaceum traject. ℔ß flor. melilot.
camomill. et absinth. pontic. sicc. et
pulver. a. ʒiii ol. rosat. q. s. m. f.
cataplas. ad testium tumores resolvend.
Succ. flor. melilot. aut inf. oculor.
dolori sedant si praesertim aliquantum
ʒ camphor instillet.
aq. flor. melilot. servat ad odora
medicorum aliorum fragrantiae mea
expandendam restituen.

39 Blank Leaves Not Scanned

Index

De medicamentis exoticis

cap. 1[m] De radicibus

De lignis

De plantis quibd. maritimis

De Surculis quibdam foliis et floribus

De fructibus et Seminib

De Succis gummosis

De gummi resinis

De Succis arte extractis

De Tuberibus fungis et adnatis

Index
Plantarum indigenarum

d.

24